TRAITÉ

DE

MÉCANIQUE CÉLESTE,

PAR M. LE MARQUIS DE LAPLACE,

Pair de France; Grand'Croix de la Légion-d'Honneur; l'un des quarante de l'Académie française; de l'Académie des Sciences, Membre du Bureau des Longitudes de France; des Sociétés royales de Londres et de Gottingue; des Académies des Sciences de Russie, de Danemarck, de Suède, de Prusse, des Pays-Bas, d'Italie, de Boston, etc.

TOME CINQUIÈME.

PARIS,
BACHELIER (SUCCESSEUR DE Mme Ve COURCIER), LIBRAIRE,
QUAI DES AUGUSTINS, No 55.

1825

IIA LIB.
00707

TABLE DES MATIÈRES

CONTENUES DANS LE CINQUIÈME VOLUME

LIVRE XI

DE LA FIGURE ET DE LA ROTATION DE LA TERRE

CHAP I *Notice historique des travaux des géomètres sur cet objet* page 2

CHAP II *De la figure de la terre* page 22

CHAP III *De l'axe de rotation de la terre* page 57

CHAP IV *De la chaleur de la terre et de la diminution de la durée du jour par son refroidissement.* page 72

LIVRE XII

DE L'ATTRACTION ET DE LA RÉPULSION DES SPHÈRES, ET DES LOIS DE L'ÉQUILIBRE ET DU MOUVEMENT DES FLUIDES ÉLASTIQUES

CHAP I *Notice historique des recherches des géomètres sur cet objet* page 87

CHAP II *Sur l'attraction des sphères et sur la répulsion des fluides élastiques* page 100

CHAP. III. *De la vitesse du son, du mouvement des fluides élastiques et de la vapeur aqueuse*..... page 119

LIVRE XIII.

DES OSCILLATIONS DES FLUIDES QUI RECOUVRENT LES PLANÈTES.

CHAP. I. *Notice historique des travaux des géomètres sur cet objet, et spécialement sur le flux et le reflux de la mer*..... page 145

CHAP. II. *Nouvelles recherches sur la théorie des marées*, page 168

CHAP. III. *Comparaison de l'analyse précédente avec les observations des hauteurs des marées dont la période est d'environ un demi-jour*..... page 183

CHAP. IV. *Comparaison de ~~l'analyse avec les observations des heures~~ et des intervalles des marées*..... page 213

CHAP. V. *Des flux partiels dont la période est à peu près d'un jour*..... page 221

CHAP. VI. *Des flux partiels qui dépendent de la quatrième puissance inverse de la distance de la Lune à la Terre*.... page 230

CHAP. VII. *Du flux et reflux de l'atmosphère*..... page 237

LIVRE XIV.

DES MOUVEMENS DES CORPS CÉLESTES AUTOUR DE LEURS CENTRES DE GRAVITÉ.

CHAP. I. *De la précession des équinoxes. Notice historique des travaux des géomètres et des astronomes sur cet objet. Formules générales du mouvement de l'équateur terrestre*..... page 245

CHAP. II. *De la libration de la Lune. Notice historique des travaux des astronomes et des géomètres sur cet objet. Remarques sur la théorie de la libration de la Lune*..... page 278

CHAP. III. *Des anneaux de Saturne. Notice historique des travaux des géomètres et des astronomes sur cet objet*..... page 288

LIVRE XV.

DU MOUVEMENT DES PLANÈTES ET DES COMÈTES.

CHAP. I. *Notice historique des travaux des géomètres et des astronomes sur cet objet*..... page 293

CHAP. II. *Considérations sur quelques objets du second livre. Sur les variations des élémens du mouvement elliptique. Sur le développement en série, des puissances du radical qui exprime la distance mutuelle de deux planètes. De la grande inégalité de Jupiter et de Saturne. Sur la détermination des orbites des comètes par les observations*..... page 328

LIVRE XVI.

DU MOUVEMENT DES SATELLITES.

CHAP. I. *Du mouvement de la Lune. Notice historique des travaux des géomètres et des astronomes sur cet objet*..... page 350

CHAP. II. *Sur la théorie lunaire de Newton*..... page 349

CHAP. III. *De l'inégalité lunaire à longue période dépendante de la différence des deux hémisphères terrestres. Des inégalités lunaires dépendantes de la partie elliptique du rayon terrrestre*, p. 381

CHAP. IV. *Sur la loi de l'attraction universelle*..... page 401

CHAP. V. *Du mouvement des satellites de Jupiter. Notice historique des travaux des astronomes et des géomètres sur cet objet*..... page 408

CHAP. VI. *De l'influence des grandes inégalités de Jupiter sur les mouvemens de ses satellites*..... page 415

CHAP. VII. *Des satellites de Saturne et d'Uranus*..... page 417

Errata du cinquième volume..... page 420

FIN DE LA TABLE DU CINQUIÈME VOLUME.

TRAITÉ
DE
MÉCANIQUE CÉLESTE

NOTICE HISTORIQUE

Des Travaux des Géomètres sur la Mécanique céleste, et nouvelles Recherches sur le Système du Monde.

J'ai annoncé au commencement de ce Traité, que je le terminerais par une Notice historique des travaux des géomètres sur la Mécanique céleste. Je vais ici remplir cet engagement. Mais ayant fait depuis l'impression des volumes précédens de cet Ouvrage, de nouvelles recherches sur divers points de la Mécanique céleste, recherches que j'ai publiées dans les Mémoires de l'Institut et dans le Recueil de la Connaissance des Tems; j'ai pensé qu'il serait utile de les réunir à la suite des notices historiques sur chaque objet. Je vais commencer par la figure et la rotation de la Terre.

LIVRE XI

DE LA FIGURE ET DE LA ROTATION DE LA TERRE

CHAPITRE Ier.

Notice historique des travaux des Géomètres sur cet objet

1 Je ne parlerai dans cette notice, que des recherches sur la théorie mathématique de la Terre. On ne peut alors remonter qu'à Newton, fondateur de cette théorie qu'il publia sur la fin de 1687, dans ses Principes mathématiques de la Philosophie naturelle. Ce grand géomètre y considère la Terre comme une masse fluide homogène, douée d'un mouvement de rotation, et dont toutes les parties s'attirent réciproquement au carré de la distance. Il suppose ensuite que cette masse prend, dans l'état d'équilibre, la figure d'un ellipsoïde de révolution, et il cherche, dans cette supposition, le rapport de l'axe du pôle à celui de l'équateur. Pour cela, il conçoit deux colonnes fluides partant du centre, et aboutissant l'une au pôle, et l'autre à l'équateur; et il observe que les poids de ces deux colonnes doivent se faire équilibre. Si l'on imagine l'ellipsoïde, divisé en couches infiniment minces et semblables; la gravité (je nomme ainsi la résultante de toutes les forces attractives), sera aux pôles de ces couches, proportionnelle à leurs petits axes; car Newton établit cette proposition remarquable, savoir qu'un point placé dans un ellipsoïde creux, dont les deux surfaces intérieure et extérieure sont semblables et semblablement situées, est également attiré de toutes parts. Ainsi, à la surface d'une couche terrestre, les couches supérieures n'ont aucune influence sur la gravité qui, par conséquent, est la même qu'au pôle de l'ellipsoïde terminé par la surface de cette couche. Or, il est facile de voir que la gravité des

points semblablement situés sur les surfaces de deux corps homogènes, semblables et de même densité, est proportionnelle aux dimensions linéaires et semblables de ces corps Cela résulte de ce que l'attraction étant égale à la masse divisée par le carré de la distance, elle n'est que d une dimension relativement à l étendue De là il suit que le poids de la colonne du pole, étant la somme des gravités aux surfaces des diverses couches, il est égal au produit de la pesanteur au pôle, par la moitié de la longueur de cette colonne, ou par le quart de l'axe du pôle. Un raisonnement semblable fait voir que le poids de la colonne de l'équateur est le produit de la pesanteur à l'équateur, par le quart du demi-axe de l équateur Car la pesanteur à l'équateur est la gravité diminuée de la force centrifuge, et cette force diminue de la surface au centre, comme la gravité, c'est-à-dire proportionnellement à la distance à ce point. Ainsi dans l'état d'équilibre, le produit de la gravité au pôle, par l'axe du pôle, est égal au produit de la pesanteur à l'équateur, par l'axe de l'équateur.

Pour avoir au pôle, la gravité qui, sur ce point, est la pesanteur même, Newton considère un ellipsoïde de révolution, dont l'axe de révolution contient 100 parties, et l axe de l'équateur 101, et il trouve au moyen des propositions qu il établit sur la gravité aux pôles des sphéroïdes de révolution, que la gravité au pôle de cet ellipsoïde est à la gravité à la surface d'une sphère dont le diamètre est de 100 parties, comme 126 est à 125

Newton obtient de la manière suivante, la gravité à un point quelconque A de l'équateur du même ellipsoïde. Il considère une sphère ayant le même centre que l'ellipsoïde, dont la surface passe par le point A et dont le diamètre est, par conséquent, de 101 parties; et il observe que si l on diminue d'une partie, un des diamètres perpendiculaires à celui qui passe par le point A, de manière que ce diamètre ainsi diminué devienne l'axe d'un ellipsoïde de révolution, passant par le même point, ce point sera un point de l'équateur de cet ellipsoïde. Newton remarque ensuite, que si l'on diminue pareillement d'une partie, le diamètre de la sphère, perpendiculaire aux deux premiers; on aura un second ellipsoïde de révolution, dont A sera encore un point de l'équateur. Si l'on fait varier à la fois les deux derniers diamètres; on aura un ellipsoïde de révolution dont A sera le pôle, et dont l'axe de révolution aura 101 parties, l'axe de l'équateur n en ayant que 100 Dans cet

ellipsoïde, la gravité au pôle est à la gravité à la surface de la sphère dont le diamètre est de 101 parties, comme 125 est à 126. Mais par la nature des variations très petites de deux quantités, la diminution de la gravité, due à la diminution simultanée des deux diamètres, est la somme des diminutions de la gravité, lorsqu'on diminue le second diamètre sans diminuer le troisième, et lorsqu'on diminue le troisième, sans diminuer le second; et cette somme est le double de l'excès de la gravité à la surface de la sphère, dont le diamètre est de 101 parties, sur la gravité à l'équateur de l'ellipsoïde, dont l'axe de l'équateur étant de 101 parties, l'axe du pôle est de 100 parties. De là il est aisé de conclure que cet excès est $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{126}$ de la gravité à la surface de cette sphère. Mais cette gravité est à la gravité à la surface de la sphère dont le diamètre est de 100 parties, comme 101 est à 100; d'où l'on conclut que la gravité au pôle de l'ellipsoïde supposé primitivement, est à la gravité à son équateur, comme $\frac{126}{125} \cdot 100 : \frac{125\frac{1}{2}}{126} \cdot 101$, ou, à très peu près, comme 501 est à 500. Désignons par φ le rapport de la force centrifuge à la gravité, à l'équateur; les pesanteurs au pôle et à l'équateur de l'ellipsoïde seront donc dans le rapport de 501 à 500 $(1-\varphi)$. Ces pesanteurs multipliées respectivement par les longueurs des colonnes fluides, ou par 100 et 101, sont proportionnelles aux poids de ces colonnes. Ainsi, pour l'égalité de ces poids, ou pour l'équilibre, le produit de 501 par 100, doit égaler le produit de $500.(1-\varphi)$ par 101; ce qui donne à fort peu près φ égal à $\frac{4}{500}$, ou égal à $\frac{4}{5}$ de l'aplatissement $\frac{1}{100}$ de l'ellipsoïde. L'aplatissement d'un ellipsoïde quelconque très peu différent de la sphère, est donc généralement égal à $\frac{5}{4}$ du rapport de la force centrifuge à la gravité à l'équateur; et comme pour la Terre, ce rapport est $\frac{1}{289}$, il en résulte un aplatissement égal à $\frac{1}{230}$, en sorte que les axes du pôle et de l'équateur sont à fort peu près dans le rapport de 229 à 230. Les pesanteurs à ces points sont, comme on l'a vu, réciproques à ces axes; elles sont donc dans le rapport de 230 à 229. Newton suppose que de l'équateur aux pôles, la pesanteur croît comme le carré du sinus de la latitude.

Tel est le premier pas que l'on a fait dans la théorie mathématique de la figure de la Terre. Il laissait, sans doute, beaucoup à désirer. Newton suppose, sans le démontrer, que la figure elliptique convient à l'équilibre d'une masse fluide homogène tournant sur un axe. Il suppose encore, sans démonstration, que la pesanteur à la surface, augmente de l'équateur aux pôles, comme le carré du sinus de la latitude. Enfin, il regarde la Terre comme homogène ; ce qui est contraire aux observations qui prouvent incontestablement que les densités des couches du sphéroïde terrestre croissent de la surface au centre. Malgré ces imperfections, ce premier pas doit paraître immense ; si l'on considère l'importance et la nouveauté des propositions que l'auteur établit sur les attractions des sphères et des sphéroïdes, et la difficulté de la matière.

Environ deux ans après la publication du livre des Principes mathématiques de la Philosophie naturelle, Huygens traita le même sujet, dans un Appendice à sa Dissertation sur la cause de la gravité. Il n'admet point l'attraction de molécule à molécule, et il suppose que chaque molécule d'une masse fluide homogène, tournant sur un axe, tend vers le centre de gravité de cette masse, en raison inverse du carré de sa distance à ce point. Le problème de la figure de cette masse présente alors beaucoup moins de difficultés. En combinant la force centrifuge avec la tendance vers le centre, Huygens détermine les longueurs que deux colonnes fluides partant du centre et aboutissant à la surface doivent avoir pour se faire équilibre ; et il trouve pour la figure du méridien, une courbe du quatrième ordre, qui, lorsqu'on suppose très petit, le rapport φ de la force centrifuge à la pesanteur à l'équateur, devient une ellipse dont le petit axe étant représenté par l'unité, le grand axe est $1 + \frac{1}{2}\varphi$. Il trouve ensuite que la pesanteur croît de l'équateur aux pôles, proportionnellement au carré du sinus de la latitude, et de manière que la pesanteur étant supposée 1 à l'équateur, elle est $1 + 2\varphi$ aux pôles. On vient de voir que dans la théorie de Newton, les axes et les pesanteurs sont dans le rapport de 1 à $1 + \frac{5}{4}\varphi$; ce qui est bien différent des résultats d'Huygens. Mais il est remarquable que dans ces deux théories, la somme de l'ellipticité et de l'excès de la pesanteur au pôle, sur la pesanteur à l'équateur, prise pour unité, soit la même et égale à $\frac{5}{2}\varphi$. La théorie d'Huygens revient à considérer la

Terre comme un sphéroïde composé de couches infiniment rares de la surface au centre, et d'une densité infinie, infiniment près du centre; ce qui donne la limite de l'aplatissement, lorsqu'on suppose les densités de couches, croissantes de la surface au centre. La théorie de Newton donne l'autre limite de l'aplatissement dans la même supposition. C'est donc entre les limites $\frac{1}{2}\varphi$ et $\frac{5}{4}\varphi$ que doit être l'aplatissement de la Terre; et c'est, en effet, ce qui résulte des observations.

On n'ajouta rien à la théorie de Newton, jusqu'en 1737. Clairaut prouva dans les Transactions philosophiques de cette année, que les suppositions sur lesquelles Newton avait fondé sa théorie, étaient exactes. Il fit voir que la figure elliptique satisfait à l'équilibre d'une masse fluide homogène, peu différente d'une sphère, et tournant sur un axe; et qu'à la surface de cette masse, la pesanteur croît proportionnellement au carré du sinus de la latitude. L'Académie des Sciences proposa pour le sujet du prix qu'elle devait décerner en 1740, la Théorie du flux et du reflux de la mer. Parmi les pièces qui partagèrent le prix, celle de Maclaurin est la plus remarquable par l'importance et par la beauté des résultats sur les attractions des sphéroïdes elliptiques de révolution. L'auteur y démontre que la figure elliptique satisfait rigoureusement à l'équilibre d'une masse fluide homogène douée d'un mouvement de rotation, en prenant pour condition de l'équilibre, celle de l'équilibre du fluide dans un canal intérieur de figure quelconque, et aboutissant par ses extrémités, à la surface. Il détermine l'attraction à la surface de cette masse, et en la combinant avec la force centrifuge, il parvient à ce théorème, savoir que si, d'un point quelconque de la surface, on abaisse une perpendiculaire que l'on prolonge jusqu'au plan de l'équateur; la pesanteur à ce point, sera proportionnelle à cette perpendiculaire, et le rayon de courbure sera proportionnel au cube de la même ligne. Enfin, il obtient par une équation transcendante, le rapport des axes des pôles et de l'équateur. La méthode suivie par l'auteur est purement géométrique; et ce morceau de synthèse peut être comparé à ce que les anciens géomètres nous ont laissé de plus parfait, et à l'ouvrage d'Huygens *de Horologio oscillatorio*.

Clairaut publia en 1743, son ouvrage sur la Théorie de la figure de la Terre. Il y donne les équations générales jusqu'alors inconnues, de l'équilibre des fluides soit homogènes, soit hétérogènes, ou composés d'un

nombre quelconque de fluides, quelles que soient les forces qui animent chacune de leurs molécules, et en supposant entre ces molécules une attraction mutuelle suivant une loi quelconque. Appliquant ensuite ces équations à la Terre, en la supposant formée d'une ou de plusieurs et même d'une infinité de fluides, tous circulant autour d'un même axe, il prouve que la figure elliptique satisfait à l'équilibre des couches de niveau, lorsque leur figure est peu différente de la forme sphérique; et il détermine les ellipticités de ces couches, et la loi de la pesanteur à la surface de la couche extérieure. Il parvient aux expressions des mêmes quantités, dans le cas général où la Terre serait formée d'un noyau elliptique recouvert d'un ou de plusieurs fluides, le noyau étant lui-même formé de couches elliptiques dont les figures et les densités varient du centre à la suface; et il est conduit à ce résultat remarquable, savoir, que si l'on nomme E l'ellipticité de la Terre, ou l'excès de l'axe de l'équateur sur celui des pôles pris pour unité; si l'on désigne par C l'excès de la pesanteur aux pôles sur la pesanteur à l'équateur prise pour unité de pesanteur; enfin, si l'on exprime par φ le rapport de la force centrifuge à l'équateur, à l'unité de pesanteur; la somme $E+C$, dans toutes les hypothèses que l'on peut faire sur la constitution intérieure de la Terre, est constante et égale à $\frac{5}{2}\varphi$: l'accroissement de la pesanteur de l'équateur aux pôles, est le produit de C par le carré du sinus de la latitude. L'importance de tous ces résultats et l'élégance avec laquelle ils sont présentés, placent cet ouvrage au rang des plus belles productions mathématiques.

Clairaut y expose une théorie de l'action capillaire; mais cette théorie me paraît insignifiante. En concevant un tuyau cylindrique d'un très petit diamètre intérieur, plongé verticalement dans un fluide par son extrémité inférieure, il analyse toutes les forces dont la colonne infiniment petite du fluide, passant par l'axe du tube, est animée, en supposant une attraction des molécules du tube sur celles du fluide, et des molécules fluides sur elles-mêmes; la loi d'attraction étant la même dans les deux cas relativement à la distance, mais pouvant différer d'intensité. Clairaut remarque ensuite, que parmi toutes les lois possibles d'attraction, il doit y en avoir une ou plusieurs qui donnent, conformément à l'expérience, l'élévation du fluide dans le tube, réciproque au diamètre intérieur du tube; mais la difficulté du problème, consiste à dé-

terminer ces lois. C'est ce que j'ai fait dans ma Théorie de l'action capillaire de laquelle il résulte que toutes les lois d'attraction, qui la rendent insensible à des distances sensibles, satisfont à l'expérience, et sont les seules qui puissent y satisfaire. Mais Clairaut était d'autant plus éloigné de ce résultat, qu'il supposait au contraire que l'attraction du tube sur le fluide est sensible sur les molécules fluides placées dans l'axe. Il a, cependant, été conduit par cette fausse supposition, à ce résultat dont j'ai fait voir l'exactitude, savoir, que le fluide sera toujours élevé dans le tube au-dessus du niveau, tant que le double de l'intensité de l'attraction des molécules du tube sur celle du fluide surpassera l'intensité de l'attraction des molécules fluides sur elles-mêmes. Ce n'est pas le seul exemple de suppositions fausses, ayant conduit à des vérités; mais la découverte d'une vérité n'appartient qu'à celui qui le premier la démontre.

La méthode que Clairaut a suivie dans sa Théorie de la figure de la Terre, quoique fort élégante, est limitée aux ellipsoïdes de révolution. D'Alembert dans ses Recherches sur le système du monde, publiées en 1754 et 1756, traita cet objet d'une manière beaucoup plus générale. Il détermina les attractions d'un sphéroïde très peu différent de la sphère et dont l'équation de la surface est algébrique, et d'un ordre quelconque, en le supposant même formé de couches de diverses densités; et il en conclut que la figure que ces couches doivent prendre peut satisfaire à la condition générale de leur équilibre, lorsqu'elles sont fluides et douées d'un mouvement de rotation. Cette condition est que la pesanteur soit perpendiculaire à la surface de chaque couche de niveau. D'Alembert employait une autre condition dont Lagrange a fait voir l'identité avec la précédente. Les recherches de d'Alembert, quoique générales, manquent de la clarté si nécessaire dans les calculs compliqués. Elles laissaient surtout à désirer la connaissance des rapports généraux et simples qui doivent exister entre la figure des sphéroïdes et leurs attractions. Ces rapports des grandeurs génératrices aux résultats qui en dérivent, n'intéressent pas moins les géomètres, que les solutions des problèmes

La grande supériorité de l'analyse sur la synthèse se fait principalement sentir dans les questions difficiles du système du monde, questions pour la plupart inaccessibles à la synthèse. Mais le problème des attractions des ellipsoïdes de révolution, résolu avec tant d'élégance, par

claurin, suivant la méthode synthétique, donnait à cette méthode, avantage sur l'analyse, que l'on devait s'empresser d'autant plus de e disparaître, qu'il était naturel d'attendre de l'application de l'ana- e à cet objet, non-seulement un moyen plus simple d'obtenir les ıltats de Maclaurin, mais encore une théorie complète des attractions ce genre de sphéroïdes. C'est, en effet, ce qui est arrivé. Dans les noires de l'Académie des Sciences de Berlin, pour l'année 1773, range, par une transformation heureuse des coordonnées, est parvenu analytiquement et de la manière la plus simple, aux résultats de Maclaurin : il les a étendus à des ellipsoïdes quelconques, et il en a déduit ce théorème que Maclaurin n'avait fait qu'énoncer, et que d'Alembert a démontré le premier, savoir, que l'attraction d'un ellipsoïde quelconque sur un point placé dans le prolongement d'un de ses axes, est à l'attraction d'un sphéroïde qui aurait le même centre et les mêmes foyers, et qui passerait par le point attiré, comme la masse du premier sphéroïde est à la masse du second. Il restait, pour compléter cette théorie, à déterminer l'attraction d'un ellipsoïde sur un point quelconque placé au dehors. M. Legendre, dans le tome X des Savans étrangers, l'a fait à l'égard des ellipsoïdes de révolution, par une analyse ingénieuse et savante qui donne pour tous les sphéroïdes de révolution, un rapport très simple, entre leur attraction sur un point placé dans le prolongement de leur axe de révolution, et leur attraction sur un point placé dans le prolongement d'un rayon quelconque, à la même distance du centre. Relativement aux ellipsoïdes de révolution, ce rapport fait voir que le quotient de l'attraction sur un point quelconque extérieur, divisée par la masse, est le même pour tous les ellipsoïdes de révolution qui ont le même centre et les mêmes foyers; et comme l'attraction à la surface est donnée par les théorèmes de Maclaurin; il ne s'agit, pour avoir l'attraction sur un point quelconque au dehors, que de faire passer par ce point un de ces ellipsoïdes, ce qui est facile. Il était naturel d'étendre ce résultat, aux ellipsoïdes qui ne sont pas de révolution. Mais sa démonstration présentait beaucoup de difficultés. Je l'ai donnée le premier, dans un ouvrage sur la Théorie du mouvement elliptique et de la figure des planètes, qui parut en 1784, et dans mon Traité de Mécanique céleste. Ayant établi un rapport général entre les attractions d'un sphéroïde sur un point quelconque extérieur, et ses attractions sur les points placés dans le prolongement

d'un de ses axes, et dans le plan perpendiculaire à cet axe; j'en ai déduit une nouvelle démonstration du résultat dont il s'agit. Enfin, M. Ivori est parvenu au même résultat par une transformation très heureuse des coordonnées, sans recourir aux séries. Tel a été le progrès des recherches par lesquelles les géomètres sont parvenus à une théorie complète des attractions des ellipsoïdes.

Maclaurin a fait voir qu'une masse fluide homogène, tournant autour d'un axe, pouvait être rigoureusement en équilibre avec une figure elliptique. Mais y a-t-il d'autres figures d'équilibre, lorsque le sphéroïde est très peu différent de la sphère? J'ai prouvé, sans connaître sa figure, que la pesanteur à sa surface suit la même loi que si cette figure était celle d'un ellipsoïde de révolution. M. Legendre a fait voir ensuite que si la figure est de révolution, elle doit, pour l'équilibre, être elliptique; et j'ai reconnu que cela est exact, sans supposer une figure de révolution. Mais d'Alembert a prouvé que plusieurs figures elliptiques d'équilibre correspondent à une même durée de rotation. J'ai démontré ensuite qu'il n'y en a que deux; et j'ai déterminé la limite de la durée de rotation que la masse peut avoir sans se dissiper. Mais le véritable problème à résoudre, consiste à déterminer la figure qu'une masse fluide doit prendre, lorsque ses molécules ayant été primitivement animées de forces quelconques, elles parviennent, à la longue, par leur frottement mutuel et par leur ténacité, à un état fixe d'équilibre. J'ai fait voir dans le troisième livre de la Mécanique céleste, que le fluide finit par prendre la figure d'un ellipsoïde de révolution dont l'équateur est le plan primitif du *maximum* des aires décrites par chaque molécule autour du centre de gravité de la masse. Le mouvement de rotation, ainsi que les axes de l'ellipsoïde de révolution, sont déterminés par ce *maximum*: il y a toujours une figure possible d'équilibre, et il n'y en a qu'une.

Enfin, j'ai donné dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, pour l'année 1782, et dans le troisième livre de la Mécanique céleste, une théorie générale des attractions des sphéroïdes. La fonction qui exprime la somme des molécules attirantes divisées respectivement par leurs distances au point attiré, a l'avantage d'exprimer par ses différences partielles, la résultante de ces attractions décomposées suivant une direction quelconque. J'ai reconnu à cette fonction, la propriété suivante : *la somme de ses trois différences partielles du second ordre,*

prises séparément par rapport à chacune des trois coordonnées rectangulaires du point attiré, est constamment égale à zéro. Cette équation fondamentale combinée avec une équation différentielle du premier ordre, à laquelle j'ai trouvé que la fonction dont il s'agit doit satisfaire, lorsque le point attiré est à la surface d'un sphéroïde homogène très peu différent de la sphère, m'a donné par le développement le plus facile, l'expression de l'attraction d'un sphéroïde formé de couches solides ou fluides de densités quelconques, douées d'un même mouvement de rotation, et dont les molécules s'attirent réciproquement au carré de la distance. Les rapports généraux et simples que cette expression donne entre les attractions et la figure des sphéroïdes, m'ont directement conduit à déterminer la figure des couches fluides dans l'état d'équilibre, et la loi de la pesanteur à leur surface. La fécondité de l'équation fondamentale qui sert de base à mon analyse, et qui se reproduit dans la théorie des fluides et dans celle de la chaleur, me porte à croire que les formules auxquelles je suis parvenu, sont les plus générales et les plus simples que l'on puisse obtenir.

Voici maintenant le précis des nouvelles recherches que j'ai ajoutées aux précédentes, et que j'ai publiées dans les volumes de la Connaissance des Tems et de l'Institut.

On voit par la Notice historique que je viens de donner des recherches des géomètres sur la figure de la Terre, qu'ils ont supposé le sphéroïde terrestre entièrement recouvert par la mer : mais ce fluide laissant à découvert, une partie considérable de ce sphéroïde; ces recherches, malgré leur généralité, ne représentent pas exactement la nature, et il est nécessaire de modifier les résultats obtenus dans l'hypothèse d'une inondation générale. A la vérité, la théorie mathématique de la figure de la Terre présente alors plus de difficultés; mais le progrès de l'analyse, surtout dans cette partie, fournit le moyen de les surmonter et de considérer les continens et les mers, tels que l'observation les présente. C'est l'objet de l'analyse suivante. En se rapprochant ainsi de la nature, on entrevoit les causes de plusieurs phénomènes importans que l'Histoire naturelle et la Géologie nous offrent; ce qui peut répandre un grand jour sur ces deux sciences, en les rattachant à la théorie du Système du monde. Voici les principaux résultats de mon analyse. L'un des plus intéressans est le théorème suivant, qui établit incontestablement l'hétérogénéité des couches du sphéroïde terrestre.

« Si à la longueur du pendule à secondes, observée sur un po
» quelconque de la surface du sphéroïde terrestre, on ajoute le prod
» de cette longueur, par la moitié de la hauteur de ce point au-des
» du niveau de l'Océan déterminée par l'observation du baromètre,
» divisée par le demi-axe du pôle ; l'accroissement de cette longu
» ainsi corrigée sera, de l'équateur aux pôles, dans l'hypothèse d'u
» densité de la Terre, constante au-dessous d'une profondeur peu cor
» dérable, le produit de cette longueur à l'équateur, par le carré
» sinus de la latitude et par cinq quarts du rapport de la force
» centrifuge à la pesanteur à l'équateur, ou par 43 dix-millièmes. »

Ce théorème auquel j'ai été conduit par l'équation différentielle du premier ordre, qui a lieu à la surface des sphéroïdes homogènes peu différens de la sphère, et dont j'ai parlé ci-dessus, est généralement vrai, quelles que soient la densité de la mer et la manière dont elle recouvre en partie la Terre. Il est remarquable, en ce qu'il ne suppose point la connaissance de la figure du sphéroïde terrestre, ni celle de la mer, qu'il serait impossible d'obtenir.

Les expériences du pendule, faites dans les deux hémisphères, s'accordent à donner au carré du sinus de la latitude, un coefficient plus grand que 43 dix-millièmes, et à fort peu près égal à 54 dix-millièmes de la longueur du pendule à l'équateur. Il est donc bien prouvé par ces expériences, que la Terre n'est point homogène dans son intérieur. On voit de plus, en les comparant à l'analyse, que les densités des couches terrestres vont en croissant de la surface au centre.

La régularité avec laquelle la variation observée des longueurs du pendule à secondes suit la loi du carré du sinus de la latitude, prouve que ces couches sont disposées régulièrement autour du centre de gravité de la Terre, et que leur forme est à peu près elliptique et de révolution.

L'ellipticité du sphéroïde terrestre peut être déterminée par la mesure des degrés du méridien. Les diverses mesures que l'on a faites, comparées deux à deux, donnent des ellipticités sensiblement différentes; en sorte que la variation des degrés ne suit pas aussi exactement que celle de la pesanteur, la loi du carré du sinus de la latitude. J'ai remarqué dans le troisième livre, que cela tient aux secondes différentielle du rayon terrestre, que renferment les expressions des degrés du méridien et du rayon osculateur; tandis que l'expression de la pesanteur ne contient

: les premières différentielles de ce rayon dont les petits écarts d'un on elliptique, s'accroissent par les différentiations successives. Mais l'on compare des degrés éloignés, tels que ceux de France et de juateur; leurs anomalies doivent être peu sensibles sur leur différence; l'on trouve par cette comparaison, l'ellipticité du sphéroïde terrestre le à $\frac{1}{308}$.

Mais un moyen plus précis d'avoir cette ellipticité, consiste à comrer avec un grand nombre d'observations, deux inégalités lunaires dues à l'aplatissement de la Terre, l'une en longitude, et l'autre en latitude. Lorsque je parvins par la théorie, aux expressions analytiques de ces deux inégalités; je priai successivement MM. Bouvard, Burg et Burckardt, de faire cette comparaison. Ils y ont employé plusieurs milliers d'observations lunaires faites depuis Bradley jusqu'à nos jours. Les résultats de leurs calculs, s'accordent à donner l'aplatissement du sphéroïde terrestre, à très peu près égal à $\frac{1}{306}$; et ce qui est digne de remarque, chacune des deux inégalités conduit à ce résultat qui, comme on voit, diffère très peu de celui que donne la comparaison des degrés de France et de l'équateur.

La densité de la mer n'étant qu'un cinquième à peu près, de la moyenne densité de la Terre; ce fluide doit avoir peu d'influence sur les variations des degrés et de la pesanteur, et sur les deux inégalités lunaires dont je viens de parler. Son influence est encore diminuée par la petitesse de sa profondeur moyenne que l'on prouve ainsi. En concevant le sphéroïde terrestre dépouillé de l'Océan, et supposant que dans cet état, sa surface devienne fluide, et soit en équilibre; on aura son ellipticité, par le théorème de Clairaut dont j'ai parlé ci-dessus, en retranchant de cinq fois la moitié du rapport de la force centrifuge à la pesanteur à l'équateur, le coefficient que les expériences donnent au carré du sinus de la latitude, dans l'expression de la longueur du pendule à secondes, cette longueur à l'équateur étant prise pour l'unité. On trouve par là $\frac{1}{310}$ pour l'aplatissement du sphéroïde terrestre. Le peu de différence de cet aplatissement, à ceux que donnent les mesures des degrés terrestres et les inégalités lunaires, prouve que la surface de ce sphéroïde, serait à fort peu près celle de l'équilibre, si elle devenait fluide. De là, et de ce que la mer laisse à découvert de vastes continens,

on conclut qu'elle doit être peu profonde, et que sa profondeur moyenne est du même ordre que la hauteur moyenne des continens et des îles au-dessus de son niveau, hauteur qui ne surpasse pas mille mètres. Cette profondeur est donc une petite fraction de l'excès du rayon de l'équateur sur celui du pôle, excès qui surpasse vingt mille mètres. Mais de même que de hautes montagnes recouvrent quelques parties des continens, de même il peut y avoir de grandes cavités dans le bassin des mers. Cependant, il est naturel de penser que leur profondeur est plus petite que l'élévation des hautes montagnes; les dépôts des fleuves et les dépouilles des animaux marins, entraînés par les courans, devant remplir à la longue, ces cavités.

Ce résultat est important pour l'Histoire naturelle et pour la Géologie. On ne peut douter que la mer n'ait recouvert une grande partie de nos continens sur lesquels elle a laissé des traces incontestables de son séjour. Les affaissemens successifs des îles d'alors et d'une partie des continens, suivis d'affaissemens étendus du bassin des mers, qui ont découvert les parties précédemment submergées, paraissent indiqués par les divers phénomènes que la surface et les couches des continens actuels nous présentent. Pour expliquer ces affaissemens, il suffit de supposer plus d'énergie à des causes semblables à celles qui ont produit les affaissemens dont l'histoire a conservé le souvenir. L'affaissement d'une partie du bassin de la mer, en découvre une autre partie d'autant plus étendue que la mer est moins profonde. Ainsi de vastes continens ont pu sortir de l'Océan sans de grands changemens dans la figure du sphéroïde terrestre. La propriété dont jouit cette figure, de différer peu de celle que prendrait sa surface en devenant fluide, exige que l'abaissement du niveau de la mer, n'ait été qu'une petite fraction de la différence des deux axes du pôle et de l'équateur. Toute hypothèse fondée sur un déplacement considérable des pôles à la surface de la Terre, doit être rejetée, comme incompatible avec la propriété dont je viens de parler. On avait imaginé ce déplacement pour expliquer l'existence des éléphans dont on trouve les ossemens fossiles en si grande abondance dans les climats du nord où les éléphans actuels ne pourraient pas vivre. Mais un éléphant que l'on suppose avec vraisemblance, contemporain du dernier cataclysme, et que l'on a trouvé dans une masse de glace, bien conservé avec ses chairs et dont la peau était recouverte d'une grande quantité de poils, a prouvé que cette espèce d'éléphans était garantie

par ce moyen, du froid des climats septentrionaux qu'elle pouvait habiter et même rechercher. La découverte de cet animal a donc confirmé ce que la théorie mathématique de la Terre nous apprend, savoir que dans les révolutions qui ont changé la surface de la Terre, et détruit plusieurs espèces d'animaux et de végétaux, la figure du sphéroïde terrestre et la position de son axe de rotation sur sa surface, n'ont subi que de légères variations.

Maintenant, quelle est la cause qui a donné aux couches du sphéroïde terrestre, des formes à très peu près elliptiques et de densités croissantes de la surface au centre; qui les a disposées régulièrement autour de leur centre commun de gravité, et qui a rendu sa surface très peu différente de celle qu'elle eût prise, si elle avait été primitivement fluide? Si les diverses substances qui composent la Terre, ont eu primitivement, par l'effet d'une grande chaleur, l'état fluide; les plus denses ont dû se porter vers le centre: toutes ont pris des formes elliptiques, et la surface a été en équilibre. En se consolidant, ces couches n'ont changé que très peu de figure, et alors la Terre doit offrir présentement les phénomènes dont je viens de parler. Ce cas a été amplement discuté par les géomètres. Mais la Terre homogène dans le sens chimique, ou formée d'une seule substance dans son intérieur, pourrait encore nous présenter ces phénomènes. On conçoit, en effet, que le poids immense des couches supérieures peut augmenter considérablement la densité des couches inférieures. Jusqu'ici les géomètres n'ont point fait entrer dans leurs recherches sur la figure de la Terre, la compressibilité des substances dont elle est formée; quoique Daniel Bernoulli, dans sa pièce sur le flux et le reflux de la mer, eût déjà indiqué cette cause de l'accroissement de densité des couches du sphéroïde terrestre. J'ai pensé que l'on verrait avec quelque intérêt, l'analyse suivante de laquelle il suit qu'il est possible de satisfaire à tous les phénomènes connus, en supposant la Terre formée d'une seule substance dans son intérieur. La loi des densités que la compression donne aux couches de cette substance, n'étant pas connue, on ne peut faire à cet égard, que des hypothèses.

On sait que la densité des gaz croît proportionnellement à leur compression, lorsque la température reste la même. Mais cette loi ne paraît pas convenir aux corps liquides et solides: il est naturel de penser que ces corps résistent d'autant plus à la compression, qu'ils sont plus comprimés. C'est, en effet, ce que les expériences confirment; en sorte

que le rapport de la différentielle de la pression, à la différentielle la densité, au lieu d'être constant, comme dans les gaz, croît avec densité. L'expression la plus simple de ce rapport supposé variable, est produit de la densité par une constante. C'est la loi que j'ai adopt parce qu'elle réunit à l'avantage de représenter de la manière la p simple, ce que nous savons sur la compression des corps, celui de prêter facilement au calcul, dans la recherche de la figure de la Ter mon objet dans ce calcul, n'étant que de montrer que cette manière considérer la constitution intérieure de la Terre, peut se concilier av tous les phénomènes qui dépendent de cette constitution, du moins si le sphéroïde terrestre a été primitivement fluide. Dans l'état solide, l'adhérence des molécules diminue extrêmement leur compression mutuelle, et elle empêcherait la masse entière de prendre la figure régulière qu'elle aurait dans l'état fluide, si elle s'en était primitivement écartée. Ainsi, dans cette hypothèse même sur la constitution de la Terre, comme dans toutes les autres, la fluidité primitive de la Terre me paraît nécessairement indiquée par la régularité de la pesanteur et de la figure de sa surface.

Toute l'Astronomie repose sur l'invariabilité de l'axe de rotation de la Terre à la surface du sphéroïde terrestre, et sur l'uniformité de cette rotation. La durée d'une révolution de la Terre, autour de son axe, est l'étalon du temps; il est donc bien important d'apprécier l'influence de toutes les causes qui peuvent altérer cet élément. L'axe terrestre se meut autour des pôles de l'écliptique; mais depuis l'époque où l'application du télescope aux instrumens astronomiques a donné le moyen d'observer avec précision, les latitudes terrestres, on n'a reconnu dans ces latitudes, aucune variation qui ne puisse être attribuée aux erreurs des observations; ce qui prouve que l'axe de rotation a, depuis cette époque, répondu à très peu près au même point de la surface terrestre; il paraît donc que cet axe est invariable. L'existence d'axes semblables dans les corps solides est connue depuis long-temps. On sait que chacun de ces corps a trois axes principaux rectangulaires, autour desquels il peut tourner uniformément, l'axe de rotation demeurant invariable. Mais cette propriété remarquable est-elle commune aux corps qui, comme la Terre, sont recouverts en partie, d'un fluide? La condition de l'équilibre du fluide s'ajoute alors aux conditions des axes principaux : elle change la figure de la surface, lorsque l'on fait changer

: rotation. Il s'agit donc de savoir si parmi tous les changemens
:s, il en est un dans lequel l'axe de rotation et l'équilibre du
ont invariables. Pour cela, je fais voir que si l'on fait passer
:s du centre de gravité du sphéroïde terrestre, un axe fixe autour
il puisse tourner librement; la mer pourra toujours prendre sur
ce du sphéroïde, un état constant d'équilibre. Je donne pour
ner cet état, une méthode d'approximation, ordonnée suivant
sances du rapport de la densité de la mer à la moyenne densité

de la Terre, rapport qui n'étant que $\frac{1}{5}$, rend l'approximation convergente. L'irrégularité de la profondeur de la mer et de son contour, ne permet pas d'obtenir cette approximation. Mais il suffit d'en reconnaître la possibilité, pour être assuré de l'existence d'un état d'équilibre de la mer. La position de l'axe fixe de rotation étant arbitraire; il est naturel de penser que parmi tous les changemens que l'on peut faire subir à cette position, il en est un dans lequel l'axe passe par le centre commun de gravité de la mer et du sphéroïde qu'elle recouvre, de manière que ce fluide étant en équilibre et congelé dans cet état, cet axe soit un axe principal de rotation de l'ensemble du sphéroïde terrestre et de la mer : il est visible qu'en rendant à la masse congelée, sa fluidité, l'axe sera toujours un axe invariable de la Terre entière. Je fais voir par l'analyse, qu'un tel axe est toujours possible, et je donne les équations qui déterminent sa position. En appliquant ces équations au cas où la mer recouvre en entier le sphéroïde, je parviens à ce théorème.

« Si l'on imagine la densité de chaque couche du sphéroïde terrestre,
» diminuée de la densité de la mer; et si, par le centre de gravité de
» ce sphéroïde imaginaire, on conçoit un axe principal de rotation de
» ce sphéroïde; en faisant tourner la Terre autour de cet axe, la mer
» étant en équilibre, cet axe sera l'axe principal de la Terre entière
» dont le centre de gravité sera celui du sphéroïde imaginaire. »

Ainsi, la mer qui recouvre en partie le sphéroïde terrestre, non-seulement ne rend pas impossible, l'existence d'un axe principal, mais encore par sa mobilité et par les résistances que ses oscillations éprouvent, elle rendrait à la Terre, un état permanent d'équilibre, si des causes quelconques venaient à le troubler.

Si la mer était assez profonde pour recouvrir la surface du sphéroïde terrestre, en le supposant tourner successivement autour des trois axes

principaux du sphéroïde imaginaire dont nous venons de parler; chacun de ces axes serait un axe principal de la Terre entière. Mais la stabilité de l'axe de rotation n'a lieu, comme dans un corps solide, que relativement aux deux axes principaux pour lesquels le moment d'inertie est un *maximum* ou un *minimum*. Il y a cependant entre un corps solide et la Terre, cette différence, savoir qu'en changeant d'axe de rotation, le corps solide ne change pas de figure; au lieu que par ce changement, la surface de la mer prend une autre figure. Les trois figures que prend cette surface, en tournant successivement avec une même vitesse angulaire de rotation, autour de chacun des trois axes de rotation du sphéroïde imaginaire, ont des rapports fort simples que je détermine; et il résulte de mon analyse, que le rayon moyen entre les rayons des trois surfaces de la mer, correspondans au même point de la surface du sphéroïde terrestre, est égal au rayon de la surface de la mer en équilibre sur ce sphéroïde privé de tout mouvement de rotation.

J'ai discuté dans le cinquième livre, l'influence des causes intérieures telles que les volcans, les tremblemens de terre, les vents, les courans de la mer, etc., sur la durée de la rotation de la Terre; et j'ai fait voir au moyen du principe des aires, que cette influence est insensible, et qu'il faudrait pour produire un effet sensible, qu'en vertu de ces causes, des masses considérables eussent été transportées à de grandes distances; ce qui n'a point eu lieu depuis les temps historiques. Mais il existe une cause intérieure d'altération de la durée du jour, que l'on n'a point encore considérée, et qui, vu l'importance de cet élément, mérite une discussion spéciale. Cette cause est la chaleur du sphéroïde terrestre. Si, comme tout porte à le croire, la Terre entière a été primitivement fluide; ses dimensions ont diminué successivement avec sa température: sa vitesse angulaire de rotation a augmenté graduellement, et elle continuera de s'accroître, jusqu'à ce que la Terre soit parvenue à l'état constant de température moyenne de l'espace où elle se meut. Pour avoir une idée juste de cet accroissement de vitesse angulaire, que l'on imagine dans un espace d'une température donnée, un globe de matière homogène, tournant sur son axe dans un jour. Si l'on transporte ce globe dans un espace dont la température soit moindre d'un degré centésimal, et si l'on suppose que sa rotation ne soit altérée, ni par la résistance d'un milieu, ni par le frottement; ses dimensions diminueront par la diminution de la température; et lorsqu'à la longue, il aura pris

la température du nouvel espace, son rayon sera diminué d'une quantité que je supposerai être un cent-millième, ce qui a lieu à peu près pour un globe de verre, et ce que l'on peut admettre pour la Terre. Le poids de la chaleur a été inappréciable dans toutes les expériences que l'on a faites pour le mesurer; elle paraît donc, comme la lumière, n'apporter aucune variation sensible dans la masse des corps; ainsi, dans le nouvel espace, deux choses peuvent être supposées les mêmes que dans le premier, savoir, la masse du globe, et la somme des aires décrites dans un temps donné, par chacune de ses molécules rapportées au plan de son équateur. Les molécules se rapprochent du centre du globe, d'un cent-millième de leur distance à ce point. L'aire qu'elles décrivent sur le plan de l'équateur étant proportionnelle au carré de cette distance, diminuerait donc à fort peu près d'un cinquante-millième, si la vitesse angulaire de rotation n'augmentait pas; d'où il suit que pour la constance de la somme des aires dans un temps donné, l'accroissement de cette vitesse, et par conséquent la diminution de la durée de la rotation doivent être d'un cinquante-millième: telle est donc la diminution finale de cette durée. Mais avant de parvenir à son état final, la température du globe diminue sans cesse, et plus lentement au centre qu'à la surface; en sorte que par les observations de cette diminution, comparées à la théorie de la chaleur, on pourrait déterminer l'époque où le globe a été transporté dans le nouvel espace. La Terre paraît être dans un état semblable. Cela résulte des observations thermométriques faites dans des mines profondes, et qui indiquent un accroissement de chaleur, très sensible à mesure que l'on pénètre dans l'intérieur de la Terre. La moyenne des accroissemens observés paraît être d'un degré centésimal pour un enfoncement de 32 mètres; mais un très grand nombre d'observations fera connaître exactement sa valeur qui peut n'être pas la même dans tous les climats (1).

(1) Imaginons au-dessous d'un plateau d'une grande étendue et à la profondeur d'environ trois mille mètres, un vaste réservoir d'eau entretenue par les eaux pluviales. Elles acquièrent à cette profondeur, par la chaleur terrestre, une température à peu près égale à celle de l'eau bouillante. Supposons ensuite que par la pression des colonnes d'eau, adjacentes, ou par les vapeurs qui s'élèvent du réservoir, les eaux remontent jusqu'à la hauteur de la partie inférieure du plateau d'où elles s'écoulent ensuite; elles formeront une source d'eau chaude imprégnée des substances solubles des couches qu'elle aura traversées; ce qui donne une explication vraisemblable des eaux thermales.

Il était nécessaire pour avoir l'accroissement de la rotation de Terre, de connaître la loi de diminution de la chaleur, du centre à surface. C'est ce que j'ai fait pour un globe primitivement échauffé d'u manière quelconque, et de plus soumis à l'action échauffante d'une ca extérieure. La loi dont il s'agit, que j'ai publiée en 1819 dans recueil de la Connaissance des Tems, et que M Poisson a confirm depuis par une savante analyse, est représentée par une suite infinie termes qui ont pour facteurs, des quantités constantes successiveme plus petites que l'unité, et dont les exposans croissent proportionne lement au temps. La longueur du temps fait ainsi disparaître ces termes, les uns après les autres; en sorte qu'avant l'établissement de la température finale, il n'y a de sensible, qu'un seul de ces termes qui produit l'accroissement de température dans l'intérieur du globe. Je suppose la Terre parvenue à cet état dont elle est, peut-être, encore fort éloignée. Mais ne cherchant ici qu'à présenter un aperçu de l'influence de la diminution de sa chaleur intérieure, sur la durée du jour; j'ai adopté cette hypothèse, et j'en ai conclu l'accroissement de la vitesse de rotation. Il fallait pour réduire cet accroissement en nombres, déterminer numériquement deux constantes arbitraires dépendantes, l'une, de la faculté conductrice de la Terre pour la chaleur, l'autre, de l'élévation de température de sa couche superficielle, au-dessus de la température de l'espace qui l'environne. J'ai déterminé la première constante, au moyen des variations de la chaleur annuelle à divers profondeurs; et pour cela, j'ai fait usage des expériences de M de Saussure, que ce savant a citées dans le n° 1422 de son voyage dans les Alpes. Dans ces expériences, la variation annuelle de la chaleur à la surface, a été réduite à un douzième, à la profondeur de $9^m,6$. J'ai supposé ensuite, que dans nos mines, l'accroissement de la chaleur est d'un degré centésimal, pour un enfoncement de 32 mètres; et que la dilatation linéaire des couches terrestres est d'un cent-millième pour chaque degré de température. Je trouve au moyen de ces données, que la durée du jour n'a pas augmenté d'un demi-centième de seconde centésimale, depuis deux mille ans; ce qui est dû principalement à la grandeur du rayon terrestre.

A la vérité, j'ai supposé la Terre homogène, et il est incontestable que les densités de ses couches croissent de la surface au centre. Mais on doit observer ici que la quantité de chaleur et son mouvement seraient

es dans une substance hétérogène, si dans les parties correspon-
es deux corps, la chaleur et la propriété de la conduire étaient
s. La matière peut être ici considérée comme un véhicule de la
qui peut être le même dans des substances de densités diffé-
n'en est pas ainsi des propriétés dynamiques qui dépendent
se des molécules. Ainsi, nous pouvons dans cet aperçu des effets
leur terrestre sur la durée du jour, étendre à la Terre hétéro-
données sur la chaleur, relatives à la Terre homogène. On trouve ainsi que l'accroissement de densité des couches du sphéroïde terrestre, diminue l'effet de la chaleur sur la durée du jour, effet qui depuis Hipparque, n'a pas augmenté cette durée, de $\frac{1''}{300}$.

Le terme dont dépend l'accroissement de la chaleur intérieure de la Terre, n'ajoute pas maintenant un cinquième de degré, à la température moyenne de sa surface. Son anéantissement, qu'une très longue suite de siècles doit produire, ne fera donc disparaître aucune des espèces d'êtres organisés, actuellement existantes, du moins, tant que la chaleur propre du Soleil et sa distance à la Terre n'éprouveront point d'altération sensible.

Au reste, je suis fort éloigné de penser que les suppositions précédentes sont dans la nature : d'ailleurs, les valeurs observées des deux constantes dont j'ai parlé, dépendent de la nature du sol qui dans diverses contrées, n'a pas les mêmes qualités relatives à la chaleur. Mais l'aperçu que je viens de présenter, suffit pour faire voir que les phénomènes observés sur la chaleur de la Terre, peuvent se concilier avec le résultat que j'ai déduit de la comparaison de la théorie des inégalités séculaires de la Lune, avec les observations des anciennes éclipses, savoir que depuis Hipparque, la durée du jour n'a pas varié d'un centième de seconde.

CHAPITRE II.

De la figure de la Terre.

2. La figure de chaque couche du sphéroïde terrestre étant à fort peu près sphérique; j'exprimerai comme dans le troisième livre de la Mécanique céleste, son rayon par $a.(1+\alpha y)$, α étant un très petit coefficient constant. Je désignerai par ρ la densité de cette couche, ρ étant fonction de a. Je nommerai V la somme des quotiens de chaque molécule du sphéroïde terrestre, divisée par sa distance à un point extérieur attiré; r étant la distance de ce point à l'origine des rayons terrestres, placée très près du centre de gravité de la Terre. Enfin, je nommerai μ le cosinus de l'angle que r fait avec une droite invariable sur la surface du sphéroïde, et que je prendrai pour son axe; et je nommerai ω l'angle que le plan passant par cet axe et par r, forme avec un méridien fixe sur la surface du sphéroïde. On peut supposer y développé dans une série de cette forme,

$$y = Y^{(1)} + Y^{(2)} + Y^{(3)} + \text{etc.};$$

$Y^{(i)}$ étant une fonction de a, et de μ, $\sqrt{1-\mu^2}.\sin.\omega$, $\sqrt{1-\mu^2}.\cos.\omega$, fonction rationnelle et entière relativement à ces trois dernières quantités, et telle que l'on a généralement

$$0 = \left\{\frac{d.\left[(1-\mu^2)\left(\frac{dY^{(i)}}{d\mu}\right)\right]}{d\mu}\right\} + \frac{\left(\frac{ddY^{(i)}}{d\omega^2}\right)}{1-\mu^2} + i.\overline{i+1}.Y^{(i)}.$$

La formule (5) du n° 14 du troisième livre devient ainsi

$$V = \frac{4\pi}{3r}\int\rho.d.a^3 + 4\alpha\pi\int\rho.d.\left(\frac{a^4Y^{(1)}}{3r^2} + \frac{a^5Y^{(2)}}{5.r^3} + \frac{a^6Y^{(3)}}{7r^4} + \text{etc.}\right);$$

π étant le rapport de la circonférence au diamètre : les différentielles et les intégrales sont relatives à la variable a, et celles-ci sont prises depuis a nul, jusqu'à sa valeur à la surface du sphéroïde, valeur que je prendrai pour l'unité.

Concevons maintenant la mer en équilibre sur ce sphéroïde doué d'un mouvement de rotation. Soit $\alpha\varphi$ le rapport de la force centrifuge à la pesanteur, à l'équateur; et désignons par V' la somme de toutes les molécules de la mer, divisées par leurs distances respectives au point attiré. Si l'on suppose ce point à la surface de la mer; on aura par les n°s 23 et 29 du troisième livre, pour l'équation de l'équilibre de la mer,

$$\text{constante} = \frac{4}{3r}.\pi.\int\rho.d.a^3 + 4\alpha\pi.\int\rho.d.\left(\frac{a^4Y^{(1)}}{3r^2} + \frac{a^5Y^{(2)}}{5r^3} + \frac{a^6Y^{(3)}}{7r^4} + \text{etc.}\right)$$
$$+ V' - \frac{\alpha\varphi r^2}{2}.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right).\frac{4}{3}\pi.\int\rho.d.a^3; \qquad (1).$$

Pour déterminer V', je supposerai que le rayon mené de l'origine des rayons terrestres, à la surface de la mer, soit $1 + \alpha\bar{y} + \alpha y'$, $\bar{y}$ étant la valeur de y à la surface du sphéroïde : $\alpha y'$ sera à très peu près la profondeur de la mer. Je supposerai ensuite

$$y' = Y'^{(0)} + Y'^{(1)} + Y'^{(2)} + Y'^{(3)} + \text{etc.};$$

$Y'^{(i)}$ étant une fonction rationnelle et entière de μ, $\sqrt{1-\mu^2}.\sin\omega$, $\sqrt{1-\mu^2}.\cos\omega$, assujettie à la même équation aux différences partielles que $Y^{(i)}$. On peut considérer la mer, comme égale à un sphéroïde dont le rayon est $1 + \alpha\bar{y} + \alpha y'$, moins un second sphéroïde dont le rayon est $1 + \alpha\bar{y}$, plus la partie de ce sphéroïde, qui se relève au-dessus du premier, et où, par conséquent, $\alpha y'$ est négatif. La somme des molécules du premier sphéroïde, divisées par leurs distances au point attiré, est par le n° 11, du troisième livre, en prenant pour unité, la densité de la mer,

$$\frac{4\pi}{3r} + 4\alpha\pi.\left(\frac{Y'^{(0)}}{r} + \frac{(\bar{Y}^{(1)} + Y'^{(1)})}{3r^2} + \frac{(\bar{Y}^{(2)} + Y'^{(2)})}{5r^3} + \text{etc.}\right),$$

$\bar{Y}^{(1)}$, $\bar{Y}^{(2)}$, etc, étant ce que deviennent $Y^{(1)}$, $Y^{(2)}$, etc., à la surface du sphéroïde terrestre. La même somme relative au second sphéroïde est

$$\frac{4\pi}{3r} + 4\alpha\pi.\left(\frac{\bar{Y}^{(1)}}{3r^2} + \frac{\bar{Y}^{(2)}}{5r^3} + \frac{\bar{Y}^{(3)}}{7r^4} + \text{etc.}\right);$$

la différence de ces deux quantités est

$$4\alpha\pi.\left(\frac{Y'^{(0)}}{r} + \frac{Y'^{(1)}}{3r^2} + \frac{Y'^{(2)}}{5r^3} + \frac{Y'^{(3)}}{7r^4} + \text{etc.}\right);$$

en nommant donc V'' la somme des molécules du second sphéroïde qui se relèvent au-dessus du premier, et divisées par leurs distances respectives au point attiré, on aura

$$V' = V'' + 4\alpha\pi.\left(\frac{Y'^{(0)}}{r} + \frac{Y'^{(1)}}{3r^2} + \frac{Y'^{(2)}}{5r^3} + \text{etc.}\right).$$

L'équation précédente de l'équilibre de la mer deviendra ainsi

$$\begin{aligned}\text{const} = \frac{4\pi}{3r}.\int\rho.d.a^3 &+ 4\alpha\pi.\int\rho.d.\left(\frac{a^4Y^{(1)}}{3r^2} + \frac{a^5Y^{(2)}}{5r^3} + \frac{a^6Y^{(3)}}{7r^4} + \text{etc.}\right)\\ &+ 4\alpha\pi.\left(\frac{Y'^{(0)}}{r} + \frac{Y'^{(1)}}{3r^2} + \frac{Y'^{(2)}}{5r^3} + \frac{Y'^{(3)}}{7r^4} + \text{etc.}\right), \quad (2)\\ &+ V'' - \frac{\alpha\Phi}{2}.r^2.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right).\frac{4}{3}.\pi.\int\rho.d.a^3,\end{aligned}$$

r devant être supposé après les intégrations, égal à $1 + \alpha\bar{y} + \alpha y'$, et par conséquent égal à l'unité, dans les termes multipliés par α; puisqu'on néglige les termes de l'ordre α^2.

Cette équation a cela de remarquable, savoir que la différentielle de son second membre, prise par rapport à r, et divisée par $-dr$, est l'expression de la pesanteur, comme il résulte du n° 33 du troisième livre; en nommant donc p la pesanteur, on aura

$$\begin{aligned}p = \frac{4\pi}{3r^2}.\int\rho.d.a^3 &+ 4\alpha\pi.\int\rho.d.\left(\frac{2a^4.Y^{(1)}}{3r^3} + \frac{3a^5.Y^{(2)}}{5r^4} + \text{etc.}\right)\\ &+ 4\alpha\pi.\left(\frac{Y'^{(0)}}{r^2} + \frac{2Y'^{(1)}}{3r^3} + \frac{3Y'^{(2)}}{5r^4} + \text{etc.}\right) \quad (3)\\ &- \left(\frac{dV''}{dr}\right) + \alpha\Phi.r.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right).\frac{4}{3}.\pi\int\rho.d.a^3.\end{aligned}$$

On a par le n° 10 du troisième livre, à la surface de la mer,

$$0 = \left(\frac{dV''}{dr}\right) + \frac{1}{2}V''. \quad (a)$$

Cette équation remarquable étant très utile pour ce qui va suivre; je vais en rappeler ici la démonstration.

Si l'on conçoit une sphère du rayon a, et dont la densité soit exprimée par l'unité, la somme de ses molécules divisées par leurs distances respectives à un point extérieur attiré dont r est la distance à son centre,

le n° 12 du premier livre, la masse de la sphère, divisée par r; nant donc par V, cette somme, on aura

$$V = \frac{4}{3}\pi . \frac{a^3}{r}.$$

nant, si l'on imagine une molécule dm très voisine de la sur-sphère, et à la distance a' de son centre; sa distance au point

$$\sqrt{r^2 - 2a'r.\cos\gamma + a'^2},$$

γ étant l'angle compris entre r et a'. Le quotient de cette molécule divisée par sa distance au point attiré, sera

$$\frac{dm}{\sqrt{r^2 - 2a'r.\cos\gamma + a'^2}}.$$

Nommons V ce quotient; on aura

$$\left(\frac{dV}{dr}\right) = -\frac{dm.(r - a'.\cos\gamma)}{(r^2 - 2a'r.\cos\gamma + a'^2)^{\frac{3}{2}}};$$

ce qui donne

$$r\left(\frac{dV}{dr}\right) + \frac{1}{2}V = -\frac{dm.(r^2 - a'^2)}{2.[(r - a')^2 + 2a'r.(1 - \cos\gamma)]^{\frac{3}{2}}}.$$

Si le point attiré est très près de la surface de la sphère, ainsi que la molécule dm, alors $r^2 - a'^2$ est une quantité insensible que l'on peut négliger; et l'équation précédente devient

$$r\left(\frac{dV}{dr}\right) + \frac{1}{2}V = 0.$$

La même équation a lieu pour d'autres molécules situées comme dm, très près de la surface de la sphère; en nommant donc V'' la somme des V relatifs à ces diverses molécules, on aura

$$r\left(\frac{dV''}{dr}\right) + \frac{1}{2}.V'' = 0;$$

et r étant très peu différent de a, on aura l'équation (a)

$$a.\left(\frac{dV''}{dr}\right) + \frac{1}{2}V'' = 0.$$

Le raisonnement précédent cesse d'avoir lieu, lorsque le point attiré est très près de la molécule dm; car alors $\cos\gamma$ diffère très peu de l'unité, et la fonction

$$\frac{-dm\ (r^2 - a'^2)}{2.[(r - a')^2 + 2a'r.(1 - \cos\gamma)]^{\frac{3}{2}}}; \qquad (f)$$

devient très grande par la petitesse de son diviseur, à moins que la molécule dm ne décroisse à mesuré qu'elle approche du point attiré : si, par exemple, ce décroissement, à partir du contact de la molécule, avait pour facteur le carré $r^2 - 2q'r.\cos\gamma + a'^2$ de la distance de ces deux points, la fonction précédente resterait toujours insensible.

Concevons un sphéroïde très peu différent d'une sphère, et supposons le point attiré, à sa surface. Imaginons à ce point une sphère intérieure au sphéroïde, tangente à sa surface, et d'un rayon a très peu différent du rayon du sphéroïde. Alors, si l'on désigne par V'' la somme des molécules de l'excès du sphéroïde sur la sphère, divisées par leurs distances au point attiré; si l'on fixe l'origine des r au centre de cette sphère, et si dm est une de ces molécules; l'intégrale de la fonction (f) prise par rapport au système de ces molécules, pourra être supposée nulle; parce que les molécules dm sont nulles au point de contact, et que leur expression près de ce point, a pour facteur, le carré de leur distance à ce point. L'équation (a) subsiste donc pour ce point. Relativement à la sphère tangente, on a

$$r.\left(\frac{dV}{dr}\right) = -\frac{4}{3}\pi.\frac{a^3}{r},$$

en supposant donc que V' exprime la somme de toutes les molécules du sphéroïde, divisées par leurs distances au point attiré, ce qui donne $V' = V + V''$; on aura en supposant le point attiré, au point de contact de la sphère et du sphéroïde,

$$a\left(\frac{dV'}{dr}\right) + \frac{1}{2}V' = -\frac{2}{3}\pi.a^2; \qquad (b)$$

c'est l'équation que j'ai donnée dans le n° 10 du troisième livre. Ici l'origine de r est au centre de la sphère tangente. Fixons cette origine, à un point quelconque très proche du centre de gravité du sphéroïde, et désignons par $a.(1 + \alpha y)$ le rayon de ce sphéroïde, α étant un très petit coefficient constant. L'attraction de ce sphéroïde dirigée vers l'origine de r est $-\left(\frac{dV'}{dr}\right)$, et il est facile de voir qu'elle est aux quantités près de l'ordre α^2, la même, quelle que soit cette origine, pourvu que cette origine ne s'écarte que d'une quantité de l'ordre α, du centre de gravité du sphéroïde; car cette attraction composée avec une force qui lui est

perpendiculaire et de l'ordre α, produit la pesanteur totale, dont elle ne diffère par conséquent, que d'une quantité de l'ordre α^2. Ainsi, l'équation précédente (b) subsiste en fixant l'origine de r, à un point quelconque situé fort près du centre de gravité du sphéroïde.

Telle est la démonstration que j'ai donnée de cette équation, dans l'endroit cité de la Mécanique céleste. Quelques géomètres ne l'ayant pas bien saisie, l'ont jugée inexacte. Lagrange, dans le tome VIII du Journal de l'Ecole Polytechnique, a démontré cette équation, par une analyse à peu près semblable à celle qui me l'avait fait découvrir (Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1775, page 83). C'est pour simplifier cette matière, que j'ai préféré de donner dans la Mécanique céleste, la démonstration précédente.

Si le point attiré est élevé d'une quantité $\alpha a y'$ au-dessus de la surface du sphéroïde; V' étant de la forme $\frac{4}{3}\pi.\frac{a^3}{r}+\alpha R$, il ne variera par ce déplacement du point, et en négligeant les quantités de l'ordre α^2, que de la quantité $-\frac{4}{3}\pi.a^2\alpha.y'$. La différence partielle $a\left(\frac{dV}{dr}\right)$ variera de la quantité $\frac{8}{3}\pi.a^2.\alpha y'$; la variation du premier membre de l'équation (b) sera donc $2\pi.a^2.\alpha y'$; et cette équation deviendra

$$a\left(\frac{dV'}{dr}\right)+\frac{1}{2}V'=-\frac{2\pi.a^2}{3}+2a^2\pi.\alpha y'.$$

Mais l'équation (a) subsistera toujours; parce que V'' étant de l'ordre α, ce déplacement ne peut y produire que des quantités de l'ordre α^2.

Cela posé, si l'on substitue dans les équations (2) et (3), $1+\alpha\bar{y}+\alpha y'$, au lieu de r, et si dans l'équation (3), on substitue $-\frac{1}{2}V''$ au lieu de $\left(\frac{dV''}{dr}\right)$; elles deviendront, en négligeant les termes de l'ordre α^2,

$$\begin{aligned}\text{const.} = \alpha\bar{y}+\alpha y' &-\frac{3\alpha}{\int\rho.d.a^3}.\int\rho.d.\left(\frac{a^3Y^{(1)}}{3}+\frac{a^5Y^{(2)}}{5}+\frac{a^6Y^{(3)}}{7}+\text{etc.}\right)\\ &-\frac{3}{\int\rho.d.a^3}.\left(Y'^{(0)}+\frac{Y'^{(1)}}{3}+\frac{Y'^{(2)}}{5}+\frac{Y'^{(3)}}{7}+\text{etc.}\right)\\ &-\frac{V''}{\frac{4}{3}\pi.\int\rho.d.a^3}+\frac{\alpha\phi}{2}.\left(u^2-\frac{1}{3}\right);\end{aligned}\qquad(4)$$

$$p = \frac{4}{3}\pi.(1 - 2\alpha\bar{y} - 2\alpha y').\int\rho.d.a^3 + 4\alpha\pi.\int\rho.d.\left(\frac{2Y^{(1)}}{3} + \frac{3a^5Y^{(2)}}{5} + \frac{4a^6Y^{(3)}}{7} + \text{etc}\right)$$
$$+ \frac{1}{2}V'' + \alpha\phi.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right).\frac{4}{3}\pi.\int\rho.d.a^3$$
$$+ 4\alpha\pi.\left(Y'^{(0)} + \frac{2Y'^{(1)}}{3} + \frac{3Y'^{(2)}}{5} + \text{etc}\right).$$

Si l'on ajoute cette dernière équation, à la précédente multi par $\frac{2}{3}\pi\int\rho.d.a^3$; on aura

$$p = \text{const.} - 2\alpha\pi.(\bar{y} + y').\int\rho.d.a^3 + 2\alpha\pi.\int\rho.d.(a^4Y^{(1)} + a^5Y^{(2)} + a^6Y^{(3)} +$$
$$+ 2\alpha\pi.y' + \frac{5}{4}\alpha\phi.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right).\frac{4}{3}\pi.\int\rho.d.a^3. \qquad (6)$$

Si l'on suppose la Terre homogène, ou ρ constant, on aura

$$p = \text{constante} - 2\alpha\pi.(\rho - 1).y' + \frac{5}{4}\alpha\phi.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right).\frac{4}{3}\pi.\rho;$$

et l'on doit observer que $\frac{4}{3}\pi.\rho$ est à très peu près la pesanteur à l'équateur. On a donc dans le cas où la mer a la même densité que le sphéroïde terrestre, ce qui donne $\rho = 1$,

$$p = P.\left(1 + \frac{5}{4}\alpha\phi.\mu^2\right),$$

P étant la pesanteur à l'équateur.

Cette valeur de p subsisterait encore, dans le cas où des plateaux d'une densité quelconque, et de hautes montagnes recouvriraient les continens. Ces corps ajouteraient à l'équation (1), un terme V''' qui serait la somme de leurs molécules divisée par leurs distances respectives au point attiré. En supposant ce point à la surface de la mer, on aura

$$\left(\frac{dV'''}{dr}\right) + \frac{1}{2}V''' = 0.$$

Ainsi V''' disparaîtrait de l'expression de la pesanteur p, par le mêm procédé qui a fait disparaître V'' de cette expression : p aurait don encore la valeur précédente : le terme V''' changerait donc la figure d

la mer, sans altérer la loi de la pesanteur. Il est bien remarquable que cette loi soit indépendante de cette figure qui peut avoir une infinité de formes, dépendantes de la manière dont la mer recouvre en partie, le sphéroïde terrestre, et des irrégularités de la surface des continens.

3. Pour déterminer la figure de la mer, lorsque celle du sphéroïde terrestre est donnée; la méthode la plus simple consiste à ordonner les approximations suivant les puissances du rapport de la densité de la mer, à la moyenne densité de la Terre, rapport égal à $\frac{2}{11}$ à fort peu près. Nous allons donc considérer d'abord, la figure de la mer, en négligeant ce rapport, ou en supposant que la mer est un fluide infiniment rare. Cela revient à négliger dans l'équation (4), les termes qui ont $\int \rho . d . a^3$ au dénominateur, et qui n'ont pas ρ au numérateur. Cette équation donne alors en n'y négligeant, pour plus d'exactitude, que le terme dépendant de V'',

$$\alpha y' = \text{const.} - \alpha \bar{y} + \frac{3\alpha}{\int \rho . d . a^3} . \int \rho . d . \left(\frac{a^4 Y^{(1)}}{3} + \frac{a^5 Y^{(2)}}{5} + \frac{a^6 Y^{(3)}}{7} + \text{etc.} \right)$$
$$+ \frac{3\alpha}{\int \rho . d . a^3} . \left(\frac{Y'^{(1)}}{3} + \frac{Y'^{(2)}}{5} + \frac{Y'^{(3)}}{7} + \text{etc.} \right)$$
$$- \frac{\alpha \varphi}{2} . \left(\mu^2 - \frac{1}{3} \right).$$

En substituant $\overline{Y}^{(1)} + \overline{Y}^{(2)} + \text{etc.}$ pour $\bar{y}$, et $Y'^{(0)} + Y'^{(1)} + Y'^{(2)} + \text{etc.}$ pour y', et comparant les termes semblables; on aura généralement

$$Y'^{(i)} . \left(1 - \frac{3}{2i+1 . \int \rho . d . a^3} \right) = - \overline{Y}^{(i)} + \frac{3 . \int \rho . d . (a^{i+3} Y^{(i)})}{2i+1 . \int \rho . d . a^3}.$$

Dans le cas de $i = 2$, il faut ajouter au second membre de cette équation, le terme $- \frac{\alpha \varphi}{2} . \left(\mu^2 - \frac{1}{3} \right)$.

L'équation (6) dans laquelle rien n'est négligé, donnera ensuite la pesanteur p à la surface de la mer.

Les expériences du pendule font voir que $\overline{Y}^{(1)}$, $\overline{Y}^{(3)}$, $\overline{Y}^{(4)}$, etc., sont des quantités très petites relativement à $\overline{Y}^{(2)}$, et que cette dernière fonction se réduit à fort peu près à $- \bar{h} . \left(\mu^2 - \frac{1}{3} \right)$, $\bar{h}$ étant une constante; ce qui donne aux couches du sphéroïde terrestre, la figure d'un ellipsoïde de révolution. Examinons donc ce cas particulièrement. On a alors par

ce qui précède, en faisant $Y^{(2)}$ égal à $-h\left(\mu^2-\frac{1}{3}\right)$,

$$Y'^{(2)}.\left(1-\frac{3}{5.\int\rho.d.a^3}\right)=\left(\bar{h}-\frac{3\int\rho.d.(a^5h)}{5.\int\rho.d.a^3}-\frac{\varphi}{2}\right).\left(\mu^2-\frac{1}{3}\right)$$

Ainsi en faisant

$$h'=\frac{\frac{\varphi}{2}-\bar{h}+\frac{3.\int\rho.d.(a^5h)}{5.\int\rho.d.a^3}}{1-\frac{3}{5.\int\rho.d.a^3}};$$

on aura

$$\alpha y'=\alpha l-\alpha h'\mu^2;$$

l étant une constante. Il est facile de voir que h' serait nul si, la mer étant anéantie, la surface du sphéroïde était en équilibre, en devenant fluide. Si donc cette surface est moins aplatie que dans ce cas, h' sera positif, et la mer recouvrira l'équateur du sphéroïde. Sa profondeur sera $\alpha l-\alpha h'.\mu^2$; et si elle n'a pas un volume suffisant pour recouvrir le sphéroïde entier, elle s'étendra vers les deux pôles, à des latitudes égales. Soit ε le sinus de ces latitudes; la profondeur de la mer étant nulle à ces points; on aura

$$\alpha l=\alpha h'.\varepsilon^2;$$

et l'origine des rayons terrestres étant supposée au centre de gravité du sphéroïde terrestre, ce qui rend $\overline{Y}^{(1)}$ et $Y'^{(1)}$ nuls, la profondeur de la mer sera

$$\alpha h'.(\varepsilon^2-\mu^2).$$

Le volume de la mer sera $\frac{8}{3}\alpha\pi.h'\varepsilon^3$; ce volume étant donné fera donc connaître ε. L'équation (6) combinée avec l'expression précédente de h', donnera pour l'expression de la pesanteur à la surface de la mer,

$$P.\left\{1+\left[\frac{5}{2}\alpha\varphi-\alpha(\bar{h}+h')\right].\mu^2\right\};$$

P étant cette pesanteur à l'équateur.

Si la surface du sphéroïde a un aplatissement plus grand que celui qui convient à son équilibre, en la supposant fluide; h' devient négatif, et alors, si la mer n'a pas un volume suffisant pour recouvrir le sphéroïde entier, elle se portera vers les deux pôles, et elle formera deux

mers distinctes, dont les masses pourront être dans un rapport quelconque. En faisant $h' = -g$, g étant positif, la profondeur de la mer boréale sera

$$ag.(\mu^2 - \varepsilon^2);$$

ε étant le sinus de la latitude des bords de cette mer. La profondeur de la mer située vers le pôle austral sera

$$ag.(\mu^2 - \varepsilon'^2);$$

ε' étant ce que devient pour cette mer, la quantité ε. Les masses des deux mers seront respectivement

$$\frac{2a\pi.g}{3}.(1-\varepsilon)^2.(1+2\varepsilon);\quad \frac{2a\pi g}{3}.(1-\varepsilon')^2.(1+2\varepsilon');$$

et la pesanteur P à leur surface sera, en désignant par P, la pesanteur aux pôles,

$$P.\left\{1 - \left[\frac{5}{4}a\Phi - a(\bar{h} - g)\right].(1-\mu^2)\right\}.$$

Pour avoir une seconde approximation, il faut déterminer la valeur analytique de la fonction $\frac{V''}{\frac{4}{3}\pi.\int\rho.d.a^3}$ de l'équation (4), et l'ajouter à l'expression de ay'. Or, on a

$$V'' = a.\int\frac{y_1.d\mu'.d\omega'}{\sqrt{2.(1-\cos.\gamma)}},$$

y_1 étant ce que devient l'expression trouvée par une première approximation pour y', et dans laquelle on change μ en μ', ω en ω'; μ' et ω' étant relatifs au point attirant, tandis que μ et ω se rapportent au point attiré. γ est l'angle compris entre les rayons terrestres menés à ces deux points, en sorte que l'on a

$$\cos\gamma = \mu\mu' + \sqrt{1-\mu^2}.\sqrt{1-\mu'^2}.\cos(\omega'-\omega).$$

L'intégrale précédente est relative à la surface entière des continens et des îles. Développons le radical

$$\frac{1}{\sqrt{r^2 - 2r.\cos\gamma + 1}}$$

suivant les puissances de $\frac{1}{r}$. En nommant $P^{(i)}$ le coefficient de ce développement, on aura par le n° 23 du troisième livre, e sant $\lambda = \cos\gamma$,

$$P^{(i)} = \frac{1.3.5\ldots\overline{2i-1}}{1.2.3\ldots i}.\left(\lambda^i - \frac{i.\overline{i-1}}{2.\overline{2i-1}}.\lambda^{i-2} + \frac{i.\overline{i-1}.\overline{i-2}.\overline{i-3}}{2.4.\overline{2i-1}.\overline{2i-3}}\lambda^{i-4}\right.$$

Si l'on fait $\frac{1}{r} = x$; $P^{(i)}$ devient le coefficient de x^i, dans le dé ment de $(1 - 2\lambda x + x^2)^{-\frac{1}{2}}$, fonction que l'on peut mettre sous cette forme

$$\frac{1}{\sqrt{1-\lambda^2}.\sqrt{1+\frac{(x-\lambda)^2}{1-\lambda^2}}}.$$

Le coefficient de x^i dans le développement de

$$\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(x-\lambda)^2}{1-\lambda^2}}}$$

est égal à

$$\frac{d^i.\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(x-\lambda)^2}{1-\lambda^2}}}}{1.2.3\ldots i.dx^i},$$

x étant supposé nul après les différentiations. J'ai fait voir dans le n° 38 de la Théorie analytique des Probabilités, que l'on a, ζ restant quelconque après les différentiations,

$$\frac{d^i.\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}}{1.1.3\ldots i.d\zeta^i} = \frac{1}{\pi.(1-\zeta^2)^{i+\frac{1}{2}}}.\int d\varpi(\zeta + \cos\varpi)^i;$$

l'intégrale étant prise depuis ϖ nul jusqu'à ϖ à la demi-circonférence π En faisant donc

$$\frac{x-\lambda}{\sqrt{1-\lambda^2}} = \zeta.\sqrt{-1},$$

[redacted]

lorsque x est nul après les différentiations, ce qui donne

$$\zeta = \frac{\lambda . \sqrt{-1}}{\sqrt{1-\lambda^2}};$$

on aura, $\quad d^i . \dfrac{1}{\dfrac{\sqrt{1-2\lambda x + x^2}}{1.2.3\ldots\ldots i.dx^i}}$, ou $P^{(i)}$ égal à

$$\frac{1}{\pi.(\sqrt{-1})^i} . \int d\varpi . (\lambda\sqrt{-1} + \sqrt{1-\lambda^2}.\cos\varpi)^i; \qquad (f)$$

Dans le cas de $\lambda = 1$, cette fonction se réduit à l'unité, comme cela doit être; car $P^{(i)}$ devient alors le coefficient de x^i dans le développement de $\frac{1}{1-x}$. Mais pour peu que λ soit moindre que l'unité, la fonction précédente et par conséquent $P^{(i)}$ devient moindre que l'unité; comme il est facile de le prouver.

L'intégrale (f) prise depuis $\varpi = 0$ jusqu'à $\varpi = \pi$, est égale à cette même intégrale prise depuis $\varpi = 0$ jusqu'à $\varpi = \frac{\pi}{2}$, plus à l'intégrale

$$\frac{1}{\pi.(\sqrt{-1})^i} . \int d\varpi' . (\lambda.\sqrt{-1} - \sqrt{1-\lambda^2}.\cos\varpi')^i$$

prise depuis $\varpi' = 0$, jusqu'à $\varpi' = \frac{\pi}{2}$, comme on le voit en changeant ϖ en $\pi - \varpi'$, dans l'intégrale (f), lorsque ϖ surpasse $\frac{\pi}{2}$. Soit donc $\gamma' = \frac{\pi}{2} - \gamma$, ce qui donne $\lambda = \sin\gamma'$; la fonction (f) devient

$$\frac{1}{\pi.(\sqrt{-1})^i} . \int d\varpi \left[\begin{array}{l} \left(\sqrt{-1}.\sin\gamma' + \cos\gamma'.\cos\varpi\right)^i \\ + \left(\sqrt{-1}.\sin\gamma' - \cos\gamma'.\cos\varpi\right)^i \end{array} \right]; \qquad (P)$$

l'intégrale étant prise depuis ϖ nul jusqu'à $\varpi = \frac{\pi}{2}$. On peut donner à cette fonction la forme suivante

$$\frac{1}{\pi.(\sqrt{-1})^i} . \int d\varpi . \left\{ \begin{array}{l} (\cos i\gamma' + \sqrt{-1}.\sin i\gamma').[1-2.(\cos\gamma' - \sqrt{-1}.\sin\gamma')\cos\gamma'\sin^2\frac{1}{2}\varpi]^i \\ +(-1)^i.(\cos i\gamma' - \sqrt{-1}.\sin i\gamma').[1-2.(\cos\gamma' + \sqrt{-1}.\sin\gamma').\cos\gamma'.\sin^2\frac{1}{2}\varpi]^i \end{array} \right\};$$

on a

$$\int d\varpi . [1 - 2.(\cos\gamma' - \sqrt{-1}.\sin\gamma').\cos\gamma'.\sin^2.\tfrac{1}{2}\varpi]^i$$
$$= c^{i.\log[1-2.(\cos\gamma' - \sqrt{-1}.\sin\gamma').\cos\gamma'.\sin^2.\frac{1}{2}\varpi]}$$

c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité. Il résulte de la méthode générale que j'ai donnée dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1782, et que j'ai développée avec étendue dans ma Théorie analytique des Probabilités, que dans le cas de i, un très grand nombre, cette intégrale devient à très peu près égale à celle-ci :

$$\int d\varpi . c^{-\frac{i}{2}.(\cos\gamma' - \sqrt{-1}.\sin\gamma').\cos\gamma'.\varpi^2}$$

l'intégrale étant prise depuis ϖ nul, jusqu'à ϖ infini. En faisant

$$\varpi . \sqrt{\frac{i}{2}.(\cos\gamma' - \sqrt{-1}.\sin\gamma').\cos\gamma'} = t,$$

cette intégrale devient

$$\frac{(\cos\frac{1}{2}\gamma' + \sqrt{-1}.\sin\frac{1}{2}\gamma')}{\sqrt{\frac{i}{2}.\cos\gamma'}} . \int dt . c^{-t^2},$$

l'intégrale étant prise depuis t nul, jusqu'à t infini, ce qui donne

$$\int dt . c^{-t^2} = \frac{1}{2}\sqrt{\pi}.$$

De là il est facile de conclure que la fonction (f), valeur de $P^{(i)}$, est à fort peu près dans le cas de i égal à un très grand nombre pair,

$$\frac{2.(-1)^{\frac{i}{2}}.\cos\left(i+\frac{1}{2}\right)\gamma'}{(1-\lambda^2)^{\frac{1}{4}}.\sqrt{2\pi.i}};$$

et que dans le cas de i très grand et impair, cette valeur est à fort peu près

$$\frac{2.(-1)^{\frac{i-1}{2}}.\sin\left(i+\frac{1}{2}\right).\gamma'}{(1-\lambda^2)^{\frac{1}{4}}.\sqrt{2\pi.i}}.$$

En restituant $\frac{\pi}{2}-\gamma$, pour γ', ces deux expressions deviennent l'une et l'autre,

$$\frac{\cos.\left[\left(i+\frac{1}{2}\right).\gamma-\frac{1}{4}\pi\right]}{(1-\lambda^2)^{\frac{1}{4}}.\sqrt{\frac{1}{2}i\pi}}.$$

λ étant supposé plus petit que l'unité, cette valeur de $P^{(i)}$ est toujours fort approchée lorsque i est un très grand nombre : elle devient exacte, lorsque i est infini. Mais il est remarquable que l'expression donnée ci-dessus de $P^{(i)}$, par une suite de puissances de λ, et qui dans le cas de i un très grand nombre, est composée d'un grand nombre de termes et de facteurs, se réduise alors à une expression aussi simple.

Considérons présentement l'intégrale

$$\alpha.\int\frac{y_1.d\mu.d\omega}{\sqrt{r^2-2\lambda r+1}},$$

qui devient V'', lorsque $r=1$. Le coefficient de $\frac{1}{r^{i+1}}$ dans cette intégrale développée par rapport aux puissances de $\frac{1}{r}$ est dans le cas où est un très grand nombre,

$$\frac{\alpha}{\sqrt{\frac{1}{2}.i\pi}}.\int\frac{y_1.d\mu'.d\omega'.\cos\left[\left(i+\frac{1}{2}\right)\gamma-\frac{1}{2}\pi\right]}{(1-\lambda^2)^{\frac{1}{4}}}.$$

En intégrant cette fonction par rapport à μ', on a

$$\frac{\alpha}{\left(i+\frac{1}{2}\right).\sqrt{\frac{1}{2}.i\pi}}.\int\frac{y_1.d\omega'.\sin\left[\left(i+\frac{1}{2}\right).\gamma-\frac{1}{2}.\pi\right].\left(\frac{d\mu'}{d\gamma}\right)}{(1-\lambda^2)^{\frac{1}{4}}}$$

$$-\frac{\alpha}{\left(i+\frac{1}{2}\right).\sqrt{\frac{1}{2}.i\pi}}.\int d\omega'.d\mu'.\sin\left[\left(i+\frac{1}{2}\right)\gamma-\frac{1}{4}.\pi\right].\frac{d}{d\mu'}.\left[\frac{y_1\left(\frac{d\mu'}{d\gamma}\right)}{(1-\lambda^2)^{\frac{1}{4}}}\right].$$

On voit ainsi que quel que soit y_1, on arrivera toujours par le dévelop-

pement du radical $\frac{1}{\sqrt{r^2-2\lambda r+1}}$ suivant les puissances de $\frac{1}{r}$, à série très convergente, à cause du diviseur $\left(i+\frac{1}{2}\right).\sqrt{\frac{1}{2}i\pi}$. Le co cient de $\frac{1}{r^{i+1}}$ dans ce développement, est par le n° 23 du 3e Livre

$$2.\left(\frac{1.3.5\ldots 2i-1}{1.2.3\ldots i}\right)^2.\Sigma.\left\{\begin{array}{l}\frac{i.\overline{i-1}.\overline{i-2}\ldots\overline{i-n+1}}{\overline{i+1}.\overline{i+2}\ldots\overline{i+n}}.\cos n.(\omega-\omega').(1-\mu^2)^{\frac{n}{2}}\left(\mu^{i-n}-\frac{\overline{i-n}.\overline{i-n-1}}{2.\overline{2i-1}}.\mu^{i-n-2}.\right.\\ \left.\times(1-\mu'^2)^{\frac{n}{2}}\left(\mu'^{i-n}-\frac{\overline{i-n}.\overline{i-n-i}}{2.\overline{2i-1}}.\mu'^{i-n-2}+\text{etc.}\right)\right.\end{array}\right\}$$

le signe Σ comprenant toutes les valeurs de la fonction qu'il enveloppe, depuis $n=0$ jusqu'à $n=i$. Dans le cas de $n=0$, il ne faut prendre que la moitié de cette fonction.

La première approximation nous a donné y_1 sous cette forme

$$Y'^{(0)}+Y'^{(1)}+Y'^{(2)}+\text{etc.}$$

En la prenant négativement et en y changeant μ en μ'; on aura la la valeur de y_1, qui, substituée dans l'intégrale

$$\int\frac{y_1.d\mu'.d\omega'}{\sqrt{r^2-2r\lambda+1}}$$

développée par rapport aux puissances de $\frac{1}{r}$, donne par une série très convergente, cette intégrale et par conséquent la valeur de V''. On aura ainsi, au moyen de l'équation (4), une seconde approximation de la valeur de $\alpha y'$, ordonnée, comme la première, par une suite de fonctions de la forme $Y'^{(i)}$. On aura ensuite, au moyen de l'équation (6), une seconde approximation de la pesanteur p. Ces approximations seront suffisantes, vu le peu de densité de la mer et son peu de profondeur, comme on le verra bientôt.

Dans le cas où la Terre est un sphéroïde de révolution, il est facile de voir que la valeur de V'' se simplifie, et se réduit à une suite de termes compris dans la forme

$$2\pi.Q^{(i)}.\int\alpha.Q'^{(i)}.y_1d\mu';$$

$Q^{(i)}$ étant égal à

$$\frac{1.3.5\ldots\overline{2i-1}}{1.2.3\ldots i}.\left(\mu^i-\frac{\overline{i.i-1}}{2.\overline{2i-1}}.\mu^{i-2}+\text{etc.}\right);$$

) étant ce que devient $Q^{(i)}$, lorsqu'on y change μ en μ' : i doit endu depuis zéro jusqu'à l'infini. Si l'on nomme θ l'angle dont μ cosinus, et θ' l'angle dont μ' est le cosinus; on aura, lorsque i grand nombre

$$Q'^{(i)} = \frac{\cos\left(\overline{i+\frac{1}{2}}.\theta' - \frac{1}{4}\pi\right)}{\sqrt{\frac{1}{2}i\pi}.(1-\mu'^2)^{\frac{1}{4}}}.$$

L'intégrale

$$2\pi.Q^{(i)}.\alpha.\int Q'^{(i)}.y_1.d\mu'$$

deviendra à fort peu près

$$\frac{8\alpha}{i.\overline{2i+1}}.\frac{\cos\left(\overline{i+\frac{1}{2}}.\theta - \frac{1}{4}\pi\right)}{\sqrt{\sin\theta}}.\left\{\begin{array}{l} y_1 . \sqrt{\sin(\theta')}.\sin\left[\overline{i+\frac{1}{2}}\ (\theta') - \frac{1}{4}\pi\right] \\ -y'.\sqrt{\sin\theta}.\sin\left(\overline{i+\frac{1}{2}}.\theta - \frac{1}{4}\pi\right) \end{array}\right\}.$$

On voit par là, combien la valeur précédente de V'' est convergente.

4. Considérons maintenant les variations des degrés et de la pesanteur à la surface des continens et des îles, ou, ce qui revient au même, à la surface du sphéroïde terrestre. Ces variations sont les seules que nous puissions observer. Pour avoir leur expression analytique, imaginons une atmosphère infiniment rare, d'une densité constante, très peu élevée, mais qui cependant embrasse toute la Terre et ses montagnes: soit $\alpha y''$ l'élévation de ses points au-dessus de la surface du sphéroïde terrestre. L'équation (1) du n° 2 qui détermine la figure de la mer, déterminera la partie de la figure de l'atmosphère, qui s'élève au-dessus de la mer; car il est clair que la valeur de V' dans cette équation, étant de l'ordre α, est aux quantités près de l'ordre α^2, la même aux deux surfaces. Mais à la surface de la mer, r doit être changé dans $1 + \alpha\bar{y} + \alpha y'$; tandis que relativement à la surface de l'atmosphère supposée, il doit être changé dans $1 + \alpha\bar{y} + \alpha y''$. Cela posé, si l'on retranche ces deux équations, l'une de l'autre, on aura

$$\alpha y'' - \alpha y' = \text{constante}.$$

Ainsi tous les points de la surface de cette atmosphère, qui correspondent à la surface de la mer, sont également élevés au-dessus de cette

dernière surface; en sorte que ces deux surfaces sont à très peu près semblables.

Si l'on nomme p' la pesanteur à la surface de l'atmosphère, il est visible que cette pesanteur sera à la pesanteur p à la surface de la mer, comme $\frac{1}{(1+\alpha y+\alpha y'')^2}$ est à $\frac{1}{(1+\alpha y+\alpha y')^2}$; ce qui donne à très peu près, en désignant $\alpha y''-\alpha y'$, par αl, quantité qui, comme on vient de le voir, est constante,

$$p'=p-2\alpha l.\mathrm{P};$$

P étant la pesanteur à la surface de la mer, à l'équateur; ainsi la loi de la pesanteur est la même aux deux surfaces. On a vu dans le n° 2 que dans le cas où le sphéroïde terrestre est homogène et de même densité que la mer, on a

$$p=\mathrm{P}.\left(1+\frac{5}{4}.\alpha\varphi.\mu^2\right);$$

on a donc alors

$$p'=\mathrm{P}.\left(1-2\alpha l+\frac{5}{4}\alpha.\varphi.\mu^2\right).$$

Pour avoir l'équation de la surface de l'atmosphère au-dessus des continens, nous nommerons V_1 la somme des molécules de la mer, divisées par leurs distances respectives à un point de cette surface. Alors l'équation (1) du n° 2 deviendra celle de cette surface, en y changeant V' en V_1, et en y substituant $1+\alpha y+\alpha y''$ pour r. Or on a

$$\mathrm{V}'=\alpha\int\frac{y'd\mu'd\omega'}{\sqrt{r^2-2r.\cos\gamma+1}},$$

l'intégrale étant prise pour toutes les valeurs de μ' et de ω' relatives à l'étendue de la mer, r devant être supposé égal à l'unité, et $\cos\gamma$ étant

$$\mu\mu'+\sqrt{1-\mu^2}.\sqrt{1-\mu'^2}.\cos(\omega-\omega').$$

En développant le radical de cette intégrale, par rapport aux puissances de $\frac{1}{r}$; on voit, par ce qui précède, que V' est composé de termes de

la forme

$$\mathcal{E}\,(1-\mu^2)^{\frac{n}{2}}.(\mu^{i-n}-\text{etc.}).\int y'\,d\mu'\,d\omega'.(1-\mu'^2)^{\frac{n}{2}}.(\mu'^{i-n}-\text{etc.}).\cos n(\omega-\omega');$$

La valeur de V_1 se compose des mêmes termes; on a donc

$$V'=V_1.$$

Cela posé, si l'on retranche l'une de l'autre, les équations aux deux surfaces, on aura

$$\alpha y''=\alpha\bar{l}+\alpha y';$$

pourvu que les coordonnées μ et ω de la fonction y' se rapportent à rayon du point de l'atmosphère, que nous considérons.

La surface du sphéroïde dont le rayon est $1+\alpha\bar{y}+\alpha y'$, est celle de la mer; et au-delà des limites de la mer, elle s'abaisse au-dessous de la surface du sphéroïde terrestre; l'élévation des points de cette seconde surface au-dessus de la première, sera donc $-\alpha y'$: c'est ce que l'on entend par l'élévation de ces points au-dessus du niveau de la mer. L'élévation des points correspondans de la surface de l'atmosphère est $\alpha y''$. Les observations barométriques font connaître les quantités $\alpha\bar{l}$ et $\alpha y''$; car on peut supposer que l'atmosphère dont nous venons de parler, est notre atmosphère elle-même réduite à sa moyenne densité.

Pour avoir l'expression de la pesanteur, il faut changer dans l'équation (1) du n° 2, V' dans V_1, V_1 représentant pour les points situés au-dessus des continens, la somme des molécules de la mer, divisées par leurs distances respectives au point de la surface de l'atmosphère, qui correspond aux continens, et substituer pour r, $1+\alpha\bar{y}+\alpha y'$. On peut supposer, pour plus de généralité, que V_1 comprend encore la somme semblable relative aux montagnes, et même aux cavités de la surface de la Terre, en observant que la partie de V_1 relative à ces cavités, est négative. La pesanteur p' est donnée par la différentielle du second membre de l'équation (1) divisée par $-dr$. Si l'on en retranche l'équation (1) multipliée par $\frac{1}{2}$, et si l'on observe que l'on a

$$\left(\frac{dV_1}{dr}\right)+\frac{1}{2}V_1=0;$$

on aura

$$\begin{aligned} p' = \text{const.} &- 2\alpha\pi.(\bar{y} + y'').\int\rho.da^3 \\ &+ 2\alpha\pi.\int\rho d.(a^4 Y^{(1)} + \alpha^5.Y^{(2)} + a^6 Y^{(3)} + \text{etc.}) \\ &+ \frac{5}{4}.\alpha\varphi.P.\mu^2. \end{aligned} \tag{7}$$

En substituant ensuite au lieu de p, $p'' - 2.\alpha P.y''$; p'' étant la pesanteur à la surface du sphéroïde, on aura

$$\begin{aligned} p'' = \text{const.} &- \frac{1}{2} P.(\alpha l - \alpha y'') \\ &+ 2\alpha\pi.\bar{y}.\int a^3.d\rho. - 2\alpha\pi.\int d\rho.(a^4 Y^{(1)} + a^5 Y^{(2)} + \text{etc.}) \\ &+ \frac{5}{4}\alpha\varphi.P.\mu^2. \end{aligned} \tag{8}$$

Cette expression de p'' embrasse l'attraction des montagnes, et généralement tous les effets d'attraction, dus aux irrégularités de la surface du sphéroïde terrestre, pourvu que le point attiré en soit fort éloigné; car cette condition est nécessaire à l'existence de l'équation

$$0 = \left(\frac{dV_1}{dr}\right) + \frac{1}{2} V_1,$$

qui fait disparaître ces effets.

Si le sphéroïde terrestre était homogène, $d\rho$ serait nul, et l'on aurait cette expression remarquable,

$$p'' = P.\left(1 - \frac{1}{2}\alpha(l - y'') + \frac{5}{4}\alpha\varphi.\mu^2\right),$$

P étant la pesanteur à l'équateur au niveau de la mer. On peut, au moyen de cette équation, vérifier l'hypothèse de cette homogénéité; car alors, en ajoutant à toutes les valeurs de p'', déterminées par les expériences du pendule, la quantité $\frac{1}{2}.P.(\alpha l - \alpha y'')$ déterminée par les observations du baromètre; l'expression de la pesanteur ainsi corrigée, deviendrait $P.\left(1 + \frac{5}{4}\alpha\varphi\mu^2\right)$. L'accroissement de la pesanteur de l'équateur aux pôles, serait ainsi $\frac{5}{4}\alpha\varphi.\mu^2$. Or on a

$$\frac{5}{4}\alpha\varphi = 0{,}004325;$$

cet accroissement serait donc $0{,}004325.P\mu^2$. Les expériences multipliées du pendule dans les deux hémisphères, indiquent bien un accroissement à très peu près proportionnel à μ^2, ou au carré du sinus de la latitude; mais elles s'accordent à donner à μ^2, un coefficient plus grand que le précédent, et à fort peu près égal à $0{,}0054.P$. L'hypothèse de l'homogénéité de la Terre est donc exclue par ces expériences : on voit même que l'hétérogénéité de ses couches doit s'étendre depuis la surface, au-delà des quantités de l'ordre α ou de l'aplatissement de la Terre, afin que la quantité de l'équation (8)

$$2\alpha\pi.\bar{y}.\int a^3.d\rho - 2\alpha\pi.\int d\rho(a^4Y^{(1)} + a^5Y^{(2)} + \text{etc.}),$$

soit de l'ordre α, et devienne égale à

$$(0{,}0054.P - 0{,}004325.P).\left(\mu^2 - \tfrac{1}{3}\right).$$

5. Comparons maintenant l'analyse aux observations. L'équation (1) du n° 2 donne à la surface de l'atmosphère au-dessus des continens,

$$\text{const.} = \tfrac{4}{3}\pi\int\rho.d.a^3.(\alpha\bar{y} + \alpha y'') - 4\alpha\pi\int\rho.d\left(\frac{a^4Y^{(1)}}{3} + \frac{a^5Y^{(2)}}{5} + \frac{a^6Y^{(3)}}{7} + \text{etc.}\right)$$
$$- V_1 + \tfrac{\alpha\varphi}{2}.P.\left(\mu^2 - \tfrac{1}{3}\right).$$

Si l'on ajoute cette équation multipliée par $\frac{3}{2}$, à l'équation (7) du n° précédent, on aura

$$p' = \text{const.} + 4\alpha\pi.\int\rho.d.\left(\frac{a^5Y^{(2)}}{5} + \frac{2a^6Y^{(3)}}{7} + \text{etc.}\right)$$
$$- \tfrac{3}{2}V_1 + 2\alpha\varphi.P.\left(\mu^2 - \tfrac{4}{3}\right).$$

En développant V_1 suivant les puissances de $\frac{1}{r}$, on aura une expression de cette forme,

$$V_1 = \frac{U_1^{(0)}}{r} + \frac{U_1^{(1)}}{r^2} + \frac{U_1^{(2)}}{r^3} + \text{etc.},$$

$U_1^{(i)}$ étant une fonction rationnelle et entière de μ, $\sqrt{1-\mu^2}.\sin\omega$, et $\sqrt{1-\mu^2}.\cos\omega$, assujettie à la même équation aux différences par-

tielles que $Y^{(i)}$. L'équation précédente devient ainsi

$$p' = \text{const.} + 4\alpha\pi . \int \rho . d . \left(\frac{a^5 Y^{(2)}}{5} + \frac{2a^6 . Y^{(5)}}{7} + \text{etc.}\right)$$
$$- \frac{3}{2} . \left(U_1^{(1)} + U_1^{(2)} + U_1^{(3)} + \text{etc.}\right) + 2\alpha\varphi \ldots \left(\mu_1 - \frac{1}{3}\right).$$

Il résulte des nombreuses expériences du pendule, que l'on a à fort peu près

$$p = \text{const.} + \alpha q . P . \left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right),$$

αq étant à très peu près égal à 0,0054. De là il suit que la fonction

$$4\alpha\pi . \int \rho . d . \left(\frac{2a^6 . Y^{(3)}}{7} + \frac{3a^7 . Y^{(1)}}{9} + \text{etc.}\right) - \frac{3}{2} . (U_1^{(1)} + U_1^{(3)} + \text{etc.}),$$

est très petite relativement au terme $\alpha q . P . \left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right)$; et que la fonction

$$4\alpha\pi . \int \rho . d\left(\frac{a^5 Y^{(2)}}{5}\right) - \frac{3}{2} U_1,$$

est à fort peu près

$$(\alpha q - 2\alpha\varphi) . P . \left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right).$$

L'expression générale de cette fonction est de la forme

$$A . \left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right) + A^{(1)} . \mu^2 \sqrt{1 - \mu^2} . \sin \omega + A^{(2)} . \mu . \sqrt{1 - \mu^2} . \cos \omega$$
$$+ A^{(3)} . (1 - \mu^2) . \sin 2\omega + A^{(4)} . (1 - \mu^2) . \cos 2\omega.$$

Ainsi, les constantes $A^{(1)}$, $A^{(2)}$, $A^{(3)}$, $A^{(4)}$ sont très petites relativement à la constante A, et l'on a à fort peu près

$$A = (\alpha q - 2\alpha\varphi) . P.$$

On a

$$\alpha\varphi = \frac{1}{289} = 0{,}003460,$$

et les expériences du pendule donnent à fort peu près

$$\alpha q = 0{,}00540;$$

on aura ainsi

$$A = -0{,}00152 . P.$$

On peut encore déterminer A au moyen des deux inégalités de la Lune, qui dépendent de l'aplatissement de la Terre. Il résulte du second chapitre du septième livre, que si l'on désigne par $K.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right)$ la partie de

$$\frac{4\pi\pi}{5}.\ \rho.d.(a^5 Y^{(2)}) + U_1^{(2)},$$

qui est indépendante de l'angle ω; l'inégalité lunaire en latitude sera

$$\frac{K}{(g^2-1).M}.\Pi^2.\sin\lambda\cos\lambda.\sin u;$$

u étant la longitude de la Lune; $g-1$, le rapport du moyen mouvement de ses nœuds à son moyen mouvement; Π sa parallaxe; λ l'obliquité de l'écliptique; et M, la masse de la Terre, à très peu près égale à P. Suivant M. Burg, cette inégalité est en secondes sexagésimales

$$-8'',0.\sin u;$$

et la comparaison de quatre mille observations a conduit M. Burkhardt, au même résultat qui donne

$$K = -0,001558.P.$$

L'expression analytique de l'inégalité lunaire en longitude, qui dépend du sinus de la longitude du nœud de l'orbite lunaire, comparée par les mêmes astronomes, aux observations, donne la même valeur de K, qui me paraît être ainsi une des données les plus exactes et les plus précieuses de l'Astronomie théorique. Maintenant, il est facile de voir que si l'on nomme $Q.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right)$, la partie de $U_1^{(2)}$, indépendante de l'angle ω, on a

$$K = A + \frac{5}{2}Q;$$

on a donc

$$A = -0,001558.P - \frac{5}{2}Q.$$

Si l'on compare cette valeur de A, à la précédente conclue des expériences du pendule, on a

$$Q = -0,00015.P.$$

On sent combien les erreurs des observations et des expériences rendent cette valeur incertaine; mais elle prouve la petitesse de la masse de la mer, et son peu de profondeur.

Les mesures des degrés des méridiens, réduites au niveau de la mer ou de l'atmosphère supposée, nous offrent un troisième moyen pour obtenir A. L'équation (1) du n° 2 transportée à cette atmosphère, donne

$$(\alpha\bar{y} + \alpha y'').\mathrm{P} = \text{const.} + 4\alpha\pi.\int\rho.d.\left(\frac{a^5\mathrm{Y}^{(2)}}{5} + \frac{a^6.\mathrm{Y}^{(3)}}{7} + \text{etc.}\right)$$
$$+ \mathrm{U}_1^{(2)} + \mathrm{U}_1^{(3)} + \text{etc.}$$
$$- \mathrm{P}.\frac{\alpha\varphi}{2}.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right),$$

l'origine des coordonnées étant au centre commun de gravité de la mer et du sphéroïde terrestre; ce qui fait disparaître les quantités $\mathrm{Y}^{(1)}$ et $\mathrm{U}_1^{(1)}$, et les autres fonctions de même nature. Les mesures des degrés s'écartent peu de la figure d'un ellipsoïde de révolution. Elles présentent cependant de plus grandes anomalies, que les longueurs du pendule; ce qui tient en partie, aux erreurs dont les observations d'amplitude des arcs mesurés sont susceptibles, et qui relativement à l'arc mesuré, sont beaucoup plus considérables que les erreurs des expériences du pendule; et en partie, à ce que les petites irrégularités de la Terre, affectent plus les degrés que les longueurs du pendule, comme je l'ai fait voir dans le troisième livre. Mais lorsque l'on compare des degrés éloignés, tels que ceux de France et de l'équateur; l'influence de ces irrégularités devient moins sensible. La comparaison des degrés dont je viens de parler, a donné à M. Delambre

$$\alpha(\bar{y} + y'') = \text{const.} - 0{,}00324.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right).$$

En comparant cette expression de $\alpha\bar{y} + \alpha y''$, à la précédente, on voit que les quantités $\bar{\mathrm{Y}}^{(3)}$, $\bar{\mathrm{Y}}^{(4)}$, etc., $\mathrm{U}_1^{(1)}$, $\mathrm{U}_1^{(3)}$, $\mathrm{U}_1^{(4)}$, etc. sont très petites, comme cela résulte pareillement des expériences du pendule. La première de ces expressions donne

$$-\mathrm{P}.(\alpha\bar{h} + \alpha h'') = \mathrm{A} + \frac{5}{2}\mathrm{Q} - \frac{\alpha\varphi}{2}.\mathrm{P};$$

en désignant par

$$-\alpha h.\left(\mu^2-\frac{1}{3}\right),\quad -\alpha\bar{h}.\left(\mu^2-\frac{1}{3}\right),\quad -\alpha h''.\left(\mu^2-\frac{1}{3}\right),$$

les parties de αY, $\alpha\bar{Y}$ et $U_1^{(2)}$, qui sont indépendantes de ω. On aura donc, en substituant pour $-P.(\alpha\bar{h}+\alpha h'')$, sa valeur $-0{,}00324.P$, que donnent les degrés du méridien, mesurés en France et à l'équateur,

$$A=-0{,}00151.P-\frac{5}{2}Q.$$

Les degrés du méridien, mesurés en France, comparés à ceux que l'on a mesurés dans l'Inde, donnent le même résultat. Je suppose que les degrés mesurés à la surface du sphéroïde terrestre, et réduits au niveau de l'atmosphère supposée, sont ceux de la surface de cette atmosphère. Pour le faire voir, il suffit de prouver que la direction de la pesanteur, est aux quantités près de l'ordre α^2, la même à la surface du sphéroïde, et à la surface de l'atmosphère. L'angle que cette direction forme avec le rayon r, dans le sens du méridien, par exemple, est égal au rapport de la différentielle du second membre de l'équation (1) du n° 2, prise par rapport à θ et divisée par $d\theta$, à cette même différentielle prise par rapport à r et divisée par $-dr$; or il est visible que ce rapport est aux quantités près de l'ordre α^2, le même à la surface du sphéroïde, qu'à celle de l'atmosphère.

Maintenant, si nous rassemblons les trois valeurs précédentes de A,

$$A=-0{,}00152.P,$$

$$A=-0{,}001558.P-\frac{5}{2}Q,$$

$$A=-0{,}00151.P-\frac{5}{2}Q;$$

on voit par l'ensemble de ces valeurs, que Q est insensible, et qu'en le supposant nul, elles s'accordent aussi bien qu'on peut le désirer.

L'ellipticité $\alpha\bar{h}+\alpha h'$ de la surface de la mer, est, par ce qui précède,

$$\frac{1}{2}\alpha\varphi-\frac{\left(A+\frac{5}{2}Q\right)}{P}.$$

En prenant pour A, le milieu des trois valeurs précédentes, on aura pour cette ellipticité,

$$0{,}00326 - \frac{5}{6}.Q,$$

ou 0,00326 en négligeant le terme $-\frac{5}{6}.Q$.

La précession des équinoxes donne des limites entre lesquelles l'ellipticité de la Terre entière, ou de l'atmosphère supposée, est comprise. On a par le n° 14 du cinquième livre, cette ellipticité égale à

$$0{,}0017301 + \frac{0{,}00259661.\int\rho\ a^4da}{(1+\epsilon.0{,}748493).\int\rho.a^2da},$$

$3(1+\epsilon)$ étant le rapport de la masse de la Lune divisée par le cube de sa moyenne distance à la Terre, à la masse du Soleil divisée par le cube de la moyenne distance de la Terre au Soleil. En supposant ce rapport égal à 2,57, comme il résulte par un milieu entre ses valeurs données par les phénomènes des marées, de la nutation, de la parallaxe lunaire, et de l'équation lunaire des tables du Soleil; en supposant ensuite, conformément à ce qui précède, l'ellipticité de la Terre, égale à 0,00326, on aura

$$\int\rho.d.a^3 = 1{,}1407.\int\rho.d.a^5.$$

Soit (ρ) la densité de la surface, et supposons qu'elle augmente de la surface au centre, en progression arithmétique, en sorte que son expression soit $(\rho).(1+e-ea)$; l'équation précédente donnera

$$e = 2{,}349.$$

On aura, en nommant D la densité moyenne de la Terre,

$$D = \int\rho.d.a^3 = (\rho).\left(1+\frac{1}{4}e\right);$$

substituant pour e, sa valeur précédente, on a

$$D = 1{,}587.(\rho).$$

Si l'on suppose la densité de la première écorce du sphéroïde terrestre égale à trois fois la densité de la mer, prise pour unité, ce qui est à

peu près la densité du granit; on aura

$$D = 4{,}761;$$

ce qui s'accorde avec la moyenne des valeurs données par les observations de Maskeline, sur l'attraction d'une montagne d'Ecosse, et par la belle expérience de Cavendish.

Le rayon du sphéroïde terrestre est

$$1 - \alpha\bar{h}.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right) + \alpha x;$$

αx étant une quantité peu considérable par rapport à $\alpha\bar{h}$; car cette quantité devient plus sensible, comme on l'a vu, dans l'expression de la pesanteur, où cependant l'expérience a montré qu'elle est presque nulle. Pareillement l'expression du rayon de la surface de la mer est

$$\alpha l - \alpha.(\bar{h} + h').\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right) + \alpha x';$$

$\alpha x'$ étant une quantité du même ordre que αx dont elle dépend. Elle est, par conséquent, peu considérable relativement à $\alpha\bar{h}$. La profondeur de la mer est, à très peu près, la différence de ces deux rayons; elle est ainsi égale à

$$\alpha l - \alpha h'\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right) + \alpha x' - \alpha x.$$

A l'équateur, les continens ont une grande étendue sur laquelle cette expression devient négative. La mer y occupe une étendue encore plus grande sur laquelle la même expression est positive. Dans le premier cas, $\alpha l + \frac{\alpha h'}{3}$ est moindre que la valeur de $\alpha x - \alpha x'$, correspondante à μ nul. Dans le second cas, il est plus grand que cette valeur. $\alpha l + \frac{\alpha h'}{3}$ est donc une quantité très petite de l'ordre de αx. Très près du pôle boréal, où l'on a $\mu = 1$, la mer recouvre une partie du sphéroïde terrestre, et en laisse une autre partie à découvert. Dans le premier cas, $\alpha l - \frac{2\alpha h'}{3}$ est plus grand que la valeur de $\alpha x - \alpha x'$, correspondante à $\mu = 1$. Dans le second cas, il est plus petit. $\alpha l - \frac{2\alpha h'}{3}$ est donc une

quantité très petite de l'ordre de αx; donc $\alpha l + \frac{1}{3}\alpha h'$ étant du même ordre, la différence $\alpha h'$ de ces quantités sera du même ordre, ainsi que la constante αl. Par conséquent, la mer est peu profonde, et ses profondeurs sont peu considérables, et du même ordre que les élévations des continens au-dessus du niveau de la mer. Mais de même que de très hautes montagnes s'élèvent sur quelques points des continens; de même il peut y avoir dans quelques points du bassin de la mer, de grandes profondeurs.

De là il suit que la surface du sphéroïde terrestre est à fort peu près elliptique; car l'équation de l'équilibre de la surface de la mer, et qui donne par ce qui précède,

$$\alpha(\bar{h} + h') = \frac{1}{2}\alpha\varphi - \frac{(A + \frac{1}{2}Q)}{P},$$

deviendrait celle de l'équilibre de la surface du sphéroïde terrestre, supposée fluide, si la mer venait à disparaître; ce qui rendrait $\alpha h'$ et Q nuls. Ainsi ces quantités étant très petites, par ce que l'on vient de voir, la valeur de $\alpha\bar{h}$ diffère très peu de celle de l'équilibre de la surface du sphéroïde. Les expériences du pendule prouvent non-seulement que cette surface est à très peu près elliptique; mais encore que les diverses couches du sphéroïde terrestre ont à peu près une figure elliptique; car les quantités $\alpha Y^{(3)}$, $\alpha Y^{(4)}$, etc. de l'expression du rayon de ces couches se feraient remarquer dans ces expériences, si elles étaient sensibles

6. Je vais présentement considérer la figure de la Terre, en la supposant formée d'un seul fluide compressible. Pour cela, je reprends l'équation (1) du n° 29 du troisième Livre. En y supposant, comme on le peut pour simplifier, $Y^{(0)}$ nul, et en comparant séparément les fonctions semblables; la différentielle de cette équation, prise par rapport à la quantité a considérée comme variable, donne

$$\frac{d\Pi}{\rho} = -4\pi . \frac{da}{a^2} . \int \rho a^2 da; \quad (i)$$

Π est ici la pression à la surface de niveau d'une couche du sphéroïde terrestre dont le rayon est a; ρ est la densité de cette couche, et π est le rapport de la circonférence au diamètre : l'intégrale doit être prise depuis $a = 0$. Maintenant, si l'on suppose conformément à ce que j'ai

dit dans le chapitre précédent,

$$\frac{d\Pi}{d\rho} = 2k\rho;$$

$2k$ étant une constante; on aura en intégrant

$$\Pi = k\rho^2 - k(\rho)^2,$$

(ρ) étant la densité à la surface où la pression Π est supposée nulle. L'équation (i) devient ainsi en faisant $n^2 = \frac{2\pi}{k}$,

$$\frac{d\rho}{da} = -\frac{n^2}{a^2}.\int \rho.a^2 da.$$

Supposons $\rho' = a\rho$; on aura

$$a^2 d\rho = a d\rho' - \rho' da;$$

on aura donc

$$\frac{a d\rho'}{da} - \rho' = -n^2.\int \rho'.a da;$$

ce qui donne en différentiant

$$\frac{dd\rho'}{da^2} + n^2\rho' = 0.$$

L'intégrale de cette équation est

$$\rho' = A.\sin an + B.\cos an;$$

A et B étant deux constantes arbitraires; on aura donc

$$\rho = \frac{A}{a}.\sin an + \frac{B}{a}.\cos an.$$

La densité ρ n'étant point infinie au centre où a est nul, B doit être nul; par conséquent

$$\rho = \frac{A}{a}.\sin an.$$

Telle est donc la loi de densité des couches du sphéroïde terrestre, relative à la loi supposée entre la pression et la densité. A la surface de la Terre, où nous supposerons $a = 1$, et la densité ρ égale à (ρ), nous

aurons

$$(\rho) = A.\sin n; \quad -\frac{\left(\frac{d\rho}{da}\right)}{(\rho)} = 1 - \frac{n}{\tang n}.$$

Si l'on nomme D la moyenne densité de la Terre; on aura

$$\int \rho a^2 da = D.\int a^2 da = \frac{1}{3} D;$$

or l'équation

$$\frac{d\rho}{da} = -\frac{n^2}{a^2}.\int \rho a^2 da$$

donne à la surface

$$(\rho).\left(1 - \frac{n}{\tang n}\right) = n^2.\int \rho a^2 da;$$

on a donc

$$\frac{D}{(\rho)} = \frac{3}{n^2}.\left(1 - \frac{n}{\tang n}\right) = \frac{3q}{n^2};$$

en faisant

$$q = 1 - \frac{n}{\tang n};$$

$\frac{D}{(\rho)}$ étant le rapport de la densité moyenne de la Terre, à la densité de sa surface; n^2 étant $\frac{2\varpi}{k}$. Cette équation donne entre k et D, une relation qui détermine une de ces quantités, lorsque l'autre est connue.

L'ellipticité du sphéroïde terrestre détermine sa figure, la variation de la pesanteur à sa surface, les mouvemens de son axe de rotation, et les inégalités lunaires dues à son aplatissement. On satisfait donc à tous ces phénomènes, en satisfaisant à l'ellipticité déterminée précédemment. Si l'on nomme h l'ellipticité de la couche du sphéroïde, dont le rayon est a, et dont ρ est la densité; on a par le n° 30 du troisième Livre,

$$\frac{ddh}{da^2} - \frac{6h}{a^2} + \frac{2\rho a}{\int \rho . a^2 da}.\left(\frac{adh + hda}{da}\right) = 0.$$

Si l'on met cette équation sous la forme

$$0 = \frac{d^2.(h\int \rho a^2 da)}{da^2} - \frac{6h.\int \rho a^2 da}{a^2} - \frac{ha^2 d\rho}{da};$$

et si au lieu de $\frac{d\rho}{da}$, on substitue sa valeur $-\frac{n^2}{a^2}.\int \rho' a da$; on aura

$$0 = \frac{d^2.(h.\int \rho' a da)}{da} - \frac{6h.\int \rho' a da}{a^2} + n^2 h.\int \rho' a da.$$

Il est facile de voir que l'on satisfait à cette équation, en faisant

$$h.\int\rho' ada = \mathrm{H}.\rho'.\left(1 - \frac{3}{n^2a^2}\right) + \frac{3\mathrm{H}.d\rho'}{n^2ada};$$

H étant une constante arbitraire, et en observant que

$$\frac{dd\rho'}{da^2} = -n^2\rho'.$$

Cette expression donne pour l'ellipticité h,

$$h = -\mathrm{H}.\left(\frac{3}{a^2} + \frac{n^2.\operatorname{tang} an}{an - \operatorname{tang} an}\right);$$

ellipticité qui multipliée par a, devient nulle au centre du sphéroïde, où a est nul. On voit par le n° 30 du troisième Livre, que cette valeur de h est la seule admissible dans la question présente. Par le même numéro, l'ellipticité de la Terre est à la surface où $a = 1$,

$$\frac{\alpha\phi.h.\int\rho' ada}{2h.\int\rho' ada - \frac{2}{5}h(\rho) + \frac{2}{5}.\int a^5 hd\rho},$$

les intégrales étant prises depuis a nul jusqu'à $a = 1$; $\alpha\phi$ est le rapport de la force centrifuge à la pesanteur à l'équateur. En substituant au lieu de $\frac{d\rho}{da}$, sa valeur $-\frac{n^2}{a^2}.\int\rho' ada$, et au lieu de $h\int\rho' ada$, sa valeur précédente; on aura

$$\int a^5 hd\rho = -n^2\mathrm{H}.\int a^3 da.\left(\rho' - \frac{3\rho'}{n^2a^2} + \frac{3d\rho'}{n^2ada}\right),$$

ρ' étant $\mathrm{A}.\sin an$. On trouvera ainsi à la surface de la Terre où $a = 1$, l'ellipticité h du sphéroïde égale à

$$\frac{\frac{5}{2}\alpha\phi.\left(1 - \frac{3q}{n^2}\right)}{3 - q - \frac{n^2}{q}}.$$

Je dois observer ici que M. Legendre a déterminé l'aplatissement de la Terre, dans le cas où la densité des couches est exprimée par $\frac{\mathrm{A}}{a}.\sin an$.

(Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1789). En réunissant ces divers résultats, on a

$$q = 1 - \frac{n}{\text{tang}\, n};$$

$$D = \frac{3q}{n^2},$$

$$\text{ellipticité de la Terre} = 0{,}00865 . \frac{\left(1 - \frac{3q}{n^2}\right)}{3 - q - \frac{n^2}{q}},$$

$$k = \frac{2\pi}{n^2}.$$

Si l'on suppose $n = \frac{5}{6}\pi$, π étant le rapport de la circonférence au diamètre; on aura

$$q = 5{,}5345;$$

$$\text{ellipticité} = \frac{1}{306{,}6};$$

$$\frac{D}{(\rho)} = 2{,}4225.$$

A la surface, on a

$$\frac{d\Pi}{d\rho} = 2k(\rho) = \frac{g.(\rho)\, l}{i.(\rho)},$$

g étant la pesanteur, l étant la hauteur d'une colonne de la matière de cette surface, et qui presse un de ses points; et $i(\rho)$ étant l'accroissement de densité du point pressé. g est égal à la masse de la Terre, divisée par le carré de son rayon pris pour unité; on a donc

$$g = \frac{4}{3}\pi . D.$$

Ensuite on a $2k = \frac{4\pi}{n^2}$; on a ainsi

$$\frac{D}{(\rho)} = \frac{3i}{ln^2} = \frac{3q}{n^2};$$

donc

$$q = \frac{i}{l};$$

la valeur de i relative à la matière de la surface du sphéroïde est donc ici $5{,}5345 . l$. L'existence d'une telle substance est très admissible.

Si la Terre était entièrement formée d'eau, et si l'on suppose conformément aux expériences de Canton, qu'à la température de 16°, la densité de l'eau augmente dans le rapport de 0,000044 à l'unité, par la pression d'une colonne verticale d'eau, de dix mètres; on aura

$$q = 28{,}012,$$
$$n = 3{,}0297,$$
$$\frac{D}{(\rho)} = 9{,}0479,$$
$$\text{ellipticité} = \frac{1}{359{,}54}.$$

Le coefficient du carré du sinus de la latitude, dans l'expression de la longueur du pendule, sera 0,00587. Ces résultats s'éloignent des observations, fort au-delà des erreurs dont elles sont susceptibles.

7. Pour comparer entre elles, les mesures, soit des degrés, soit de la pesanteur, on les rapporte au niveau de la mer, et l'on peut déterminer l'élévation du point du sphéroïde, où l'on observe, par la hauteur du baromètre. Pour avoir une idée juste de ce niveau, nous avons imaginé une atmosphère très rare, très peu élevée, mais cependant assez pour embrasser toute la Terre et ses montagnes. Nous avons prouvé que l'élévation de la surface de cette atmosphère, au-dessus de la surface de la mer est constante, et nous avons prolongé cette dernière surface au-dessous des continens; de manière qu'elle fût toujours à la même distance de la surface de l'atmosphère. C'est la surface de la mer, ainsi prolongée, qui constitue le niveau de la mer. Mais au lieu de rapporter les degrés et les expériences du pendule, à ce niveau; nous les rapporterons directement à la surface de l'atmosphère supposée.

Reprenons les équations trouvées ci-dessus.

$$\begin{aligned} P.(\alpha\bar{y} + \alpha y'') = \text{const.} &+ 4\alpha\pi.\int\rho.d.\left(\frac{a^5 Y^{(2)}}{5} + \frac{a^6 Y^{(3)}}{7} + \text{etc.}\right), \\ &+ U_1^{(2)} + U_1^{(3)} + \text{etc.}, \\ &- \frac{\alpha\varphi.P}{2}.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p' = \text{const.} &+ 4\alpha\pi.\int\rho.d.\left(\frac{a^5 Y^{(2)}}{5} + \frac{2a^6 Y^{(3)}}{7} + \text{etc.}\right), \\ &- \frac{3}{2}.(U_1^{(1)} + U_1^{(2)} + U_1^{(3)} + \text{etc.}) + 2\alpha\varphi.P.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right); \end{aligned}$$

Si l'on retranche cette dernière équation, de la précédente; si l'on néglige l'action de la mer, que nous avons vu être insensible, soit à raison de son peu de densité, soit à cause de son peu de profondeur, ce qui fait disparaître les quantités $U_1^{(1)}$, $U_1^{(2)}$, etc.; enfin, si l'on suppose les couches du sphéroïde, elliptiques; on a

$$p' - P.(\alpha\bar{y} + \alpha y'') = \frac{5}{2}\alpha\Phi.P.\left(\mu^2 - \frac{1}{3}\right).$$

Les coefficiens de $\mu^2 - \frac{1}{3}$ dans $\alpha\bar{y}$ et $\alpha y''$ sont $-\alpha\bar{h}$ et $-\alpha h''$. Soit αq le coefficient de $\mu^2 - \frac{1}{3}$, dans l'expression de p'; on aura

$$\alpha q + \alpha(\bar{h} + h'') = \frac{5}{2}.\alpha\Phi.$$

On doit observer que $\alpha(\bar{h} + h'')$ est l'ellipticité de la surface de l'atmosphère supposée, et par conséquent celle de la surface de la mer, ces deux surfaces étant constamment à la même distance l'une de l'autre. A la surface du sphéroïde, la pesanteur p' doit être augmentée de la quantité $2\alpha(l - \alpha y'')P$. En nommant donc $\alpha\bar{q}$ le coefficient de $\mu^2 - \frac{1}{3}$ dans l'expression de la pesanteur à cette surface, on aura

$$2\alpha h'' = \alpha\bar{q} - \alpha q;$$

ce qui donnerait la différence $\alpha h''$ des ellipticités de l'atmosphère et du sphéroïde terrestre, si l'on connaissait par les expériences du pendule, les valeurs de $\bar{q}$ et de q. Mais il résulte de ces expériences faites la plupart, au niveau de la mer, ou peu au-dessus, que la valeur de $\alpha h''$ est très petite, et presque insensible, ce qui est conforme à ce que nous avons dit précédemment. La surface de l'atmosphère supposée, étant celle à laquelle on rapporte les mesures des degrés et de la pesanteur; il paraît naturel de corriger ces mesures, en ayant seulement égard à la distance des points où l'on observe, à cette surface; à moins que l'élévation de ces points ne soit assez rapide, pour que l'on soit assuré qu'ils n'appartiennent point à la partie elliptique du sphéroïde terrestre. Telle est la ville de Quito, où l'on a mesuré des degrés du méridien, et la longueur du pendule à secondes. Nous allons donc examiner l'effet de l'attraction d'un plateau élevé, sur la pesanteur

Si l'on conçoit une série de couches circulaires, horizontales, et disposées de manière que leurs centres soient sur une même verticale; et que l'on place Quito au centre de la couche supérieure; en nommant ρ_1 la densité de ces couches, R le rayon de l'une d'elles, dont le centre est à la distance r de Quito; la somme des molécules de cette couche, divisées par leurs distances respectives à Quito, sera

$$2\pi\rho_1.\left(\sqrt{R^2+r^2}-r\right).$$

R étant supposé fort grand relativement à r, cette fonction se réduit à fort peu près à

$$2\pi\rho_1.(R-r);$$

elle reste donc toujours fort petite, si, comme on doit le supposer ici, R est une petite fraction du rayon terrestre. Elle n'apporte ainsi qu'un terme insensible dans l'équation de l'équilibre de l'atmosphère, et par conséquent la somme de ces fonctions ne produit aucun changement sensible dans la valeur de la distance de Quito à la surface de l'atmosphère, distance que je désignerai par $\alpha y'''$; en sorte que $\alpha l-\alpha y'''$ est la hauteur de Quito au-dessus du niveau de la mer. L'attraction de la couche que nous venons de considérer, produit dans la pesanteur p_1 à Quito, un accroissement égal à la différentielle de la fonction précédente, prise par rapport à r et divisée par $-dr$; cet accroissement est à très peu près égal à $2\pi\rho_1$; il est indépendant de R, et il peut être sensible pour toute la montagne, pour laquelle il devient $2\pi\rho_1 r'$, r' étant la hauteur de la montagne au-dessus du niveau du sphéroïde terrestre. La rapidité avec laquelle le plateau s'élève, et le peu de différence entre les surfaces de la mer et du sphéroïde, rendent r' très peu différent de $\alpha l-\alpha y'''$; on peut donc l'obtenir par l'observation du baromètre. La pesanteur P de la Terre étant à fort peu près $\frac{4}{3}\pi.D$, D étant la moyenne densité de la Terre; l'accroissement de la pesanteur, dû à l'action de la montagne, sera

$$\frac{3}{2}P.\frac{\rho_1}{D}.(\alpha l-\alpha y''').$$

Le rayon terrestre étant pris pour l'unité, on a relativement à Quito

$$\alpha l-\alpha y'''=\frac{1}{223};$$

la diminution de la pesanteur, depuis le niveau de la mer, est donc pour cette ville

$$\frac{P}{2237} \cdot \left(2 - \frac{3}{2} \cdot \frac{\rho_1}{D}\right).$$

Bouguer a conclu de ses expériences sur la longueur du pendule, cette diminution égale à $\frac{P}{1331}$; ce qui donne

$$\frac{\rho_1}{D} = 0{,}2123.$$

La densité des Cordillières n'est donc qu'un cinquième environ de la moyenne densité de la Terre. Elle est peu différente de celle de l'eau, qui, d'après l'expérience de Cavendish, est D. 0,182. Le peu de densité de ces montagnes résulte encore du peu d'effet de leur attraction sur le fil-à-plomb dans les observations des astronomes français qui ont remarqué que ces montagnes sont très volcaniques, et qu'ainsi elles doivent avoir de grandes cavités dans leur intérieur.

CHAPITRE III.

De l'axe de rotation de la Terre.

8. Soit, $a(1+\alpha y_1)$ le rayon d'une couche du sphéroïde terrestre, l'origine de ce rayon étant supposée au centre de gravité du sphéroïde; y_1 étant fonction de a, du sinus de la latitude, que je désignerai par μ_1, et de la longitude que je désignerai par ϖ_1. Je suppose y_1 développé dans une suite de la forme

$$Y_1^{(1)}+Y_1^{(2)}+Y_1^{(3)}+\text{etc.},$$

$Y_1^{(i)}$ étant assujetti à l'équation aux différences partielles

$$0=\left[\frac{d.(1-\mu_1^2)\left(\frac{dY_1^{(i)}}{d\mu_1}\right)}{d\mu_1}+\frac{\left(\frac{ddY_1^{(i)}}{d\varpi_1^2}\right)}{1-\mu_1^2}+i.\overline{i+1}.Y_1^{(i)}\right].$$

Transportons l'origine des rayons terrestres, à un point quelconque qui ne soit éloigné du centre de gravité du sphéroïde, que d'une quantité de l'ordre α; il est facile de voir que cela ne fait qu'augmenter $Y_1^{(1)}$ de la quantité

$$Q\mu_1+Q^{(1)}.\sqrt{1-\mu_1^2}.\sin\varpi_1+Q^{(2)}.\sqrt{1-\mu_1^2}.\cos\varpi_1. \qquad (a)$$

Concevons par cette nouvelle origine, un second axe parallèle au premier, et rapportons-y les variables μ_1 et ϖ_1. Elles ne différeront des précédentes, que de quantités de l'ordre α; en négligeant donc les quantités de l'ordre α^2, les valeurs de $Y_1^{(2)}$, $Y_1^{(3)}$, etc. seront les mêmes que les précédentes; seulement, la fonction $Y_1^{(1)}$ sera augmentée de la quantité (a). Nous pourrons ainsi exprimer avec cette condition, le rayon d'une couche terrestre rapporté à ce second axe, par $a.(1+\alpha y_1)$.

Concevons ensuite par la nouvelle origine, un troisième axe aboutissant à un point quelconque de la surface du sphéroïde, pour lequel μ_1 et ϖ_1 soient $\cos A$ et Π. Soient μ et ϖ, ce que deviennent μ_1 et ϖ_1

relativement à ce troisième axe; les ϖ étant comptés du méridien qui passe par les extrémités du second et du troisième axe. On aura par les formules de la Trigonométrie sphérique,

$$\mu = \cos A . \mu_1 + \sin A . \sqrt{1 - \mu_1^2} . \cos(\varpi_1 - \Pi);$$
$$\sqrt{1 - \mu^2} . \sin \varpi = \sqrt{1 - \mu_1^2} . \sin(\varpi_1 - \Pi)$$

Ce qui donne

$$\sqrt{1 - \mu^2} . \cos \varpi = \cos A . \sqrt{1 - \mu_1^2} . \cos(\varpi_1 - \Pi) - \sin A . \mu_1.$$

Désignons par $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$, les trois coordonnées d'une molécule dm, de la couche du sphéroïde dont le rayon est $a.(1 + \alpha y_1)$, rapportées, la première au troisième axe dont nous venons de parler; la seconde, au plan du méridien origine des ϖ, et la troisième au plan perpendiculaire à ce méridien. On aura

$$\bar{x} = a.(1 + \alpha y_1).\mu,$$
$$\bar{y} = a.(1 + \alpha y_1).\sqrt{1 - \mu^2} . \cos \varpi,$$
$$\bar{z} = a.(1 + \alpha y_1).\sqrt{1 - \mu^2} . \sin \varpi.$$

On a ensuite en exprimant par ρ la densité de dm,

$$dm = \rho a^2 . (1 + \alpha y_1)^2 . d\mu_1 . d\varpi_1 . d.a.(1 + \alpha y_1);$$

cette dernière caractéristique différentielle d étant uniquement relative à la variation de a. On aura donc

$$\int \bar{x}\bar{y} . dm = \frac{1}{5} . \int \rho . d\mu_1 . d\varpi_1 . d.a^5 . (1 + \alpha y_1)^5 . \mu . \sqrt{1 - \mu^2} . \cos \varpi,$$

$$\int \bar{x}\bar{z} . dm = \frac{1}{5} . \int \rho . d\mu_1 . d\varpi_1 . d.a^5 . (1 + \alpha y_1)^5 . \mu . \sqrt{1 - \mu^2} . \sin \varpi,$$

$$\int \bar{y}\bar{z} . dm = \frac{1}{5} . \int \rho . d\mu_1 . d\varpi_1 . d.a^5 . (1 + \alpha y_1)^5 . (1 - \mu^2) . \sin \varpi . \cos \varpi,$$

$$\int (\bar{y}^2 - \bar{z}^2) . dm = \frac{1}{5} . \int \rho . d\mu_1 . d\varpi_1 . d.a^5 . (1 + \alpha y_1)^5 . (1 - \mu^2) . (\cos^2 \varpi - \sin^2 \varpi).$$

Les intégrales doivent être prises depuis $\mu_1 = -1$ jusqu'à $\mu_1 = 1$; depuis $\varpi_1 = 0$ jusqu'à $\varpi_1 = 2\pi$; et depuis $a = 0$ jusqu'à $a = 1$. En

substituant pour μ, $\sqrt{1-\mu^2}$, $\sin\varpi$, $\sqrt{1-\mu^2}.\cos\varpi$, leurs valeurs précédentes en μ_1 et ϖ_1, on aura

$$\int \bar{x}\,\bar{y}.dm = \alpha.\int\rho.d\mu_1.d\varpi_1.d.a^5 y_1.\left\{\begin{array}{l} \frac{3}{2}.\sin A.\cos A.\left(\frac{1}{3}-\mu_1^2\right) \\ +\cos 2A.\mu_1.\sqrt{1-\mu_1^2}.\cos(\varpi_1-\Pi) \\ +\frac{1}{2}.\sin A.\cos A.(1-\mu_1^2).\cos(2\varpi_1-2\Pi) \end{array}\right\}$$

$$\int \bar{x}\,\bar{z}.dm = \alpha\int\rho.d\mu_1.d\varpi_1.d.a^5.y_1.\left\{\begin{array}{l} \cos A.\mu_1.\sqrt{1-\mu_1^2}.\sin(\varpi_1-\Pi) \\ +\frac{1}{2}.\sin A.(1-\mu_1^2).\sin(2\varpi_1-2\Pi) \end{array}\right\}$$

$$\int \bar{y}\,\bar{z}.dm = \alpha.\int\rho.d\mu_1.d\varpi_1.d.a^5.y_1.\left\{\begin{array}{l} \frac{1}{2}.\cos A.(1-\mu_1^2).\sin(2\varpi_1-2\Pi) \\ -\sin.A.\mu_1.\sqrt{1-\mu_1^2}.\sin(\varpi_1-\Pi) \end{array}\right\}$$

$$\int(\bar{y}^2-\bar{z}^2).dm = \alpha\int\rho.d\mu_1.d\varpi_1.d.a^5.y_1.\left\{\begin{array}{l} \frac{1}{2}.\sin^2 A.(3\mu_1^2-1) \\ -2.\sin A.\cos A.\mu_1.\sqrt{1-\mu_1^2}.\cos(\varpi_1-\Pi) \\ +\frac{(1+\cos^2 A)}{2}.(1-\mu_1^2).\cos(2\varpi_1-2\Pi) \end{array}\right\}$$

Dans ces équations, les coefficiens de $\rho.d\mu_1 d\varpi_1.d.a^5 y_1$ sont compris dans la forme $Y_1^{(2)}$; il faut donc par le n° 17 du troisième Livre, ne considérer dans y_1, que le terme $Y_1^{(2)}$. L'expression générale de ce terme est

$$h^{(0)}.\left(\mu_1^2-\frac{1}{3}\right)+h^{(1)}.\mu_1.\sqrt{1-\mu_1^2}.\sin\varpi_1+h^{(2)}.\mu_1.\sqrt{1-\mu_1^2}.\cos\varpi_1$$
$$+h^{(3)}.(1-\mu_1^2).\sin 2\varpi_1+h^{(4)}.(1-\mu_1^2).\cos 2\varpi_1;$$

$h^{(0)}$, $h^{(1)}$, $h^{(2)}$, $h^{(3)}$, $h^{(4)}$ étant des fonctions de a. On trouvera ainsi

$$\int xy.dm = -\frac{4\pi}{15}.\alpha.\sin 2A.\int\rho.d.a^5 h^{(0)}$$
$$+\frac{4\pi}{15}.\alpha.\cos 2A.\left\{\begin{array}{l} \sin\Pi.\int\rho.d.a^5 h^{(1)} \\ +\cos\Pi.\int\rho.d.a^5 h^{(2)} \end{array}\right\}$$
$$+\frac{4\pi}{15}.\alpha.\sin 2A.\left\{\begin{array}{l} \sin 2\Pi.\int\rho.d.a^5 h^{(3)} \\ +\cos 2\Pi.\int\rho.d.a^5 h^{(4)} \end{array}\right\};$$

$$\int \bar{x}\,\bar{z}.dm = \frac{4\pi\alpha}{15}.\cos A.\left\{\begin{matrix}\cos\Pi\ \int\rho.d.a^5h^{(1)}\\ -\sin\Pi.\int\rho.d.a^5h^{(2)}\end{matrix}\right\}$$
$$+\frac{8\pi\alpha}{15}.\sin A.\left\{\begin{matrix}\cos 2\Pi\ \int\rho.d\ a^5h^{(3)}\\ -\sin 2\Pi\ \int\rho\ d.a^5h^{(4)}\end{matrix}\right\},$$

$$\int \bar{y}\,\bar{z}.dm = \frac{8\pi\alpha}{15}.\ \cos.\left\{\begin{matrix}\cos 2\Pi\ \int\rho.d.a^5h^{(3)}\\ -\sin 2\Pi\ \int\rho.d.a^5h^{(4)}\end{matrix}\right\}$$
$$-\frac{4\pi\alpha}{15}.\sin A.\left\{\begin{matrix}\cos\Pi\ \int\rho.d.a^5h^{(1)}\\ -\sin\Pi.\int\rho.d.a^5h^{(2)}\end{matrix}\right\},$$

$$\int(\bar{y}^2-\bar{z}^2).dm = \frac{8\pi\alpha}{15}.\sin^2 A\ \int\rho.d.a^5h^{(0)}$$
$$-\frac{8\pi\alpha}{15}.\sin A.\cos A.\left\{\begin{matrix}\sin\Pi.\int\rho.d.a^5h^{(1)}\\ +\cos\Pi.\int\rho.d.a^5h^{(2)}\end{matrix}\right\}$$
$$+\frac{8\pi\alpha}{15}.(1+\cos^2 A).\left\{\begin{matrix}\sin 2\Pi.\int\rho.d.a^5h^{(3)}\\ +\cos 2\Pi.\int\rho\ d\ a^5h^{(4)}\end{matrix}\right\}$$

Maintenant, si nous imaginons que l'axe du sphéroïde auquel nous venons de rapporter les coordonnées $\bar{x}$, $\bar{y}$, $\bar{z}$, soit fixe dans le sphéroïde et dans l'espace, de manière cependant que le sphéroïde tourne librement autour de lui, et si nous concevons ce sphéroïde recouvert en tout ou en partie, par la mer, on voit par le chapitre précédent, que le fluide peut toujours prendre un état d'équilibre, qu'il est possible d'obtenir par des approximations successives

Je suppose la mer parvenue à cet état elle forme alors avec le sphéroïde terrestre, un ensemble dont toutes les parties sont immobiles entre elles, et peuvent être supposées invariablement unies Je nomme α $H^{(0)}$, $\alpha.H^{(1)}$, $\alpha.H^{(2)}$, $\alpha.H^{(3)}$, les valeurs précédentes de $\int\bar{x}\bar{y}.dm$, $\int\bar{x}\,\bar{z}.dm$, $\int\bar{y}\,\bar{z}\ dm$, $\int(\bar{y}^2-\bar{z}^2).dm$ je nomme pareillement $\alpha.H'^{(0)}$, $\alpha.H'^{(1)}$, $\alpha.H'^{(2)}$, $\alpha.H'^{(3)}$, les valeurs des mêmes intégrales rapportées à la mer On aura relativement à la Terre entière,

$$\int\bar{x}\,\bar{y}.dm = \alpha.(H^{(0)}+H'^{(0)}),\quad \int\bar{x}\,\bar{z}.dm = \alpha.(H^{(1)}+H'^{(1)}),$$
$$\int\bar{y}\,\bar{z}.dm = \alpha.(H^{(2)}+H'^{(2)}),\quad \int(\bar{y}^2-\bar{z}^2).dm = \alpha.(H^{(3)}+H'^{(3)})$$

Maintenant, si l'on change le plan des $\bar{y}$ et des $\bar{z}$, de manière qu'en

passant toujours par l'axe des $\bar{x}$, il forme un angle arbitraire ε avec ce plan en nommant $\bar{y}'$ et $\bar{z}'$ les coordonnées rapportées à ce nouveau plan, on aura

$$\bar{y}' = \bar{y}.\cos\varepsilon - \bar{z}.\sin\varepsilon,$$
$$\bar{z}' = \bar{z}.\cos\varepsilon + \bar{y}.\sin\varepsilon,$$

ce qui donne

$$\int \bar{x}\bar{y}'.dm = \alpha.(H^{(0)} + H'^{(0)}).\cos\varepsilon - \alpha.(H^{(1)} + H'^{(1)}).\sin\varepsilon,$$
$$\int \bar{x}\bar{z}'.dm = \alpha.(H^{(1)} + H'^{(1)}).\cos\varepsilon + \alpha.(H^{(0)} + H'^{(0)}).\sin\varepsilon,$$
$$\int \bar{y}'\bar{z}'.dm = \alpha.(H^{(2)} + H'^{(2)}).(\cos^2\varepsilon - \sin^2\varepsilon)$$
$$+ \alpha.(H^{(3)} + H'^{(3)}).\sin\varepsilon.\cos\varepsilon$$

L'axe des $\bar{x}$ sera un axe principal de rotation, autour duquel la Terre tournera librement, si l'on satisfait aux trois équations

$$\int \bar{x}\bar{y}'.dm = 0, \quad \int \bar{x}\bar{z}'.dm = 0, \quad \int \bar{y}'\bar{z}'.dm = 0.$$

Les deux premières donnent

$$H^{(0)} + H'^{(0)} = 0, \quad H^{(1)} + H'^{(1)} = 0$$

La troisième donne

$$\text{tang}\, 2\varepsilon = -\frac{2\,(H^{(2)} + H'^{(2)})}{H^{(3)} + H'^{(3)}}$$

Pour que le centre de gravité de la Terre soit libre, et dans l'axe principal de rotation, il faut que l'on ait pour toute la Terre,

$$\int \bar{x}.dm = 0, \quad \int \bar{y}'.dm = 0, \quad \int \bar{z}'.dm = 0,$$

or on a pour le sphéroïde terrestre

$$\int \bar{x}.dm = \frac{1}{4}.\int \rho.d\mu_1.d\varpi_1.d.a^4.(1 + \alpha y_1)^4.\mu,$$

$$\int \bar{y}.dm = \frac{1}{4}.\int \rho.d\mu_1.d\varpi_1.d\ a^4.(1 + \alpha y_1)^4.\sqrt{1 - \mu^2}.\cos\varpi,$$

$$\int \bar{z}.dm = \frac{1}{4}.\int \rho.d\mu_1.d\varpi_1.d.a^4.(1 + \alpha y_1)^4.\sqrt{1 - \mu_1^2}.\sin\varpi.$$

En substituant pour μ, $\sqrt{1-\mu^2}$, $\sin\varpi$, $\sqrt{1-\mu^2}.\cos\varpi$, leurs valeurs en μ_1 et ϖ_1, on aura

$$\int\bar{x}\,dm = \alpha\int\rho\,d\mu_1\,d\varpi_1\,d\,a^4y_1\,[\cos A\,\mu_1 + \sin A.\sqrt{1-\mu_1^2}\cos(\varpi_1-\Pi)],$$

$$\int\bar{y}.dm = \alpha\int\rho\,d\mu_1.d\varpi_1.d\,a^4y_1\,[\cos A\sqrt{1-\mu_1^2}\cos(\varpi_1-\Pi) - \sin A\,\mu_1],$$

$$\int\bar{z}\,dm = \alpha\int\rho\,d\mu_1\,d\varpi_1\,d\,a^4y_1\sqrt{1-\mu_1^2}\sin(\varpi_1-\Pi)$$

Les coefficiens de $\rho\,d\mu_1\,d\varpi_1\,d\,a^4y_1$ étant compris dans la forme $Y_1^{(1)}$, il ne faut, par le n° cité du troisième livre de la Mécanique céleste, considérer dans y_1 que la quantité $Y_1^{(1)}$ L'expression générale de cette fonction est

$$q^{(0)}.\mu_1 + q^{(1)}.\sqrt{1-\mu_1^2}.\sin\varpi_1 + q^{(2)}\sqrt{1-\mu_1^2}.\cos\varpi_1$$

Il faut, par ce qui précède, augmenter $Y^{(1)}$, de la fonction (a) On aura ainsi relativement au sphéroide terrestre,

$$\begin{aligned}\int\bar{x}.dm = {} & \tfrac{4}{3}\alpha\pi.\cos A.(\int\rho.d.a^4q^{(0)} + Q^{(0)}.\int\rho.d.a^4)\\ & + \tfrac{4}{3}\alpha\pi.\sin A.\left\{\begin{matrix}\sin\Pi.(\int\rho.d.a^4q^{(1)} + Q^{(1)}.\int\rho.d.a^4)\\ +\cos\Pi.(\int\rho.d.a^4q^{(2)} + Q^{(2)}.\int\rho.d\,a^4)\end{matrix}\right\},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int\bar{y}.dm = {} & \tfrac{4}{3}\alpha\pi.\cos A.\left\{\begin{matrix}\sin\Pi.(\int\rho.d.a^4q^{(1)} + Q^{(1)}.\int\rho.d.a^4)\\ +\cos\Pi.(\int\rho.d.a^4q^{(2)} + Q^{(2)}.\int\rho\,d.a^4)\end{matrix}\right\}\\ & - \tfrac{4}{3}\alpha\pi.\sin A.[\int\rho.d.a^4q^{(0)} + Q^{(0)}.\int\rho.d.a^4],\end{aligned}$$

$$\int\bar{z}.dm = \tfrac{4}{3}\alpha\pi.\left\{\begin{matrix}\cos\Pi.[\int\rho.d.a^4q^{(1)} + Q^{(1)}.\int\rho.d.a^4]\\ -\sin\Pi.[\int\rho.d.a^4q^{(2)} + Q^{(2)}.\int\rho.d.a^4]\end{matrix}\right\}$$

Soient $\alpha L^{(0)}$, $\alpha L^{(1)}$, $\alpha L^{(2)}$, ces trois valeurs de $\int\bar{x}\,dm$, $\int\bar{y}\,dm$, $\int\bar{z}\,dm$, et désignons par $\alpha L'^{(0)}$, $\alpha L'^{(1)}$, $\alpha L'^{(2)}$, les mêmes intégrales relatives à la mer La condition que l'axe principal passe par le centre de gravité de la Terre entière et soit l'origine des rayons terrestres, donnera les trois équations

$$L^{(0)} + L'^{(0)} = 0,\quad L^{(1)} + L'^{(1)} = 0,\quad L^{(2)} + L'^{(2)} = 0,$$

ces trois équations réunies aux précédentes

$$H^{(0)}+H'^{(0)}=0,\quad H^{(1)}+H'^{(1)}=0,$$

$$\operatorname{tang} 2\varepsilon=-\frac{2(H^{(2)}+H'^{(2)})}{H^{(3)}+H'^{(3)}},$$

détermineront les six indéterminées A, H, ε, Q, $Q^{(1)}$, $Q^{(2)}$, et alors l'axe de rotation sera un axe principal, et passera par le centre de gravité de la Terre. L'existence d'un pareil axe est donc toujours possible, et les observations prouvent que tel est l'axe actuel de rotation de la Terre.

On a relativement à la mer,

$$\int\bar{x}\bar{y}.dm=\int\bar{x}\bar{y}.\alpha y'.d\mu_1.d\varpi_1,$$

$\alpha y'$ étant sa profondeur, mais les intégrales relatives à μ_1 et ϖ_1 ne peuvent être prises depuis $\mu_1=-1$ jusqu'à $\mu_1=1$, et depuis $\varpi_1=0$, jusqu'à $\varpi_1=2\pi$, que dans le cas où la mer recouvre entièrement le sphéroide terrestre. Considérons ce cas particulièrement alors, il ne faut substituer pour $\alpha y'$, que sa partie $\alpha Y'^{(2)}$. L'équation (4) du n° 2 du chapitre précédent donne

$$Y'^{(2)}=\frac{-\bar{Y}^{(2)}+\dfrac{3\int\rho.d\,a^5Y^{(2)}}{5\int\rho\,d.a^5}-\dfrac{\varphi}{2}.\left(\mu^2-\dfrac{1}{3}\right)}{1-\dfrac{3}{5.\int\rho.d\,a^5}},$$

les quantités $Y'^{(2)}$, $\bar{Y}^{(2)}$, $Y^{(2)}$, se rapportant ici à l'axe des μ. Mais rapportées à l'axe des μ_1, elles restent les mêmes : elles ne sont que des manières différentes d'exprimer les fonctions du rayon terrestre et du rayon de chaque couche du sphéroide, comprises dans la forme $\alpha Y^{(2)}$, ou assujetties à la même équation aux différences partielles. La partie de $Y'^{(2)}$, dépendante de φ, ne produit aucun terme dans $H'^{(0)}$, $H'^{(1)}$, $H'^{(2)}$, $H'^{(3)}$. Pour le faire voir, considérons la valeur de $H^{(0)}$, ou l'intégrale $\int\bar{x}\bar{y}.Y'^{(2)}.d\mu_1.d\varpi_1$. Il est facile de voir que l'on peut donner à cette intégrale, cette forme $\int\bar{x}\bar{y}.Y'^{(2)}.d\mu.d\varpi$, les limites des intégrales relatives à μ et ϖ, étant comme pour μ_1 et ϖ_1, $\mu=-1$, $\mu=1$, $\varpi=0$, $\varpi=2\pi$. Alors en substituant dans l'intégrale

$\int \bar{x}\bar{y}\, Y'^{(2)}.d\mu.d\varpi$, $\mu\sqrt{1-\mu^2}.\cos\varpi_1$ pour $\bar{x}\bar{y}$, et $\dfrac{-\frac{\varphi}{2}\left(\mu^2-\frac{1}{3}\right)}{1-\frac{3}{5\int\rho\, d\, a^5}}$

pour $Y'^{(2)}$, on voit que cette intégrale est nulle, ainsi cette partie de $Y'^{(2)}$ ne produit aucun terme dans $H'^{(0)}$, et l'on trouverait, de la même manière qu'elle n'en produit aucun dans $H'^{(1)}$, $H'^{(2)}$, et $H'^{(3)}$. L'autre partie de $Y'^{(2)}$ peut être exprimée par

$$h'^{(0)}.\left(\mu_1^2-\frac{1}{3}\right)+h'^{(1)}\ \mu_1.\sqrt{1-\mu_1^2}.\sin\varpi_1+h'^{(2)}\ \sqrt{1-\mu_1^2}\ \cos\varpi_1$$
$$+h'^{(3)}.(1-\mu_1^2)\ \sin 2\varpi_1+h'^{(4)}\ (1-\mu_1^2)\ \cos 2\varpi_1$$

et l'on aura

$$h'^{(s)}=\frac{-\bar{h}^{(s)}+\frac{3\int\rho\, d\, a^5 h^{(s)}}{5\int\rho\, d\, a^5}}{1-\frac{3}{5\int\rho\, d\, a^5}},\quad (i)$$

en faisant successivement, $s=0$, $s=1$, $s=2$, $s=3$, $s=4$. Cela posé; les équations

$$H^{(0)}+H'^{(0)}=0,\quad H^{(1)}+H'^{(1)}=0,$$

donnent les suivantes

$$0=\sin 2A.\left\{\begin{array}{l} h'^{(0)}+\int\rho.d.a^5h^{(0)} \\ -\sin 2\Pi.(h'^{(3)}+\int\rho.d.a^5h^{(3)}) \\ -\cos 2\Pi.(h'^{(4)}+\int\rho.d.a^5h^{(4)}) \end{array}\right\}$$
$$-\cos 2A\left\{\begin{array}{l} \sin\Pi.(h'^{(1)}+\int\rho.d.a^5h^{(1)}) \\ +\cos\Pi.(h'^{(2)}+\int\rho.d.a^5h^{(2)}) \end{array}\right\},$$

$$0=\cos A.\left\{\begin{array}{l} \cos\Pi.(h'^{(1)}+\int\rho.d.a^5h^{(1)}) \\ -\sin\Pi.(h'^{(2)}+\int\rho.d.a^5h^{(2)}) \end{array}\right\}$$
$$+2\sin A.\left\{\begin{array}{l} \cos 2\Pi.(h'^{(3)}+\int\rho.d.a^5h^{(3)}) \\ -\sin 2\Pi.(h'^{(4)}+\int\rho.d.a^5h^{(4)}) \end{array}\right\}$$

Désignons par f et g, les coefficiens de $\sin 2A$ et de $\cos 2A$, dans la première de ces deux équations, et par m et n, les coefficiens de $\sin A$

s la seconde, on aura

$$\tang A = -\frac{n}{m},$$

$$\sin 2A = \frac{-2mn}{m^2+n^2}; \quad \cos 2A = \frac{m^2-n^2}{m^2+n^2},$$

ce

$$0 = -2mnf + (m^2-n^2).g$$

tituant pour f, g, m, n, leurs valeurs, et faisant

$$\tang \Pi = u,$$

on trouve après les réductions, une équation du troisième degré en u, et qui conséquemment, a une racine réelle. Cette équation coïncide avec l'équation du troisième degré en u, que nous avons donnée dans le n° 27 du premier Livre, relativement aux axes principaux des corps solides.

On remplira la condition que l'axe de rotation passe par le centre de gravité de la Terre entière, en observant que l'équation (4) du n° 2 du chapitre précédent donne

$$Y'^{(1)} = \frac{-\bar{Y}^{(1)} + \frac{\int \rho . d\ a^4 Y^{(1)}}{\int \rho\ d\ a^3}}{1 - \frac{1}{\int \rho . d\ a^3}};$$

en désignant donc l'expression de $Y'^{(1)}$ par

$$q'^{(0)}.\mu_1 + q'^{(1)}.\sqrt{1-\mu_1^2}.\sin \varpi_1 + q'^{(2)}.\sqrt{1-\mu_1^2}.\cos \varpi_1,$$

on a

$$q'^{(1)} = \frac{-\bar{q}'^{(1)} + \frac{\int \rho\ d\ a^4 q^{(1)}}{\int \rho\ d\ a^3}}{1 - \frac{1}{\int \rho\ d\ a^3}}, \quad (\iota')$$

en faisant successivement $s = 0$, $s = 1$, $s = 2$. On aura ainsi pour toute la Terre,

$$\int \bar{x} . dm = \frac{4}{3} \alpha \pi . \cos A . \left\{ \int \rho . d\, a^4 q^{(0)} + q'^{(0)} + Q^{(0)} \int \rho\, d\, a^4 \right\}$$
$$+ \frac{4}{3} \alpha \pi \sin A \left\{ \begin{array}{l} \sin \Pi \left(\int \rho\, d\, a^4 q^{(1)} + q'^{(1)} + Q^{(1)} \int \rho\, d\, a^4 \right) \\ + \cos \Pi \left(\int \rho\, d\, a^4 q^{(2)} + q'^{(2)} + Q^{(2)} \int \rho\, d\, a^4 \right) \end{array} \right\}$$

$$\int \bar{y} . dm = \frac{4}{3} \alpha \pi \cos A . \left\{ \begin{array}{l} \sin \Pi \left(\int \rho\, d\, a^4 q^{(1)} + q'^{(1)} + Q^{(1)} \int \rho\, d\, a^4 \right) \\ + \cos \Pi \left(\int \rho\, d\, a^4 q^{(2)} + q'^{(2)} + Q^{(2)} \int \rho\, d\, a^4 \right) \end{array} \right\}$$
$$- \frac{4}{3} \alpha \pi . \sin A . \left\{ \left(\int \rho . d . a^4 q^{(0)} + q'^{(0)} + Q^{(0)} . \int \rho\, d\, a^4 \right) \right\}$$

$$\int \bar{z} . dm = \frac{4}{3} \alpha \pi . \left\{ \begin{array}{l} \cos \Pi . \left(\int \rho . d\, a^4 q^{(1)} + q'^{(1)} + Q^{(1)} . \int \rho . d . a^4 \right) \\ - \sin \Pi . \left(\int \rho . d\, a^4 q^{(2)} + q'^{(2)} + Q^{(2)} . \int \rho . d . a^4 \right) \end{array} \right\}$$

Les conditions nécessaires pour que l'axe de rotation passe par le centre de gravité de la Terre, sont que ces trois valeurs de $\int \bar{x} . dm$, $\int \bar{y} . dm$, $\int \bar{z} . dm$, soient nulles, en les égalant donc à zéro, on déterminera les trois constantes $Q^{(0)}$, $Q^{(1)}$ et $Q^{(2)}$. Ainsi le sphéroïde terrestre recouvert en entier par la mer en équilibre, a un axe de rotation passant par le centre commun de gravité du sphéroïde et de la mer et autour duquel le sphéroïde tourne d'une manière uniforme.

L'analyse précédente conduit à un théorème fort simple sur la détermination de cet axe. En effet, l'équation précédente (1), donne, en observant que l'on peut mettre $\bar{h}^{(s)}$, sous la forme $\int d\, a^5 h^{(s)}$

$$h^{(s)} + \int \rho . d . a^5 h^{(s)} = \frac{\int (\rho - 1) . d\, a^5 h^{(s)}}{1 - \frac{5}{5 \int \rho\, d\, a^5}},$$

devant être supposé successivement égal à 0, 1, 2, 3, 4. En substituant les diverses valeurs du premier membre de cette équation, dans les trois équations qui déterminent les quantités A, Π et ε, on voit que ces équations déterminent l'axe principal du sphéroïde terrestre, lorsqu'on suppose les densités ρ de ses couches, diminuées de l'unité ou de la densité de la mer.

Pareillement l'équation (i') donne

$$q'^{(0)} + \int \rho . d . a^4 q^{(0)} = \frac{\int (\rho - 1) . d . a^4 q^{(0)}}{1 - \frac{1}{\int \rho . d . a^2}}$$

Si l'on fixe l'origine des coordonnées, au centre de gravité du sphéroïde terrestre modifié par la diminution précédente de ses couches, on aura $q^{(0)} = 0$, les expressions de $\int \bar{x} . dm$, $\int \bar{y} . dm$, $\int \bar{z} . dm$, égalées à zéro, donneront ainsi $Q^{(0)}$, $Q^{(1)}$, $Q^{(2)}$, nuls. Ainsi le centre de gravité de la Terre entière est le centre de gravité du sphéroïde terrestre ainsi modifié. De là résulte ce théorème

« Si l'on conçoit la densité des couches du sphéroïde terrestre, diminuée » de la densité de la mer, et si par le centre de gravité de ce sphéroïde » imaginaire, on conçoit un axe principal de rotation de ce sphéroïde, » en faisant tourner autour de cet axe, le vrai sphéroïde terrestre et la » mer, ce fluide étant en équilibre; cet axe sera un axe principal de » rotation de la Terre entière dont le centre de gravité sera celui du » sphéroïde imaginaire. »

Ainsi, la Terre a pour axes principaux, les trois axes principaux de rotation du sphéroïde imaginaire, du moins, si la mer est assez profonde, pour qu'étant en équilibre, en tournant autour de chacun de ces axes, elle recouvre entièrement le sphéroïde terrestre. Mais il y a entre un corps solide et la Terre, cette différence, savoir, qu'en changeant d'axe principal de rotation, la figure du solide reste constante; au lieu que la Terre change de figure, en changeant d'axe principal. Les trois figures que prend sa surface, en changeant d'axe principal de rotation, ont entre elles des rapports simples et intéressans à connaître.

Considérons d'abord la mer en équilibre et tournant autour d'un de ces trois axes principaux, que je nommerai premier axe principal. Le rayon de la surface de la mer sera

$$1 + \alpha l + \alpha . (\bar{Y}^{(1)} + Y'^{(1)}) + \alpha . (\bar{Y}^{(2)} + Y'^{(2)}) + \alpha . (\bar{Y}^{(3)} + Y'^{(3)}) + \text{etc.},$$

l'origine de ce rayon étant au centre de gravité de la Terre entière. αl est la profondeur moyenne de la mer, et l'on a en nommant αm, la masse de ce fluide

$$\alpha . \int l . d\mu . d\varpi_1 = \alpha m$$

μ étant le sinus de la latitude, et ϖ_1 la longitude du premier axe principal. Les intégrales devant être prises depuis jusqu'à $\mu_1 = 1$, et depuis $\varpi_1 = 0$ jusqu'à $\varpi_1 = 2\pi$, on a

$$4\pi . rel = am$$

On a ensuite par le n° 5 du chapitre précédent,

$$Y'^{(i)} = \frac{-\overline{Y}^{(i)} + \frac{3\int\rho\, d\,(a^{i+3}\,Y^{(i)})}{(2i+1)\int\rho\, d\, a^3}}{1 - \frac{3}{(2i+1)\int\rho\, d\, a^3}}$$

et dans le cas de $i = 2$, on a

$$Y'^{(2)} = \frac{-\overline{Y}^{(2)} + \frac{3\int\rho\, d\,(a^5 Y^{(2)})}{5\int\rho\, d\, a^8} - \frac{\varphi}{2}.\left(\mu_1^2 - \frac{1}{3}\right)}{1 - \frac{3}{5\int\rho\, d\, a^3}}$$

On aura ainsi

$$Y'^{(i)} + \overline{Y}^{(i)} = \frac{3\,(\int\rho - 1)\, d\,(a^{i+3}\,Y^{(i)})}{(2i+1)\int\rho . d\, a^3 - 3},$$

et dans le cas de $i = 2$,

$$Y'^{(2)} + \overline{Y}^{(2)} = \frac{3.(\int\rho - 1)\, d\,(a^5 Y^{(2)}) - \frac{2}{5}\varphi\,(\mu_1^2 - \frac{1}{3})\int\rho\, d\, a^3}{5\int\rho . d\, a^3 - 3},$$

nommons u la fonction

$$\frac{3\,(\int\rho - 1)\, d\,(a^4 Y^{(1)})}{3\int\rho\, d . a^3 - 3} + \frac{3\int(\rho - 1)\, d\,(a^5 Y^{(2)})}{5\int\rho\, d\, a^3 - 3} + \frac{3\int(\rho - 1)\, d\,(a^6 Y^{(3)})}{7\int\rho\, d\, a^3 - 3} + \text{etc.}$$

Le rayon de la surface de la mer sera

$$1 + al + au - \frac{\frac{5}{2}\varphi\,(\mu_1^2 - \frac{1}{3})\int\rho\, d\, a^3}{5\int\rho\, d\, a^3 - 3}.$$

Supposons maintenant la mer en équilibre tournant avec le sphéroïde terrestre, autour du second axe principal, en nommant μ le sinus de latitude rapportée à cet axe, nous aurons pour l'expression du rayon

la mer

$$+\alpha l+\alpha u-\frac{\frac{5}{2}\alpha\varphi\ (\mu^2-\frac{1}{3})\int\rho\ d\ a^2}{5\int\rho\ d\ a^2-3},$$

que les valeurs de αl et de αu, correspondantes aux mêmes surface du sphéroïde terrestre, restent les mêmes dans les ons d'équilibre

ôtera μ, au premier axe principal, en observant que dans la μ en μ_1, donnée au commencement de ce chapitre, on doit r $A=\frac{\pi}{2}$, ce qui donne

$$\mu^2-\frac{1}{3}=\frac{(1-\mu_1^2)}{2}.\cos(2\varpi_1-2\Pi)-\frac{1}{2}\left(\mu_1^2-\frac{1}{3}\right)$$

Ainsi dans la seconde situation d'équilibre de la mer, le rayon de sa surface sera

$$1+\alpha l+\alpha u+\frac{\frac{5}{4}.\alpha\varphi\ [\mu_1^2-\frac{1}{3}-(1-\mu_1^2)\ \cos(2\varpi_1-2\Pi)]}{5\int\rho\ d.a^2-3}$$

On trouve de la même manière que la mer étant supposée en équilibre et tourner autour du troisième axe principal du sphéroïde imaginaire, le rayon de sa surface est

$$1+\alpha l+\alpha u+\frac{\frac{5}{4}\alpha\varphi\ [\mu_1^2-\frac{1}{3}+(1-\mu_1^2)\ \cos(2\varpi_1-2\Pi)]}{5\int\rho.d\ a^2-3}.$$

Ainsi la moyenne de ces trois rayons est

$$1+\alpha l+\alpha u,$$

elle est indépendante de la force centrifuge $\alpha\varphi$, et la même que le rayon de la mer en équilibre sur le sphéroïde terrestre sans mouvement de rotation.

L'action du Soleil et de la Lune influe sur la figure de la mer qui, ı, varie à chaque instant Parmi ces variations d'où naissent le et le reflux de la mer, quelques-unes sont constantes d'autres utent avec une grande lenteur Celles qui sont rigoureusement antes, concourent avec la force centrifuge, à produire la figure mente de la mer. Les variations très lentes changent insensible-

[illegible] cette figure, et vu leur lenteur et la tendance de la mer à se mettre promptement en équilibre, on peut supposer qu'à chaque instant cette heure est celle qui correspond à cet équilibre.

Soit ν le complément de la déclinaison d'un astre L, ψ son ascension droite, f sa distance au centre de la Terre, r étant celle d'une [illegible] de la surface de la mer, dont θ et ϖ sont le complément de la latitude, et la longitude, il faut par le n° 23 du troisième Livre, ajouter au second membre de l'équation (1) du n° 2 du chapitre précédent, la quantité

$$\frac{L}{f^3}\cdot\left(P^{(0)}+\frac{1}{f}\cdot P^{(1)}+\text{etc.}\right)$$

la fonction

$$\frac{1}{f}\cdot\left(1+\frac{1}{f}\cdot P^{(1)}+\frac{1}{f^2}\cdot P^{(2)}+\text{etc.}\right)$$

étant le développement en série ordonnée par rapport aux puissances de $\frac{1}{f}$, du radical

$$\frac{1}{\sqrt{f^2-2fr\,[\cos\nu\,\cos\theta+\sin\nu\,\sin\theta\,\cos(\alpha t+\varepsilon+\varpi-\psi)]+r^2}}$$

αt étant le mouvement de rotation de la Terre. On a généralement

$$\nu=\left\{\frac{d\left[(1-\nu)\left(\frac{dP^{(1)}}{d\nu}\right)\right]}{d\nu}\right\}+\frac{\left(\frac{ddP^{(1)}}{d\nu}\right)}{2\nu}+\ldots+1\cdot P^{(1)}$$

Si l'on n'a égard qu'aux variations croissantes avec une grande lenteur par rapport au mouvement de rotation de la Terre, on aura

$$P^{(1)}=\frac{9r}{2}\cdot\left(\cos^2\nu-\frac{1}{3}\right)\cdot\left(\mu^2-\frac{1}{3}\right)$$

On peut négliger les termes dépendans de $\frac{1}{f^3}$, $\frac{1}{f^4}$, etc., vu la petitesse de ces fractions. L'action de l'astre L ajoutera donc au second membre de l'équation (1) du n° 2, cette valeur de $P^{(1)}$ multipliée par $\frac{1}{f^3}$, ce qui revient à diminuer dans cette équation, le facteur $\alpha\varphi$, de la quantité

$$\frac{9L}{2f^3}\cdot\left(\cos^2\nu-\frac{1}{3}\right)$$

L'analyse précédente subsistera donc toujours, et si la mer recouvrait entièrement le sphéroïde terrestre, la Terre aurait toujours pour axes principaux, ceux du sphéroïde terrestre dans lequel les densités des couches seraient diminuées de la densité de la mer. On doit observer ici que la quantité

$$\frac{9L}{2f^2}\left(\cos^2\nu - \frac{1}{3}\right),$$

n'est qu'une fraction extrêmement petite de la valeur de α.

Lorsque la mer ne recouvre point entièrement le sphéroïde, on peut toujours, par le chapitre précédent, déterminer la profondeur $\alpha y'$ de la mer en équilibre, par une approximation ordonnée suivant les puissances de $\frac{1}{(\rho)}$, (ρ) étant la moyenne densité de la Terre, celle de la mer étant prise pour l'unité. La valeur de $\int \bar{x}\bar{y}.dm$, devient relativement à la mer, $\alpha\int y'.d\mu_1.d\varpi_1.\mu.\sqrt{1-\mu^2}.\cos\varpi$. En substituant pour y' l'expression donnée par le chapitre précédent, et pour μ et ϖ leurs valeurs en μ_1 et ϖ_1, l'intégrale précédente étendue à toutes les valeurs de μ_1 et de ϖ, comprises dans les limites de la mer, donnera la valeur de $\int \bar{x}\bar{y}.dm$, relative à ce fluide, par une série ordonnée suivant les puissances de $\frac{1}{(\rho)}$, le premier terme de cette série, ayant pour facteur l'unité, le second terme ayant pour facteur $\frac{1}{(\rho)}$, et ainsi de suite. En ajoutant cette valeur à celle de $\int \bar{x}\bar{y}.dm$, relative au sphéroïde terrestre, et qui a pour facteur (ρ) et égalant leur somme à zéro, on aura une équation dont le premier membre sera une série ordonnée par rapport aux puissances descendantes de (ρ), le second membre étant zéro. Les équations

$$\int \bar{x}\bar{z}.dm = 0,\quad \int \bar{y}'\bar{z}\,dm = 0,\quad \int \bar{x}.dm = 0,\quad \int \bar{z}\,dm = 0,\quad \int \bar{y}.dm = 0,$$

donneront des équations semblables, et l'on en conclura par les moyens connus de l'Algèbre, les valeurs indéterminées A, Π, ε, $Q^{(0)}$, $Q^{(1)}$, $Q^{(2)}$, en séries ordonnées comme y', par rapport aux puissances descendantes de (ρ), ce qui déterminera l'axe principal de rotation. Mais il suffit ici d'en faire voir la possibilité.

CHAPITRE IV.

De la chaleur de la Terre, et de la diminution du jour par son refroidissement.

9 Soit V la chaleur d'un point quelconque d'une masse homog. déterminé par les coordonnées orthogonales x, y, z, on a l'équatio générale

$$\left(\frac{ddV}{dx^2}\right)+\left(\frac{ddV}{dy^2}\right)+\left(\frac{ddV}{dz^2}\right)=k.\left(\frac{dV}{dt}\right), \quad (1)$$

dt est l'élément du temps, et k est une constante dépendante des propriétés de la substance, relatives à la chaleur Lorsque la masse est parvenue à son état final de température, $\left(\frac{dV}{dt}\right)$ est nul, et alors l'équation précédente devient celle que j'ai trouvée, relativement a l'attraction des sphéroides, V exprimant dans ce cas, la somme des molécules du corps attirant, divisées respectivement par leurs distances au point attiré On peut donc déterminer par l'analyse exposée dans le troisième livre de la Mécanique céleste, l'état final de la température d'une sphère échauffée d'une manière quelconque, à l'extérieur Ce qui complète l'analogie de la théorie de la chaleur avec celle de l'attraction des sphéroides, est qu'il existe à la surface, des équations de la même nature A la surface d'une sphère dont r est le rayon, on a

$$-\left(\frac{dV}{dr}\right)=fV-fl, \quad (2)$$

f étant une constante, et l étant une fonction dépendante de l' échauffante des causes extérieures Cette équation répond à l'éq à la surface des sphéroides attirans, que l'on trouve dans le n° troisième livre cité

M. Fourier a donné le premier les équations fondamentales (1) et dans l'excellente pièce qui a remporté le prix proposé par l'Institu

la théorie de la chaleur ; j'en donnerai la démonstration, dans un autre livre. J'observerai ici que les quantités f et k, peuvent n'être pas rigoureusement constantes, et varier avec la température V, mais on peut sans erreur sensible, les supposer constantes, tant que l'on ne considère que de petites variations de température.

J'ai transformé l'équation (1), en coordonnées relatives à la distance r d'une molécule du globe à son centre ; à la longitude ϖ de cette molécule, et au sinus μ de sa latitude. Elle devient alors

$$kr^2.\left(\frac{dV}{dt}\right)=r\left(\frac{d^2\,(rV)}{dr^2}\right)+\left(\frac{\frac{ddV}{d\varpi^2}}{1-\mu^2}\right)+\left[\frac{d(1-\mu^2)\left(\frac{dV}{d\mu}\right)}{d\mu}\right]\ldots(3)$$

En supposant ensuite V exprimé par une suite de termes de la forme $c^{-nt}Y^{(i)}.q^{(i)}$, c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité, et $Y^{(i)}$ étant une fonction rationnelle et entière de l'ordre i, en μ, $\sqrt{1-\mu^2}.\sin\varpi$, et $\sqrt{1-\mu^2}.\cos\varpi$, genre de fonctions dont j'ai fait un grand usage dans la théorie des attractions des sphéroïdes, et qui sont telles que l'on a

$$0=\frac{\left(\frac{ddY^{(i)}}{d\varpi^2}\right)}{1-\mu^2}+\left[\frac{d(1-\mu\mu)\left(\frac{dY^{(i)}}{d\mu}\right)}{d\mu}\right]+i.\overline{i+1}.Y^{(i)};$$

on aura

$$0=r.\frac{d^2\,rq^{(i)}}{dr^2}+knr^2.q^{(i)}-i.\overline{i+1}\,q^{(i)}.$$

Pour intégrer cette équation, soit

$$r\sqrt{nk}=z,\quad rq^{(i)}=q';$$

elle devient

$$0=\frac{ddq'}{dz^2}+q'-\frac{i\,\overline{i+1}\,q'}{z^2}$$

Faisons, en observant qu'ici la caractéristique Σ embrasse tous les termes depuis s nul jusqu'à l'infini,

$$q'=\frac{A}{\sqrt{nk}}.\Sigma.\left[\frac{F^{(i)}}{z^{2i}}.\sin(z+\theta)+\frac{F'^{(i)}}{z^{2i+1}}.\cos(z+\theta)\right];$$

A et θ étant deux constantes arbitraires. En substituant cet dans l'équation différentielle précédente, et comparant s les termes multiplés par $\frac{\sin(z+\theta)}{z^{2s}}$, et ceux qui sont mul $\frac{\cos(z+\theta)}{z^{2s+1}}$, on formera les deux équations

$$2.(2s-1).F'^{(s-1)} = (i-2s+2)\ (i+2s-1).F^{(s-}$$

$$4s.F^{(s)} = -(i-2s+1).(i+2s).F'^{(s-1)},$$

ce qui donne

$$F^{(s)} = -\frac{(i-2s+1)\ (i-2s+2)\ (i+2s-1)\ (i+2s)}{4\ 2s\ (2s-1)}.F^{(s-1)},$$

d'où l'on tire en intégrant et faisant comme on le peut, $F^{(0)} = 1$;

$$F^{(s)} = \pm\frac{(i-2s+1)\ (i-2s+2)\ \ .\ \ ..\ \ (i+2s)}{2^{2s}\ 1.2\ 3\ \ 2s},$$

le signe $+$ a lieu si s est pair, et le signe $-$, s'il est impair L'expression précédente de $F'^{(s-1)}$ donne

$$F'^{(s)} = \frac{(i-2s)\ (i+2s+1)}{2\ (2s+1)}.F^{(s)}.$$

On aura ainsi

$$q^{(i)} = A.\Sigma.\left[\frac{F^{(s)}}{z^{2s+1}}.\sin(z+\theta) + \frac{F'^{(s)}}{z^{2s+2}}.\cos(z+\theta)\right].$$

i étant ici un nombre entier positif, cette valeur de $q^{(i)}$ n'est composée que d'un nombre fini de termes Pour en exclure, comme on doit le faire, ceux qui deviennent infinis lorsque r est nul, $q^{(i)}$ étant toujours fini, même au centre, il faut faire θ nul, si i est pair, et $\theta = \frac{\pi}{2}$, si i est impair, π étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité.

L'équation (2) donne à la surface où nous supposerons que r devient a

$$-\frac{dq^{(i)}}{dr} = fq^{(i)}.$$

En désignant $a\sqrt{nk}$ par ε, et nommant Z et Z', les coefficie

TRAITÉ

DE

MÉCANIQUE CÉLESTE.

LIVRE XI.

MARS 1823.

IMPRIMERIE DE HUZARD-COURCIER

$A.\sin z$, et de $A.\cos z$, dans lesquels on change z en ε, on aura

$$0 = \sin\varepsilon.\left[fZ + \frac{\varepsilon}{a}.\left(\frac{dZ}{d\varepsilon}\right) - \frac{\varepsilon}{a}.Z'\right]\ldots(4),$$
$$+\cos\varepsilon.\left[fZ' + \frac{\varepsilon}{a}.\left(\frac{dZ'}{d\varepsilon}\right) + \frac{\varepsilon}{a}.Z\right].$$

Cette équation est transcendante : elle donne pour ε et par conséquent pour n, une infinité de valeurs auxquelles correspondent autant de fonctions de la forme $Y^{(i)}$, et qui sont déterminées par l'état initial de la chaleur du globe

L'équation précédente a pour une de ses racines, $\varepsilon = 0$, et la valeur correspondante de $q^{(i)}$ est βr^i, β étant une constante arbitraire.

Si l'on développe la partie de la fonction l, de l'équation (2), qui est indépendante du temps, dans une suite de la forme

$$Y'^{(0)} + Y'^{(1)} + Y'^{(2)} + \text{etc.};$$

$Y'^{(i)}$ étant assujetti à la même équation aux différences partielles que $Y^{(i)}$, l'équation (2) donnera en comparant les fonctions semblables,

$$-i\beta.a^{i-1}.Y^{(i)} = f\beta.a^i Y^{(i)} - fY'^{(i)},$$

ce qui donne

$$Y^{(i)} = Y'^{(i)};$$

$$\beta = \frac{1}{a^i\left(1 + \frac{i}{af}\right)};$$

ainsi la partie de la chaleur V d'un point du globe, indépendante du temps et qui finit par être sa température finale, est

$$Y'^{(0)} + \frac{1}{1 + \frac{1}{af}}.\frac{r}{a}.Y'^{(1)} + \frac{1}{1 + \frac{2}{af}}.\frac{r^2}{a^2}.Y'^{(2)} + \text{etc}$$

On peut observer ici que cette partie de V, varie très lentement pour la Terre, près de la surface, à cause de la grandeur du rayon a. Sa variation est insensible dans les mines les plus profondes; ainsi l'accroissement observé dans la chaleur des mines, à mesure que l'on y descend,

n'en dépend point, et paraît indiquer que le globe terrestre n'est point encore parvenu à son état final de température.

On représente assez bien la température moyenne des climats, en la faisant proportionnelle au produit de vingt-sept degrés centésimaux, par le carré du cosinus de la latitude. En supposant donc que la valeur de $Y^{(2)}$ relative à la chaleur initiale de la Terre, a déjà disparu, en sorte qu'il n'y ait de sensible maintenant, que la fonction de ce genre, relative à la chaleur solaire, on aura

$$Y'^{(2)} = 27^\circ . \left(\tfrac{1}{3} - \mu^2\right)$$

La grandeur du rayon terrestre réduit à très peu près l'équation (4) à celle-ci,

$$0 = Z . \sin \varepsilon + Z' . \cos \varepsilon.$$

En y supposant successivement, $i = 0$, $i = 1$, $i = 2$, etc, on verra facilement que la plus petite valeur de ε, autre que $\varepsilon = 0$, est π dans le cas de i nul, π étant le rapport de la circonférence au diamètre; elle est comprise entre π et $\frac{3}{2}\pi$, dans le cas de $i = 1$, entre $\frac{3}{2}\pi$ et 2π, lorsque $i = 2$, entre 2π et $\frac{5}{2}\pi$, lorsque $i = 3$, et ainsi du reste. Pour une même valeur de i, les exponentielles c^{-nt} disparaîtront par l'accroissement du temps, les unes après les autres, l'exponentielle correspondante à la plus petite valeur de n et de ε, disparaissant la dernière. Pareillement, tous les termes correspondans à ces plus petites valeurs, disparaîtront dans l'ordre de grandeur de i, en sorte qu'avant l'établissement de la température finale, il ne restera de sensible, que le terme

$$c^{-nt} Y^{(0)} . q^{(0)}$$

Je supposerai ici, la Terre parvenue à cet état ε est, comme on l'a vu, égal à π, mais l'équation (4) donne plus exactement,

$$\varepsilon = \pi . \left(1 - \frac{1}{af}\right);$$

d'où l'on tire

$$n = \frac{\pi^2 . \left(1 - \frac{1}{af}\right)^2}{a^2 k},$$

et

$$V = \frac{A}{r} . c^{-nt} . \sin \frac{r}{a} . \pi . \left(1 - \frac{1}{af}\right)$$

Cette équation donne à la surface, où $r=a$, la partie de la chaleur, relative à l'exponentielle c^{-nt}, égale à

$$\frac{A\ \pi}{a^2 f}\, c^{-nt}.$$

L'accroissement de la chaleur, à la profondeur z' au-dessous de la surface, est, par le théorème de Taylor, $-z'\left(\frac{dV}{dr}\right)$, et en vertu de l'équation (2), ce terme devient $fz'.V$, en ne considérant dans la valeur de V à la surface, que la partie de la chaleur, qui est indépendante de l'action des causes échauffantes à l'extérieur Il est remarquable que cet accroissement $fz'.V$ de la chaleur, soit indépendant du rayon du globe, et de la manière dont il est échauffé intérieurement, et qu'il ne dépende que de la chaleur des couches voisines de la surface, et de la manière dont elles perdent leur chaleur. Dans le cas présent, si l'on nomme h la valeur de V, à l'origine du temps t, à la surface; on aura

$$\frac{A\pi}{a^2 f}=h,$$

et par conséquent

$$V=\frac{ha^2 f}{\pi\,.\,r}.\,c^{-\frac{\pi^2 t}{a^2 k}\left(1-\frac{1}{af}\right)^2}.\ \sin\frac{r}{a}.\pi.\left(1-\frac{1}{af}\right).$$

Au centre, où r est nul, cette expression donne à fort peu près

$$V=af.h.c^{-\frac{\pi^2 t}{a^2 k}\cdot\left(1-\frac{1}{af}\right)^2};$$

la température est donc à ce point, incomparablement plus grande qu'à la surface L'accroissement de température, à une petite profondeur z', comptée de la surface, est

$$fz'\,h.c^{-\frac{\pi^2 t}{a^2 k}\cdot\left(1-\frac{1}{af}\right)^2}.$$

J'observerai ici que l'analyse par laquelle je viens d'intégrer l'équation (3), s'applique aux équations générales du mouvement des fluides; et que c'est ainsi que j'ai déterminé dans le quatrième livre, les oscillations d'un fluide qui recouvre une sphère immobile, et qui est attiré par un astre en mouvement.

Les valeurs de $Y^{(0)}$, $Y^{(1)}$, $Y^{(\ )}$, etc sont déterminées par l'état initial de la chaleur de la sphère Je vais donner pour cet objet, une méthode simple et qui peut s'étendre à beaucoup d'autres cas

Je suppose que l'état initial de la chaleur soit exprimé par la fonction

$$U^{(0)} + U^{(1)} + U^{(2)} \ldots + U^{(i)} + \text{etc},$$

$U^{(i)}$ étant une fonction rationnelle et entière de μ, $\sqrt{1-\mu^2}.\sin\varpi$, et $\sqrt{1-\mu^2}.\cos\varpi$, assujettie à la même équation aux différences partielles que $Y^{(i)}$, c'est-à-dire telle que l'on ait

$$0 = \left[\frac{d\,(1-\mu^2)\left(\frac{dU^{(i)}}{d\mu}\right)}{d\mu}\right] + \frac{\left(\frac{ddU^{(i)}}{d\varpi^2}\right)}{1-\mu^2} + i.\overline{i+1}.U^{(i)}.$$

les coefficiens arbitraires de $U^{(i)}$, étant ici, des fonctions de r Soit $\varphi(r)$ un de ces coefficiens, et $r\varphi(r) = q'$, on aura par ce qui précède

$$0 = \frac{d^2 q'}{dr^2} + kn^2 q' - \frac{i\,\overline{i+1}\,q'}{r^2}$$

En supposant t nul dans l'expression de V, il est facile de voir que l'on aura

$$r.\varphi(r) = A^{(0)}.q'^{(0)} + A^{(1)}.q'^{(1)} + A^{(2)}.q'^{(2)} + \text{etc},$$

$q'^{(0)}$, $q'^{(1)}$, $q'^{(2)}$, etc, étant les valeurs de q' correspondantes aux diverses racines de l'équation (4), $A^{(0)}$, $A^{(1)}$, etc, sont les arbitraires qui multiplient ces valeurs, et qu'il s'agit de déterminer Pour cela, on multipliera l'équation précédente par $dr.q'^{(0)}$, et l'on prendra l'intégrale depuis r nul jusqu'à $r = a$, ce qui donne

$$\int dr\; q'^{(0)} r\varphi(r) = A^{(0)}.\int q'^{(0)2} dr + A^{(1)}.\int q'^{(0)} q'^{(1)} dr + \text{etc}.$$

Maintenant on a

$$\int q^{(0)} q'^{(1)} dr = 0$$

Pour le faire voir, nous observerons que l'on a, $q'^{(0)}$ et $q'^{(1)}$ étant nuls avec r,

$$\int\left(\frac{q'^{(0)}\; ddq'^{(1)}}{dr} - \frac{q'^{(1)}\; ddq'^{(0)}}{dr}\right) = \frac{q'^{(0)}\; dq'^{(1)}}{dr} - \frac{q'^{(1)}\; dq'^{(0)}}{dr}.$$

TRAITÉ

DE

MÉCANIQUE CÉLESTE,

PAR M. LE MARQUIS DE LAPLACE,

Pair de France, Grand-Officier de la Légion-d'Honneur, l'un des quarante de l'Académie française, de l'Académie des Sciences, Membre du Bureau des Longitudes de France, des Sociétés royales de Londres et de Gottingue, des Académies des Sciences de Russie, de Danemarck, de Suède, de Prusse, des Pays-Bas, d'Italie, de Boston, etc

TOME CINQUIÈME.

PARIS,

BACHELIER, LIBRAIRE, SUCCESSEUR DE Mme Ve COURCIER,
QUAI DES AUGUSTINS.

1823.

Le premier membre de cette équation devient, en y substituant pour $\frac{ddq'^{(0)}}{dr}$, et $\frac{ddq'^{(1)}}{dr}$, leurs valeurs qui résultent de l'équation différentielle en q',

$$\int q'^{(0)} q'^{(1)} . kdr . (n^{(0)2} - n^{(1)2});$$

$n^{(0)}$ et $n^{(1)}$ étant les valeurs de n relatives aux racines de l'équation (4) correspondantes à $q'^{(0)}$ et $q'^{(1)}$ De plus, à la surface, on a

$$\frac{q'^{(0)} . dq'^{(1)}}{dr} - \frac{q'^{(1)} dq'^{(0)}}{dr} = 0;$$

car l'équation à la surface

$$-\frac{dq^{(1)}}{dr} = f q^{(1)}$$

donne les deux suivantes

$$\frac{dq'^{(0)}}{dr} = \left(\frac{1}{r} - f\right) . q'^{(0)}, \quad \frac{dq'^{(1)}}{dr} = \left(\frac{1}{r} - f\right) . q'^{(1)};$$

on a donc

$$0 = \int q'^{(0)} q'^{(1)} . dr . (kn^{(0)2} - kn^{(1)2}).$$

De là, il est aisé de voir que l'on a

$$A^{(0)} . \int q'^{(0)} q'^{(0)} dr = \int dr . rq'^{(0)} . \varphi(r),$$

ce qui donne

$$A^{(0)} = \frac{\int dr . rq'^{(0)} \varphi(r)}{\int q'^{(0)2} dr},$$

les intégrales étant prises depuis $r = 0$ jusqu'à $r = a$. En changeant $q'^{(0)}$ en $q'^{(1)}$, $q'^{(2)}$, etc., on aura les valeurs de $A^{(1)}$, $A^{(2)}$, etc.; d'où l'on tire le théorème suivant :

Si l'on forme la quantité

$$e^{-n^{(s)} . t} . \frac{q'^{(s)}}{r} . \frac{\int q'^{(s)} dr \, rU^{(s)}}{\int (q'^{(s)})^2 . dr},$$

$n^{(s)}$ n'étant point nul, et les intégrales étant prises depuis r nul jusqu'à r égal au rayon a de la sphère, si l'on désigne ensuite par $Q^{(s)}$ la somme de toutes les quantités correspondantes à $s = 0$, $s = 1$, etc, jusqu'à s infini; l'expression de la chaleur V après un temps quelconque t, sera

la somme des valeurs de $Q^{(i)}$ correspondantes à $i=0$, $i=1$, etc., jusqu'à i infini.

Dans le cas où l'état initial de la chaleur, ne dépend que de r, $U^{(i)}$ est nul, lorsque i est égal à l'unité, ou plus grand, l'expression de la chaleur se réduit alors à $Q^{(0)}$, et l'on a le résultat intéressant que M. Fourier a donné le premier, pour ce cas.

J'ai supposé l'état initial de la chaleur, développé sous la forme $U^{(0)}+U^{(1)}+$ etc. ce développement est aussi naturel à admettre que tout autre. Il est facile d'ailleurs par le procédé du n° 16 du troisième Livre, de donner cette forme à toute fonction rationnelle et entière des coordonnées orthogonales. On pourrait aisément par l'analyse de ce troisième Livre, obtenir cette forme, au moyen d'intégrales définies, mais comme cela ne conduit à aucun résultat utile, nous nous abstiendrons de nous en occuper.

On aura ainsi égard à la partie de l de l'équation (2), qui est indépendante des fonctions périodiques du temps, et que nous avons exprimée par $Y'^{(0)}+Y'^{(1)}+$ etc. On a vu qu'il en résulte dans la température finale, la chaleur

$$Y'^{(0)}+\frac{r}{a}\cdot\frac{Y'^{(0)}}{1+\frac{1}{af}}+\frac{r^2}{a^2}\cdot\frac{Y'^{(2)}}{1+\frac{2}{af}}+\text{etc}.$$

Il est facile d'en conclure par l'analyse précédente, que si l'on forme la quantité

$$\frac{c^{-n^{(s)}t}\cdot\frac{q'^{(s)}}{r}\cdot\int q'^{(s)}dr\left[rU^{(i)}-\frac{r^{i+1}}{a^{(i)}}\frac{Y'^{(i)}}{\left(1+\frac{i}{af}\right)}\right]}{\int(q'^{(s)})^2dr},$$

$n^{(s)}$ n'étant point nul, et les intégrales étant prises depuis r nul jusqu'à r égal au rayon a de la sphère, si l'on désigne ensuite par $Q^{(i)}$ la somme de toutes les quantités correspondantes à $s=0$, $s=1$, jusqu'à $s=$ infini, l'expression de la chaleur V après un temps quelconque, sera la somme de toutes les valeurs de

$$Q^{(i)}+\frac{r^{(i)}}{a^{(i)}}\cdot\frac{Y'^{(i)}}{1+\frac{i}{af}},$$

correspondantes à $i=0$, $i=1$, etc., jusqu'à i infini.

J'ose espérer que les géomètres verront avec quelque intérêt, cette nouvelle application de l'analyse par laquelle j'ai déterminé la figure des corps célestes et la loi de la pesanteur à leur surface

10 Je vais maintenant considérer la diminution de la durée du jour, due au refroidissement de la Terre pour cela, je supposerai que la densité des couches terrestres, croît de la surface au centre, et que cependant leurs propriétés pour contenir et pour émettre la chaleur, sont les mêmes que si elles étaient homogènes, en sorte que l'expression précédente de V leur soit applicable Je supposerai de plus, ces couches fluides, ou du moins assez molles, pour qu'elles prennent sans résistance, la figure que la compression tend à leur donner La masse de la couche dont ρ est la densité, dont r est le rayon et dr l'épaisseur à l'origine du temps t, est proportionnelle à $\rho r^2 dr$ Après le temps t, elle sera proportionnelle à

$$(\rho + \delta\rho) . (r + \delta r)^2 . d(r + \delta r),$$

la caractéristique δ servant à exprimer les variations relatives au temps En égalant ces deux expressions de la masse de la couche, et négligeant le carré de δ, on aura

$$d(r^2 \delta r) + \frac{\delta\rho}{\rho} . r^2 dr = 0$$

Pour avoir la valeur de $\delta\rho$, je supposerai que pour un degré centigrade de diminution dans la température, pris pour unité de température, la densité ρ de la couche augmente de $\iota\rho$, ι étant une très petite fraction que je supposerai la même à toutes les températures et pour toutes les couches terrestres. En exprimant par δV, la diminution de la chaleur de la couche après le temps t, on aura

$$\delta\rho = \iota\rho . \delta V,$$

on aura donc

$$d.(r^2 \delta r) + \iota \delta V . r^2 dr = 0,$$

et en intégrant

$$r^2 \delta r = - \iota . \int \delta V . r^2 dr$$

Maintenant, si l'on désigne par φ la vitesse angulaire de rotation de la Terre, à l'origine du temps, la somme des aires décrites par toutes ses

molécules, pendant une unité de temps, sera proportionnelle à $\varphi\int\rho r^4 dr$, sa variation sera donc proportionnelle à la variation

$$\delta\varphi\int\rho r^4 dr + \varphi.\int\delta\rho\ r^4 dr + 4\varphi\int\rho r^3\delta r.dr + \varphi\int\rho r^4 d.\delta r$$

En substituant pour δr et $d\delta r$, leurs valeurs tirées des équations précédentes, cette variation devient

$$\delta\varphi.\int\rho r^4 dr - 2\iota\varphi.\int(\rho r dr.\int\delta V.r^2 dr)$$

En égalant à zéro cette fonction, en vertu du principe de l'égalité des aires; on aura

$$\frac{\delta\varphi}{\varphi} = \frac{2\iota\int(\rho r dr\int\delta V\ r^2 d\iota)}{\int\rho r^4 dr} \ldots\ldots (5)$$

J'adopterai pour ρ, l'expression la plus simple d'une densité variable, celle d'une densité croissante en progression arithmétique, ce qui donne

$$\rho = (\rho).\left(1 + e - \frac{er}{a}\right),$$

e étant une constante, et (ρ) étant la densité à la surface. On a par ce qui précède,

$$\delta V = \frac{a^2 fh}{\pi\iota}.\left[1 - c^{-\frac{\pi^2 t}{a^2 h}.\left(1-\frac{1}{af}\right)^2}\right].\sin\pi.\frac{r}{a}.\left(1 - \frac{1}{af}\right),$$

ou à fort peu près

$$\delta V = \frac{fh\pi}{kr}.t.\sin\frac{r}{a}\pi.\left(1 - \frac{1}{af}\right)$$

On a ensuite, en intégrant depuis r nul jusqu'à $r = a$,

$$\begin{aligned} 2\int(\rho r dr\int\delta V.r^2 dr = {} & (1+e)(\rho)a^2\int\delta V.r^2 dr \\ & - (1+e)(\rho)\int\delta V.r^4 dr \\ & - \frac{2a^2}{3}e(\rho).\int\delta V r^2 dr \\ & + \tfrac{2}{3}\frac{c}{a}.(\rho).\int\delta V.r^5 dr \end{aligned}$$

On a généralement à fort peu près,

$$\int\frac{\iota' dr}{a^{s+1}}.\sin\frac{r}{a}\pi\left(1 - \frac{1}{af}\right) = \frac{1}{\pi}\left(1 - \frac{s\overline{s-1}}{\pi^2} + \frac{s\overline{s-1}\,\overline{s-2}\,\overline{s-3}}{\pi^4} - \text{etc.}\right),$$

cela posé, la formule (5) devient

$$\frac{\delta\varphi}{\varphi} = \frac{10\ ihf\ t}{ak\pi^2} \cdot \frac{\left[3 - e\left(1 - \frac{8}{\pi^2}\right)\right]}{1 + \frac{1}{6}e},$$

ainsi la valeur de $\frac{\delta\varphi}{\varphi}$ est plus petite que dans le cas de e nul, ou d'une densité constante

Essayons présentement de déterminer les constantes de cette valeur En prenant un milieu entre les résultats des observations thermométriques, faites dans un grand nombre de mines profondes, je trouve que la température augmente d'un degré centésimal, pour 32 mètres de profondeur, ce qui donne en faisant t nul à l'époque actuelle,

$$32^{mt} \cdot fh = 1^\circ$$

J'ai déterminé la valeur de k, au moyen de la diminution de la variation annuelle de la chaleur, à mesure que l'on pénètre dans la première couche terrestre, phénomène dont M Fourier a établi les lois, et dont on a ainsi l'expression la plus simple Pour cela, je représente la variation de l'action de la chaleur solaire à la surface par $\mathcal{E} \cdot \sin mt$, mt étant la longitude moyenne du Soleil En nommant donc z', la distance d'un point intérieur de la Terre, à sa surface, l'équation (1) donnera, en observant que z' est très petit par rapport au rayon a,

$$\left(\frac{ddV'}{dz'^2}\right) = k\left(\frac{dV'}{dt}\right),$$

V' étant la partie de la chaleur, due au terme précédent de l'action solaire L'équation (2) à la surface donne

$$\left(\frac{dV'}{dz'}\right) = fV' - f\mathcal{E} \cdot \sin mt$$

On satisfait à ces deux équations, par les deux suivantes

$$V' = \frac{f\mathcal{E} \cdot \sin\theta}{\sqrt{\frac{km}{2}}}\ c^{-z'\sqrt{\frac{km}{2}}} \cdot \sin\left(m - z' \cdot \sqrt{\frac{km}{2}} - \theta\right),$$

$$\tang\theta = \frac{\sqrt{\frac{km}{2}}}{f + \sqrt{\frac{km}{2}}}.$$

Pour avoir la valeur de km, j'ai fait usage des expériences de M. de Saussure, que ce savant a consignées dans le n° 1422 de son Voyage dans les Alpes. Il résulte de ces expériences qu'à la profondeur de $9^{met},6$ le coefficient de la variation annuelle est réduit au douzième environ, de sa valeur à la surface, ce qui donne

$$c^{-9^{met},6\sqrt{\frac{km}{2}}} = \frac{1}{12}$$

et

$$km = 2\left(\frac{\text{logarithme hyperbolique de } 12}{9^{met},6}\right)^2$$

La valeur précédente de $\frac{\delta\varphi}{\varphi}$ devient ainsi

$$\frac{\delta\varphi}{\varphi} = \frac{10\,\iota\,mt}{32^{met}a\,\pi^2}\cdot\frac{(9^{met},6)^2}{2\,(\text{log. hyp. } 12)^2}\cdot\frac{\left[3-e\left(1-\frac{8}{\pi^2}\right)\right]}{1+\frac{1}{6}e}$$

Pour une année, mt est à fort peu près égal à 2π. Dans la supposition de la Terre homogène, où e est nul, en évaluant a en mètres, et en supposant, ι égale à 0,00003, on aura après un intervalle de mille ans,

$$\frac{\delta\varphi}{\varphi} = \frac{1}{474},$$

ce qui donne en secondes centésimales, la variation de la durée du jour en deux mille ans égale à $\frac{1''}{237}$.

On a vu précédemment que pour satisfaire à l'ensemble des phénomènes, e ne doit pas être supposé nul, mais qu'il est à fort peu près égal à 2,349, alors, la variation de la durée du jour est moindre que la précédente, et égale à $\frac{1''}{387}$.

Je reprends l'équation

$$32^{met}\,fh = 1^\circ$$

h exprime la température que le terme dépendant de la chaleur propre de la Terre ajoute à la température de sa surface. Cet accroissement de température est donc

$$h = \frac{1^\circ}{32^{met}f}$$

Pour déterminer f, j'observe que le *maximum* de la chaleur annuelle n'a lieu qu'après le solstice d'été A l'époque de ce *maximum*, on a

$$\sin(mt - \theta) = 1,$$

ce qui donne

$$mt = \frac{\pi}{2} + \theta$$

L'ensemble des observations thermométriques faites chaque jour à Paris, pendant quinze années consécutives, donne à fort peu près

$$\tang\theta = 0{,}6$$

L'équation

$$\tang\theta = \frac{\sqrt{\frac{km}{2}}}{f + \sqrt{\frac{km}{2}}}$$

donnera donc

$$f = \frac{2}{3}\sqrt{\frac{km}{2}}$$

Substituant pour $\sqrt{\frac{km}{2}}$, sa valeur, $\frac{\text{log. hyp. } 12}{9^{\text{mèt}},6}$, on aura pour f une valeur qui donne

$$h = \frac{1^{\circ}}{5{,}8}$$

LIVRE XII.

DE L'ATTRACTION ET DE LA RÉPULSION DES SPHÈRES, ET DES LOIS DE L'ÉQUILIBRE ET DU MOUVEMENT DES FLUIDES ÉLASTIQUES

CHAPITRE Ier.

Notice historique des Recherches des Géomètres sur cet objet.

NEWTON considéra le premier l'attraction des corps sphériques. Il démontra dans son ouvrage des Principes mathematiques de la Philosophie naturelle, publié en 1687, ces deux propriétés remarquables de la loi d'attraction réciproque au carré de la distance, l'une, que la sphère attire un point situé au-dehors, comme si toute sa masse était réunie à son centre; l'autre, qu'un point situé au-dedans d'une couche sphérique, et même d'une couche elliptique dont la surface intérieure est semblable à la surface extérieure, et semblablement située, est également attiré de toutes parts, ou ne reçoit aucun mouvement, des attractions qu'il éprouve. Il paraît par une lettre de Newton à Halley, que ce fut en 1685 qu'il découvrit ces propriétés. Ses premières réflexions sur le système du monde remontent à l'année 1666. En étendant jusqu'à la Lune, la pesanteur terrestre, et en la supposant diminuée à cette distance, dans le rapport du carré du rayon de l'orbe lunaire, au carré du rayon de la Terre, il la compara avec la force centrifuge du mouvement de la Lune, mais trompé par une fausse mesure du degré terrestre, il trouva ces deux forces inégales, et il en conclut que d'autres forces devaient se joindre à la pesanteur, pour retenir la Lune dans son orbite.

En considérant la pesanteur, comme la résultante des attractions de toutes les molécules de la Terre, il pouvait soupçonner que la loi d'attraction réciproque au carré de la distance, quoique vraie à très peu près, à une distance aussi considérable que celle de la Lune, était modifiée à la petite distance des points de la surface de la Terre à son centre, et c'est ce qui a lieu, en effet, pour d'autres lois d'attraction Mais on ne voit pas que Newton ait fait cette réflexion; et ce n'est que vers 1685, qu'il s'occupa de la pesanteur à la surface et dans l'intérieur de la Terre Il fit voir qu'au-dessus de la surface, elle suit la loi inverse du carré de la distance mais que, loin de suivre cette loi dans l'intérieur de la Terre, comme on le supposait, elle diminue à mesure que l'on approche du centre, où elle devient nulle

J'ai fait voir dans le second Livre, que parmi toutes les lois d'attraction décroissante à l'infini par la distance, la loi de la nature est la seule qui jouisse des deux propriétés que Newton lui a reconnues. Dans toute autre loi, l'attraction des sphères est modifiée par leurs dimensions Pour déterminer ces modifications, je suis parti des formules que j'ai données dans le livre cité, sur l'attraction des couches sphériques J'en ai déduit, sous une forme très simple, les expressions générales de l'attraction des sphères, sur des points placés au-dedans ou au-dehors, et les unes sur les autres La comparaison de ces expressions conduit à ce théorème qui donne l'attraction d'une sphère sur les points intérieurs, lorsqu'on a son attraction sur les points situés au-dehors, et réciproquement, quelle que soit la loi de l'attraction

« Si l'on imagine dans l'intérieur d'une sphère, une petite sphère qui » lui soit concentrique, l'attraction de la grande sphère, sur un point » placé à la surface de la petite, est à l'attraction de la petite sphère » sur un point placé à la surface de la grande, comme la grande surface » est à la petite surface Ainsi les actions de chacune des sphères sur » la surface entière de l'autre, sont égales »

Les mêmes expressions s'appliquent évidemment aux sphères dont les molécules se repoussent et sont contenues par des enveloppes Newton a supposé entre les molécules d'air, une force répulsive réciproque à leur distance Mais en appliquant à ce cas, mes formules, je trouve que la pression à l'intérieur et à la surface, suit une loi bien différente de la loi générale des fluides élastiques, suivant laquelle la pression, à températures égales, est proportionnelle à la densité. Aussi Newton n'admet-il

la répulsion qu'une molécule doit exercer ainsi sur les autres, que dans une très petite étendue, mais l'explication qu'il donne, de ce défaut de continuité, est bien peu satisfaisante Il faut sans doute admettre entre les molécules de l'air, une loi de répulsion, qui ne soit sensible qu'à des distances imperceptibles. La difficulté consiste à déduire de ce genre de forces, les lois générales que présentent les fluides élastiques. Je crois y être parvenu, en appliquant à cet objet, les formules dont je viens de parler

Je suppose que les molécules des gaz sont à une distance telle que leur attraction mutuelle soit insensible, ce qui me paraît être la propriété caractéristique de ces fluides, et même des vapeurs, de celles, du moins, qu'une légère compression ne réduit point en partie, à l'état liquide Je suppose ensuite que ces molécules retiennent par leur attraction, le calorique; et que leur répulsion mutuelle est due à la répulsion des molécules du calorique, répulsion évidemment indiquée par l'accroissement du ressort des gaz, quand leur température augmente. Je suppose enfin, que cette répulsion n'est sensible qu'à des distances imperceptibles. Je fais voir que dans ces suppositions, la pression dans l'intérieur et à la surface d'une sphère formée d'un pareil fluide, est égale au produit du carré du nombre de ses molécules contenues dans un espace donné, pris pour unité, par exemple, d'un litre, par le carré du calorique renfermé dans une quelconque de ces molécules, et par un facteur constant. Ce résultat étant indépendant du rayon de la sphère, il est facile d'en conclure qu'il a lieu, quelle que soit la figure de l'enveloppe qui contient le gaz.

J'imagine ensuite l'espace pris pour unité, à une température donnée et contenant un gaz à la même température. Il est clair qu'une molécule quelconque de ce gaz sera atteinte à chaque instant, par les rayons caloriques émanés des corps environnans Elle éteindra une partie de ces rayons, mais il faudra pour le maintien de la température, qu'elle remplace ces rayons éteints, par son rayonnement propre La molécule, dans tout autre espace à la même température, sera atteinte à chaque instant, par la même quantité de rayons caloriques elle en éteindra la même partie qu'elle remplacera par son rayonnement Cette quantité est donc une fonction de la température, indépendante de la nature des corps environnans, et l'extinction sera le produit de cette fonction, par une constante dépendante de la nature de la molécule ou du gaz J'ob-

serverai ici que la quantité de rayons caloriques émanés des corps environnans et qui forme la chaleur de l'espace, est, à cause de l'extrême vitesse que l'on doit supposer à ces rayons, une partie insensible de la chaleur contenue dans les corps, comme on l'a reconnu d'ailleurs, par les expériences faites pour condenser cette chaleur. Maintenant, j'observe que chaque molécule du gaz, étant supposée retenue par l'attraction, son calorique, le rayonnement de ce calorique ne peut être dû qu'à la répulsion du calorique des molécules qui l'environnent. Quelle que soit la manière dont cette répulsion détache des parcelles du calorique de la molécule, et la fait rayonner, il est visible que ce rayonnement sera en raison composée du calorique contenu dans les molécules environnantes, et du calorique propre à la molécule. D'ailleurs cette raison composée est, comme on le verra dans la suite, proportionnelle à la pression qu'éprouve ce dernier calorique, pression à laquelle il est naturel de supposer le rayonnement de la molécule, proportionnel (*). Le calorique contenu dans les molécules environnantes est proportionnel au produit du calorique de chacune d'elles, par leur nombre. Ainsi le rayonnement d'une molécule du gaz, est proportionnel au produit du nombre des molécules de ce gaz, contenues dans l'espace pris pour unité, par le carré de son calorique. En égalant ce rayonnement, à l'extinction qui, comme on vient de le voir, est le produit d'une constante, par la fonction de température, dont j'ai parlé, on voit que le nombre des molécules du gaz, multiplié par le carré du calorique d'une quelconque de ces molécules, est proportionnel à cette fonction. Maintenant, si dans l'expression donnée ci-dessus, de la pression du gaz, on substitue au produit du nombre des molécules, par le carré du calorique propre à chaque molécule, la fonction de la température, multipliée par un facteur constant; on aura cette pression,

(*) Dans un état d'immobilité parfaite des molécules du gaz, supposées sphériques, les molécules de leur calorique seraient pareillement immobiles. Mais cet état mathématiquement possible, me paraît aussi impossible physiquement, que l'équilibre d'une aiguille verticale appuyée sur sa pointe dans un fluide aussi mobile qu'un gaz, la plus légère agitation doit troubler l'équilibre des molécules et de leur calorique. Alors des parcelles du calorique de chaque molécule, ne doivent-elles pas s'en détacher à chaque instant? La figure des molécules peut encore avoir sur leur rayonnement, une grande influence.

proportionnelle au produit de cette fonction, par le nombre des molécules de gaz, renfermées dans l'espace pris pour unité

Cette proportionnalité donne les deux lois générales des gaz. On voit d'abord que la température restant la même, la pression est proportionnelle au nombre des molécules du gaz, et par conséquent, à sa densité, ce qui est la loi de Mariote. On voit ensuite, que la pression restant la même, ce nombre est réciproque à la fonction de température dont il s'agit, fonction qui, comme on l'a vu, est indépendante de la nature du gaz, d'où résulte la belle loi que MM Dalton et Gay-Lussac nous ont fait connaître, et suivant laquelle, sous la même pression, le même volume des divers gaz se dilate également par un accroissement égal de température

On peut se demander ici, ce que l'on doit entendre par le mot *température*. Si l'on imagine un espace vide dont l'enveloppe soit partout et constamment à la même température; tous les points de la surface intérieure de cette enveloppe, se renverront réciproquement des rayons caloriques qui rempliront l'espace vide, d'un fluide calorique très rare et mû suivant toutes les directions On prouve facilement que la densité de ce calorique est la même dans tous les points de l'espace. Cette densité croît avec la température de l'enveloppe : elle est la fonction de température, dont nous venons de parler. Il est naturel de la prendre pour la température elle-même, dont on aura ainsi une idée claire et simple Sous une pression constante, la densité d'un gaz, étant, comme on l'a vu, réciproque à cette fonction de la température; son volume est proportionnel à cette fonction, et par conséquent à la densité du calorique de l'espace; la température est alors représentée par ce volume, et ses variations sont représentées par les variations du volume d'un gaz soumis à une pression constante Le thermomètre d'air devient ainsi le vrai thermomètre qui doit servir de module aux autres, du moins dans les limites de pression et de densité, où ce fluide obéit très sensiblement aux lois générales des fluides élastiques

Un corps en équilibre de température dans un espace, et transporté dans un autre espace où la densité du calorique est la même, y conservera la même température Si le nouvel espace a une densité différente de calorique, la température du corps changera jusqu'à ce que le calorique qu'il rayonne soit égal au calorique qu'il absorbe. En général, la

température d'un corps est la densité du calorique de l'espace où cette égalité a lieu

Suivant les expériences de M Gay-Lussac, si l'on prend pour unité, le volume d'un gaz à zéro de température, ou à la température de la glace fondante, ce volume devient 1,375, à la température de 100°, ou à la température de l'eau bouillante sous la pression barométrique $0^m,76$ La densité du calorique de l'espace, à zéro de température, est donc représentée par $\frac{100^\circ}{0,375}$ ou par $266^\circ\frac{2}{3}$

Chaque molécule d'un corps est soumise à l'action de ces trois forces, 1° l'attraction des molécules environnantes, 2° l'attraction du calorique des mêmes molécules, plus leur attraction sur son calorique; 3° la répulsion de son calorique par le calorique de ces molécules Les deux premières forces tendent à rapprocher les molécules entre elles la troisième tend à les écarter Les trois états, *solide*, *liquide* et *gazeux*, dépendent de l'efficacité respective de ces forces Dans l'état solide, la première force est la plus grande l'influence de la figure des molécules est très considérable, et elles sont unies dans le sens de leur plus grande attraction L'accroissement du calorique diminue cette influence, en dilatant les corps, et lorsque cet accroissement devient tel que cette influence soit très petite, ou nulle; la seconde force prédomine, et le corps prend l'état liquide. Les molécules intérieures sont alors mobiles entre elles, mais l'attraction de chaque molécule par les molécules qui l'environnent et par leur calorique, retient leur ensemble dans le même espace, à l'exception des molécules de la surface, que le calorique enlève sous la forme de vapeurs, jusqu'à ce que la pression de ces vapeurs arrête cet effet Enfin, quand par un nouvel accroissement de calorique, la troisième force l'emporte sur les deux autres, toutes les molécules du liquide, à l'intérieur comme à la surface, s'écartent entre elles le liquide prend subitement un volume et une force expansive très considérables; et il se dissiperait en vapeurs, s'il n'était pas fortement contenu par les parois du vase ou du tube qui le renferme C'est à cet état de gaz très comprimé, que M Cagnard-Latour a réduit l'eau, l'alcool, l'éther, etc. Dans cet état, les deux premières forces sont encore sensibles, mais la densité du fluide ne satisfait point à la loi de Mariote On verra dans la suite, que pour y satisfaire, ainsi qu'à la loi de MM Dalton et Gay-Lussac, il est nécessaire que

le fluide soit réduit à l'état aériforme, dans lequel la troisième force devient la seule sensible (*). Dans cet état, la densité du gaz contenu dans un vase, est partout la même, excepté dans les points très voisins des parois, à une distance égale ou plus petite que le rayon de la sphère d'activité sensible des forces attractives et répulsives.

On doit faire ici une remarque importante. Les phénomènes de chaleur que présentent les passages des corps, de l'état solide à l'état liquide, et de l'état liquide à l'état de vapeurs, ont fait distinguer dans les molécules, deux espèces de chaleur, l'une libre, ou sensible au thermomètre; l'autre insensible au thermomètre, ou latente Une quantité considérable de calorique est absorbée dans ces passages et devient latente; mais elle reparaît dans le retour des vapeurs à l'état liquide, et de l'état liquide à l'état solide Le calorique absolu d'un corps est la somme de son calorique libre et de son calorique latent. C'est uniquement au calorique libre, ou qui exerce une action sur le thermomètre, qu'il faut attribuer les résultats dont j'ai parlé. On sait que la température des gaz augmente par leur compression, et l'on conçoit que cela doit être; car le rayonnement d'une molécule de gaz étant, comme on l'a vu, proportionnel au produit de la densité du gaz, par le carré du calorique libre de la molécule; ce rayonnement et par conséquent la température de l'espace dans lequel la molécule serait en équilibre de température, doit croître avec cette densité. Mais la vitesse observée du son, et les expériences sur le calorique abandonné par l'air sous diverses pressions en se refroidissant, indiquent un accroissement de calorique latent, par le seul effet de la compression. Il faut donc ajouter aux suppositions que nous avons faites, la considération de la chaleur latente. En modifiant ainsi les hypothèses, d'après l'expérience, on peut découvrir la loi générale des phénomènes, et la soumettre au calcul.

Dans le mélange de divers gaz qui n'exercent point d'action d'affinité

(*) Ne peut-on pas admettre avec vraisemblance, que le calorique des molécules aériennes exerce sur le calorique des molécules d'un corps réduit en parties très fines, une force répulsive d'autant plus grande, que ces molécules se rapprochent plus de la ténuité des molécules de l'air, ce qui doit contribuer à soulever ces parties et à les retenir pendant long-temps dans l'atmosphère? n'est-ce pas ainsi que les vapeurs vésiculaires qui forment les nuages, s'y maintiennent suspendues?

les uns sur les autres, leurs molécules finissent par être mêlées de manière que la plus petite portion du mélange renferme chacun de ces gaz, dans la même proportion que le mélange entier Chaque molécule de gaz, étant suspendue dans l'espace, par l'action répulsive du calorique des molécules environnantes sur son propre calorique, et cette action étant alors égale dans tous les sens, elle est dans un état stable d'équilibre Je donne l'expression analytique de la pression que le gaz composé exerce sur les parois de l'espace qui le contient, et celle du rayonnement de chaque molécule de gaz Il en résulte qu'à températures égales, la pression de ce mélange est comme pour un gaz simple, proportionnelle à sa densité Il en résulte encore que l'accroissement de son volume, par un accroissement de température, la pression restant la même, est égal à celui d'un gaz simple Enfin, la pression que le mélange exerce sur les parois, est à températures égales, la somme des pressions que chacun des gaz exercerait séparément, s'il existait seul dans le même espace On peut donc concevoir le mélange, comme un gaz simple dont chaque molécule serait un groupe infiniment petit de molécules des divers gaz, mêlées dans la même proportion que dans le mélange total Cette manière de considérer le mélange dans l'état d'équilibre, peut encore s'étendre à l'état de mouvement

En appliquant les considérations précédentes, au mouvement des gaz, je donne les équations différentielles de ce mouvement Elles diffèrent essentiellement des formules connues, en ce qu'elles contiennent les forces qui résultent du développement de la chaleur par l'accroissement de densité des diverses parties des gaz en mouvement Ces forces n'ont aucune influence sensible sur les mouvemens de l'air considéré en masse, tels que ses oscillations produites par les attractions du Soleil et de la Lune sur l'atmosphère, mais elles ont une influence considérable sur ses vibrations Dans le mélange de plusieurs gaz, les molécules d'un gaz ne sont pas assujetties aux mêmes forces, que les molécules d'un autre gaz, mais ces molécules s'entraînent mutuellement, comme si le gaz composé était formé d'une infinité de groupes dans lesquels les molécules des gaz seraient en même proportion que dans le mélange, et de plus, liées fixement entre elles Il arrive ici la même chose que pour un corps solide formé de substances magnétiques et non magnétiques l'adhérence mutuelle des molécules fait que les molécules non magnétiques sont entraînées par l'action d'un aimant, avec les molécules

magnétiques On a vu que dans le mélange des gaz, les molécules de chaque gaz tendent par la répulsion réciproque de leur calorique, à se répandre également dans toutes les parties de l'espace Cette tendance d'un ordre de forces, très supérieur à celui des forces qui font vibrer les molécules des gaz, les empêche de se séparer dans leurs mouvemens

L'application la plus importante que l'on ait faite, des équations du mouvement des fluides élastiques, est relative à la vitesse du son dans l'atmosphère. Newton est le premier qui s'en soit occupé, dans son ouvrage des Principes mathématiques de la Philosophie naturelle: sa théorie, quoique imparfaite, est un monument de son génie Il considère une ligne indéfinie de molécules aériennes, et en la supposant primitivement ébranlée dans une petite étendue, il détermine, dans une hypothèse particulière d'ébranlement, la manière dont cet ébranlement se propage, et le temps qu'il emploie à parvenir à une distance quelconque de son origine, ce qui lui donne la vitesse horizontale du son, ou l'espace qu'il parcourt dans une seconde sexagésimale, espace qu'il trouve égal à la racine carrée du produit du double de la hauteur dont la pesanteur fait tomber les corps, dans la première seconde, par la hauteur d'une colonne d'air, qui ferait équilibre à la colonne de mercure du baromètre, et qui aurait partout la même densité, qu'au bas de la colonne Le raisonnement par lequel Newton établit ce théorème, a paru généralement obscur aux géomètres Quelques-uns même l'ont trouvé inexact, parce qu'en l'appliquant à des ébranlemens primitifs, physiquement impossibles, ils sont parvenus à la même expression de la vitesse. Mais Lagrange a fait voir que cela tenait aux fonctions arbitraires introduites par l'intégration des équations aux différences partielles du mouvement de l'air, fonctions d'une telle nature, qu'il en résulte la même expression de la vitesse du son Ainsi, l'objection faite au raisonnement de Newton, loin d'en montrer l'inexactitude, en prouvait la généralité Lagrange est le premier qui ait déduit cette expression, des équations analytiques aux différences partielles de ce mouvement. Euler et lui ont étendu leurs recherches au cas où l'air a trois dimensions, et ils ont trouvé que la vitesse est la même que dans le cas d'une seule dimension J'ai reconnu que le cas où l'air n'aurait que deux dimensions, donne encore la même vitesse, quoique dans ce cas, l'intégration des équations différentielles soit impossible Mais la comparaison de la formule Newtonienne de la vitesse du son,

avec les observations, en a prouvé l'inexactitude La différence qui s'élève au sixième de la vitesse totale, indique évidemment que deux forces jusqu'alors ignorées, influent sur la vitesse du son Newton et les géomètres qui l'ont suivi, attribuaient cette différence aux molécules étrangères que l'air tient en suspension Mais, il est facile de voir que ces molécules elles-mêmes entrent en vibration, comme si elles faisaient partie de l'atmosphère. Le progrès de la Physique et de la Chimie nous a fait connaître une force qui se développe dans les vibrations des gaz, et qui augmente leur ressort Cette force est la chaleur, et j'ai remarqué le premier, qu'en y ayant égard, on avait l'explication véritable de la différence observée. M Poisson a développé ma remarque, dans un savant mémoire sur la Théorie du Son, inséré dans le Journal de l'École Polytechnique. Enfin, je suis parvenu au théorème suivant, que j'ai publié dans les Annales de Physique et de Chimie de l'année 1816

« La vitesse du son est égale au produit de la vitesse que donne la formule Newtonienne, par la racine carrée du rapport de la chaleur spécifique de l'air sous une pression constante, à sa chaleur spécifique sous un volume constant »

La première de ces deux chaleurs spécifiques surpasse la seconde il faut employer une plus grande quantité de calorique, pour élever d'un degré la température d'un volume d'air, lorsqu'il reste soumis à la même pression, que lorsqu'il est contenu dans le même espace, et c'est la raison pour laquelle il développe du calorique, par le seul effet de la compression Ainsi le rapport précédent surpassant l'unité, il augmente la vitesse du son conclue de la formule de Newton. Pour déterminer par l'expérience, ce rapport, il faut se rapprocher le plus qu'il est possible, de ce qui a lieu dans les vibrations aériennes La durée de la vibration d'une molécule d'air, est au-dessous d'une tierce sexagésimale Dans ce court intervalle, le calorique absolu de la molécule peut être supposé constant, car il ne peut se perdre que par le rayonnement de la molécule, ou par sa communication aux molécules voisines, et pour rendre cette perte sensible, il faut un temps beaucoup plus long qu'une tierce. MM Clément et Desormes, ont les premiers, par un procédé ingénieux, imité ce qui se passe à cet égard, dans les vibrations de l'air Ensuite, MM. Gay-Lussac et Welter ont fait, par un moyen encore plus précis, un grand nombre d'expériences de ce

genre, qui donnent le rapport des deux chaleurs spécifiques, égal à 1,3750 Ainsi le produit de la formule Newtonienne par la racine carrée de ce nombre, est la vitesse du son

Pour comparer cette vitesse à la nature, il fallait en répéter l'expérience d'une manière très précise, et en ayant égard à la pression de l'atmosphère, à sa température, et à son état hygrométrique; car si les observations précises font naître les théories, la précision des théories provoque à son tour la précision des observations L'expérience faite en 1738, par les académiciens français, quoique la meilleure, laissait beaucoup à désirer sous ces rapports Le Bureau des Longitudes a bien voulu sur ma proposition, répéter cette expérience dont le résultat ne diffère que de trois mètres, de celui de ma formule

Les nombreuses expériences de MM Gay-Lussac et Welter, s'étendent depuis la température de —10°, jusqu'à celle de 40°, et depuis la pression de deux atmosphères, jusqu'à la pression d'un vingtième de l'atmosphère · elles donnent le rapport des deux chaleurs spécifiques de l'air, à très peu près constant dans ces grands intervalles. Par la nature de ces expériences, le rapport qu'elles déterminent est toujours un peu moindre que le véritable, et la différence doit augmenter, quand la pression diminue De nouvelles expériences feront connaître s'il faut attribuer à cela, les anomalies observées Mais si la constance de ce rapport n'est pas rigoureuse, elle est du moins fort approchée, et l'on peut l'adopter sans erreur sensible, dans les calculs sur l'action de la chaleur de l'air et des gaz Il en résulte que ma formule de la vitesse du son, s'étend à toutes les élévations au-dessus du niveau de la mer; et c'est ce que confirme l'expérience de cette vitesse, faite par les Savans français et espagnols envoyés au Pérou en 1740, pour y mesurer un degré du méridien Ils ont trouvé à Quito, élevé de 2800 mètres au-dessus du niveau de la mer, la vitesse du son que l'on a déterminée à ce niveau

Si l'on suppose le rapport des deux chaleurs spécifiques des gaz, rigoureusement constant, on obtient la chaleur absolue de leurs molécules, exprimée par une fonction arbitraire dont la forme la plus simple est une constante, plus une autre constante divisée par la densité du gaz, et multipliée par sa pression élevée à une puissance égale au rapport de la chaleur spécifique de ce gaz sous un volume constant, à sa chaleur spécifique sous une pression constante Cette expression fort simple

satisfait à très peu près aux diverses expériences que l'on a faites jusqu'à présent sur les phénomenes de chaleur des gaz, dans leur compression et dans leur refroidissement, et des vapeurs, en passant à l'état liquide

Les principes précédens appliqués aux atmosphères donnent les lois de leur équilibre et de leur pression aux diverses hauteurs, ainsi que la vitesse du son dans toutes les directions Les molécules atmosphériques sont contenues par l'attraction du corps qu'elles environnent Elles s'étendent au-dessus de sa surface, jusqu'à une limite qu'il est impossible d'assigner, et qui dépend du poids de chaque molecule, de la force répulsive de son calorique, et du décroissement de la température Mais on conçoit facilement l'existence de cette limite Si l'on considère la lumière du Soleil, comme produite par les vibrations qu'il excite dans une atmosphère qui l'entoure, mes formules donnent sa vitesse qui n'est pas un sept-centième de celle que l'on observe Il faut donc, si la lumière consiste dans les vibrations d'un fluide éthéré, que ce fluide soit comprimé dans les espaces célestes, par des forces bien supérieures à celles qui retiennent les atmosphères Nous ne voyons rien dans ces espaces, qui puisse produire une semblable compression

Les physiciens qui se sont occupés avec le plus de succès, de la théorie de la chaleur, ont admis l'émission du calorique par les molécules des corps Ils ont expliqué par là, d'une manière heureuse, l'égalité de température, dans tous les points d'un espace dont toutes les parties de l'enveloppe sont à la même température, et la réflexion du froid par les miroirs concaves Ils ont déterminé les lois de la propagation de la chaleur, dans les corps solides Les phénomènes les ont conduits à distinguer deux espèces de chaleur, l'une libre, et l'autre latente La théorie précédente ajoute à ces suppositions, celle du calorique retenu dans chaque molécule par l'attraction de cette molécule, et celle de la répulsion de ce calorique par le calorique des molécules environnantes Ces deux suppositions me paraissent évidemment indiquées par la force répulsive des gaz et par l'augmentation que cette force reçoit d'un accroissement de température Ma théorie étend aux molécules des gaz, le rayonnement admis par les physiciens Mais pour satisfaire aux lois de Mariote et de MM Dalton et Gay-Lussac, ce rayonnement doit être proportionnel à la compression que le calorique libre d'une molécule de gaz éprouve de la force répulsive du calorique libre des molécules qui l'environnent Il paraît donc naturel d'admettre, conformément à

ma théorie, cette force répulsive, comme la cause du rayonnement des molécules des corps. Au moyen de ces suppositions, les phénomènes de l'expansion, de la chaleur, et des vibrations des gaz, sont ramenés à des forces attractives et répulsives qui ne sont sensibles qu'à des distances imperceptibles. Dans ma théorie de l'action capillaire, j'ai ramené à de semblables forces, les effets de la capillarité. Tous les phénomènes terrestres dépendent de ce genre de forces, comme les phénomènes célestes dépendent de la gravitation universelle Leur considération me paraît devoir être maintenant, le principal objet de la Philosophie mathématique Il me semble même utile de l'introduire dans les démonstrations de la Mécanique, en abandonnant les considérations abstraites de lignes sans masse flexibles ou inflexibles, et de corps parfaitement durs Quelques essais m'ont fait voir qu'en se rapprochant ainsi de la nature, on pouvait donner à ces démonstrations, autant de simplicité et beaucoup plus de clarté que par les méthodes usitées jusqu'à ce jour.

CHAPITRE II.

Sur l'attraction des Sphères, et sur la répulsion des fluides élastiques.

2 NEWTON a démontré ces deux propriétés remarquables de la loi d'attraction réciproque au carré de la distance, l'une, que la sphère attire un point situé au dehors, comme si toute sa masse était réunie à son centre, l'autre, qu'un point situé au dedans d'une couche sphérique, ne reçoit de son attraction, aucun mouvement J'ai fait voir dans le second Livre, que parmi toutes les lois d'attraction décroissante à l'infini, par la distance, la loi de la nature est la seule qui jouisse de ces propriétés dans toute autre loi d'attraction, l'action des sphères est modifiée par leurs dimensions Pour déterminer ces modifications, je partirai des formules que j'ai données dans le n° 12 du second Livre, en conservant les mêmes dénominations J'ai trouvé l'attraction d'une couche sphérique dont u est le rayon, et r est la distance d'un point extérieur à son centre, égale à la différentielle prise par rapport à r, et divisée par dr, de la fonction

$$\frac{2\pi u}{r}\cdot\left[\psi(r+u)-\psi(r-u)\right]$$

Dans cette fonction, π est le rapport de la circonférence au diamètre, $\psi(r)$ est $\int r dr\, \varphi_{,}(r)$, et $\varphi_{,}(r)$ est $\int dr.\varphi(r)$, $\varphi(r)$ exprimant la loi de l'attraction Enfin, l'attraction de la couche est supposée dirigée vers son centre

Désignons $\int dr.\psi(r)$ par $\psi_{,}(r)$, $\int dr.\psi_{,}(r)$ par $\psi_{,,}(r)$, et ainsi de suite La fonction précédente multipliée par du, et intégrée depuis

$u=0$, jusqu'à $u=R$, R étant le rayon de la sphère, devient

$$\frac{2\pi}{r}\cdot\left\{\begin{matrix}R.[\psi_{,}(r+R)+\psi_{,}(r-R)]\\-\psi_{,,}(r+R)+\psi_{,,}(r-R)\end{matrix}\right\},$$

ou

$$\frac{2\pi.R^2}{r}\cdot\frac{d}{dR}\left[\frac{\psi_{,,}.(r+R)-\psi_{,,}(r-R)}{R}\right]$$

La différentielle de cette fonction, prise par rapport à r et divisée par dr, donne pour l'attraction d'une sphère de la densité ρ,

$$2\pi\rho.R^2.\frac{dd}{drdR}\left[\frac{\psi_{,,}(r+R)-\psi_{,,}(r-R)}{rR}\right] \qquad (A)$$

Si l'on suppose la loi d'attraction $\varphi(r)$ égale à $r^{-2-\alpha}$, cette formule devient, en désignant par M la masse de la sphère,

$$\frac{3M}{2r^2R^3}\left(\frac{(r+R)^{3-\alpha}-(r-R)^{3-\alpha}-(3-\alpha)[(r+R)^{1-\alpha}+(r-R)^{1-\alpha}]\,Rr}{(1+\alpha)\,(1-\alpha)\,(3-\alpha)}\right) \qquad (B)$$

Si le point attiré est à la surface, on a $r=R$, et cette fonction devient

$$\frac{M\,2^{-\alpha}\,R^{-2-\alpha}}{(1-\alpha)\,(1-\frac{1}{3}\alpha)}$$

A une grande distance r, la même fonction devient $M.r^{-2-\alpha}$; ce n'est donc que dans les deux cas de $\alpha=0$ et de $\alpha=-3$, que l'attraction à la surface de la sphère, est à l'attraction à une grande distance, dans le rapport donné par la loi de l'attraction, c'est-à-dire, dans le rapport de $R^{-2-\alpha}$ à $r^{-2-\alpha}$

Lorsque Newton voulut reconnaître l'identité de la force qui retient la Lune dans son orbite, avec la pesanteur; il supposa que la pesanteur d'un corps qui s'élève successivement de la surface de la Terre, diminue suivant le rapport des distances, donné par la loi d'attraction de la nature L'exactitude de cette supposition que ce grand géomètre a démontrée depuis, lui aurait fait voir cette identité, s'il n'avait pas employé une mesure fautive de la Terre.

Dans le cas de $\alpha=-1$, le numérateur et le dénominateur de la formule (B) deviennent nuls, et l'on trouve par les méthodes connues, que cette formule devient

$$\frac{3M}{8rR^2}(r^2+R^2)+\frac{3M}{16\,r^2R^3}(r^2-R^2)^2.\log\left(\frac{r-R}{r+R}\right).$$

Considérons présentement, l'attraction d'une couche sphérique, sur un point placé au dedans, à la distance r de son centre, R et r' étant les rayons des surfaces extérieure et intérieure de la couche. L'attraction d'une couche dont u est le rayon, du l'épaisseur et ρ la densité, est par le n° 12 du second Livre,

$$2\pi.\rho u du.\frac{d}{dr}\left[\frac{\psi(u+r)-\psi(u-r)}{r}\right]$$

Il faut intégrer cette quantité depuis $u=r'$ jusqu'à $u=\mathrm{R}$. On trouvera par l'analyse précédente, que cette intégrale est

$$\begin{aligned}&2\pi\rho\mathrm{R}^2\frac{dd}{drd\mathrm{R}}\left[\frac{\psi_{\prime\prime}(\mathrm{R}+r)-\psi_{\prime\prime}(\mathrm{R}-r)}{r\mathrm{R}}\right];\\ &-2\pi\rho.r'^2\frac{dd}{drdr'}\left[\frac{\psi_{\prime\prime}(r'+r)-\psi_{\prime\prime}(r'-r)}{rr'}\right]\end{aligned}\qquad(\mathrm{C})$$

En comparant cette formule à la formule (A), on voit que l'attraction de la couche sphérique sur le point intérieur, est la différence des produits des attractions de la sphère intérieure dont le rayon est r, sur deux points placés aux surfaces extérieure et intérieure de la couche, multipliées respectivement par $\frac{\mathrm{R}^2}{r^2}$ et $\frac{r'^2}{r^2}$, ce qui donne l'attraction de la couche sur un point intérieur, lorsque l'on a l'attraction de la sphère sur les points extérieurs.

Si l'on suppose le point attiré, à la surface intérieure de la couche; r' devient r en ajoutant à la formule (C), l'attraction de la sphère dont le rayon est r, sur un point placé à sa surface, la formule (C) deviendra

$$2\pi.\rho.\mathrm{R}^2.\frac{dd}{drd\mathrm{R}}\left[\frac{(\psi_{\prime\prime}\mathrm{R}+r)-\psi_{\prime\prime}(\mathrm{R}-r)}{r\mathrm{R}}\right],\qquad(\mathrm{D})$$

c'est l'expression de l'attraction de la sphère dont le rayon est R, sur un point de son intérieur, placé à la distance r du centre. La comparaison de cette formule avec la formule (A), donne le théorème suivant

« L'attraction d'une sphère sur un point de la surface d'une petite » sphère intérieure concentrique à la première, est à l'attraction de la » petite sphère, sur un point de la surface de la grande, comme la » grande surface est à la petite »

De là il suit que l'attraction entière d'une sphère sur la surface de l'autre, est la même pour chacune d'elles.

Je vais maintenant considérer l'attraction mutuelle de deux sphères, l'une sur l'autre. Soient R et R′ leurs rayons, ρ et ρ' leurs densités et r la distance de leurs centres. On peut considérer la première sphère comme si sa masse était réunie à son centre et attirait les points extérieurs suivant une loi d'attraction exprimée par la formule (A) En vertu de l'égalité de l'action à la réaction, un point attire une sphère, comme il en est attiré; ainsi, pour avoir l'action de la seconde sphère sur la première, il faut supposer la loi d'attraction, exprimée par la fonction (A). En désignant donc cette fonction par $'\varphi(r)$, on aura

$$'\varphi_{,}(r) = \frac{2\pi\rho R^2}{r} \cdot \frac{d}{dR}\left[\frac{\psi_{,,}(R+r) - \psi_{,,}(r-R)}{R}\right];$$

ce qui donne $\int r dr . '\varphi_{,}(r)$, que nous désignerons par $'\psi(r)$, égal à

$$2\pi\rho R^2 . \frac{d}{dR}\left[\frac{\psi_{,,,}(R+r) - \psi_{,,,}(r-R)}{R}\right]$$

Si l'on substitue cette valeur de $'\psi(r)$, au lieu de $\psi(r)$ dans la formule (A), cette formule donnera pour l'attraction de la seconde sphère sur la première,

$$4\pi^2 . \rho\rho' . R^2 . R'^2 \frac{d^3}{dr . dR\ dR'}\left\{\frac{\begin{array}{l}\psi_{v}(r+R+R') - \psi_{v}.(r+R-R') \\ -\psi_{v}(r-R+R') + \psi_{v}(r-R-R')\end{array}}{rRR'}\right\}; \quad \text{(E)}$$

ce sera aussi l'attraction de la première sphère sur la seconde; c'est-à-dire, que l'on peut supposer les deux sphères réunies respectivement à leurs centres, et agissant l'une sur l'autre suivant une loi d'attraction, exprimée par la fonction (E) divisée par le produit des masses ou par

$$\frac{16}{9} . \pi^2\rho\rho' . R^3 . R'^3.$$

Dans les sept intégrations qui déterminent $\psi_{v}(r)$, on ne doit point s'inquiéter de l'origine de chaque intégrale. Cette origine peut être différente à chaque intégration, sans qu'il en résulte aucun changement dans la formule (E). En effet, un changement arbitraire d'origine à

chaque intégration, introduit dans la fonction $\psi_{\nu}(r)$ dérivée de $\varphi(r)$, la fonction

$$A.r^7 + A^{(1)}.r^5 + A^{(2)}.r^4 + A^{(3)}.r^3 + A^{(4)}.r^2 + A^{(5)}r + A^{(6)},$$

A, $A^{(1)}$, etc, étant des constantes arbitraires, et il est facile de voir que cette fonction substituée pour $\psi_{\nu}(r)$ dans la formule (E) la rend identiquement nulle

Si l'on suppose $\varphi(r) = \frac{H}{r^2}$, on aura

$$\psi_{\nu}(r) = -\frac{H\, r^6}{1.2\ 3.4.5\ 6},$$

et la formule (E) devient

$$\frac{16}{9}\pi^2\rho\rho'.R^3\ R'^3.\frac{H}{r^2},$$

c'est-à-dire que les deux sphères s'attirent comme si leurs masses étaient réunies à leurs centres, ce qui est conforme à ce que Newton a démontré

3. Les formules précédentes s'appliquent évidemment à la répulsion des fluides élastiques contenus dans des enveloppes sphériques, pourvu que la densité du fluide, soit partout la même

Si l'on nomme p la pression du fluide, et si l'on désigne par φ la force répulsive d'une sphère fluide, dont R est le rayon, et ρ la densité, sur un point placé à la distance r de son centre, et qui éprouve la pression p, on aura par le n° 17 du premier Livre,

$$dp = \rho.\varphi dr,$$

dr étant l'élément de la direction de la force répulsive qui agit en sens contraire de la force attractive φ est la fonction (D), $\int\varphi dr$ est donc cette fonction dans laquelle on supprime la différentiation par rapport à r, et alors on a $p =$ constante

$$+2\pi.\rho^2.\frac{R^2}{r}.\frac{d}{dR}\left[\frac{\psi_{\prime\prime}(R+r) - \psi_{\prime\prime}(R-r)}{R}\right] \qquad (F)$$

Newton a supposé entre les molécules de l'air, une force répulsive

réciproque à leur distance, ce qui revient à supposer $\varphi(r) = \frac{1}{r}$. Cette supposition donne

$$\psi_{\prime\prime}(r) = \frac{1}{96} r^4 \left(4 \cdot \log r - \frac{13}{3}\right).$$

Cette valeur substituée dans la fonction (F), est loin de représenter les observations qui donnent p constant, aussi ce grand géomètre ne donne-t-il à cette loi de répulsion, qu'une sphère d'activité d'une étendue insensible Mais la manière dont il explique ce défaut de continuité, est bien peu satisfaisante Il faut sans doute admettre entre les molécules de l'air, une force répulsive qui ne soit sensible qu'à des distances imperceptibles : la difficulté consiste à en déduire les lois que présentent les fluides élastiques C'est ce que l'on peut faire par les considérations suivantes

J'observe d'abord qu'une molécule de gaz ou de fluide élastique, contenue dans une enveloppe sphérique, n'étant point en contact avec les molécules voisines; elle doit être en équilibre, en vertu de toutes les forces répulsives qu'elle éprouve; en sorte que φ doit être nul dans l'équation

$$dp = \rho\varphi dr,$$

ce qui donne la pression p constante dans toute l'étendue du fluide En supposant donc conformément à l'expérience, la pression p fonction de la densité dans les fluides élastiques, à une température constante, on voit que la densité ρ doit être supposée la même dans toutes les parties du fluide Nous démontrerons ci-après, ce résultat de l'expérience, pour tous les points du fluide placés à une distance de l'enveloppe, plus grande que le rayon de la sphère d'activité sensible de la force répulsive

Maintenant, je suppose les molécules des gaz, à une distance réciproque, telle que leur attraction mutuelle soit insensible, ce qui me paraît être la propriété caractéristique de ces fluides, et même des vapeurs, de celles du moins, qui par une légère compression, ne se réduisent point en partie, à l'état liquide Je suppose ensuite que ces molécules retiennent par leur attraction, la chaleur, et que leur répulsion mutuelle soit due à la répulsion des molécules de la chaleur, répulsion dont je suppose l'étendue de la sphère d'activité, insensible

Soit c la chaleur contenue dans chaque molécule de gaz; la répulsion de deux molécules sera évidemment proportionnelle à c^2 En nommant donc r leur distance mutuelle, nous exprimerons la loi de répulsion de deux molécules de gaz, par $Hc^2.\varphi(r)$, $\varphi(r)$ devenant insensible lorsque r a une valeur sensible H est une constante qui dépend de la force répulsive de la chaleur, et qui semble ainsi devoir être la même pour tous les gaz mais, pour plus de généralité, je la supposerai seulement constante pour le même gaz. J'imagine présentement une enveloppe sphérique, remplie d'un gaz quelconque On vient de voir que la pression et la densité seront les mêmes dans tous les points de cette sphère, placés à une distance sensible de l'enveloppe Je conçois ensuite une sphère intérieure concentrique à l'enveloppe, dont R soit le rayon à très peu près égal à celui de l'enveloppe, de manière cependant, que la densité de la couche du gaz qui recouvre cette sphère puisse être censée constante dans une étendue égale ou supérieure à celle de la sphère d'activité sensible de la force répulsive de la chaleur Si l'on nomme r le rayon d'une molécule de cette couche, la formule (A) du n° 2, donnera

$$-2\pi.Hc^2.\rho.R^2.\frac{dd}{drdR}.\left[\frac{\psi_{,,}(r-R)}{rR}\right]$$

pour la force répulsive que la sphère exerce sur cette molécule de la couche En effet, la nature des forces qui ne sont sensibles qu'à des distances insensibles rend $\psi_{,,}(r)$ insensible, lorsque r a une valeur sensible. Sur quoi, j'observerai qu'en vertu de cette nature, $\psi(r)$ est incomparablement supérieur à $\psi_{,}(r)$, $\psi_{,}(r)$ est incomparablement supérieur à $\psi_{,,}(r)$, et ainsi de suite J'affecte l'expression précédente du facteur Hc^2, parce que $\varphi(r)$ a ce facteur La fonction précédente devient encore par les mêmes considérations

$$2\pi.\frac{Hc^2\rho R^2}{rR}.\psi(r-R).$$

Il faut multiplier cette fonction par $4\pi\rho r^2dr$, pour avoir l'action répulsive de la sphère intérieure, sur la couche extérieure dont ρ est la densité, r le rayon, et dr l'épaisseur Soit $r-R=s$, s étant une quantité imperceptible, la fonction précédente devient à très peu près en observant que r est supposé différer extrêmement peu de R,

$$2\pi^2.Hc^2\rho^2.4R^2ds.\psi(s)$$

Il faut ensuite, pour avoir l'action entière de la sphère intérieure sur la couche qui la recouvre, intégrer cette différentielle, depuis s nul jusqu'à s infini, en nommant donc K l'intégrale $\int ds \psi(s)$ prise dans ces limites, on aura pour cette action,

$$2\pi . Hc^2\rho^2 . 4\pi R^2 K.$$

Concevons maintenant toutes les molécules du gaz, liées fixement entre elles, et que la couche qui recouvre la sphère, soit divisée en parties finies qui puissent se soulever par l'action répulsive de la sphère, mais qui soient retenues par une pression P exercée sur chaque point de l'enveloppe Cette pression sur l'enveloppe entière sera $4\pi R^2 . P$, à très peu près, et elle doit faire équilibre à l'action répulsive de la sphère, ce qui donne

$$P = 2\pi . Hc^2\rho^2 . K.$$

Cette valeur de P est indépendante du rayon R de la sphère, ce qui tient à ce que l'action répulsive de la chaleur ne s'exerçant qu'à des distances insensibles, on peut ne considérer que les parties du gaz, extrêmement voisines du point de l'enveloppe qui éprouve la pression P. De là et de ce que la pression p dans l'intérieur du gaz est constante, la force φ qu'éprouve chaque molécule étant nulle dans l'équation

$$dp = \rho . \varphi dr;$$

il est facile de conclure que, quelle que soit la forme de l'enveloppe, la pression P du gaz est toujours

$$P = 2\pi HK\rho^2 c^2 \qquad (1)$$

4 Imaginons cette enveloppe à une température u, et contenant un gaz à la même température Il est clair qu'une molécule quelconque de ce gaz sera atteinte à chaque instant, par des rayons caloriques émanés des corps environnans Elle éteindra une partie de ces rayons; mais il faudra, pour le maintien de la température, qu'elle remplace ces rayons éteints, par son rayonnement propre La molécule, dans tout autre espace à la même température, sera atteinte à chaque instant par la même quantité de rayons caloriques . elle en éteindra une même partie qu'elle rendra par son rayonnement La quantité de rayons caloriques

qu'une surface donnée reçoit à chaque instant est donc une fonction de la seule température, et indépendante de la nature des corps environnans : je la désignerai par $\Pi(u)$ L'extinction sera donc $q.\Pi(u)$, q étant un facteur constant dépendant de la nature de la molécule ou du gaz J'observerai ici que la quantité de rayons émanés des corps environnans, et qui forme la chaleur libre de l'espace, est à raison de l'extrême vitesse que l'on doit supposer à ces rayons, une partie insensible de la chaleur contenue dans les corps ; comme on l'a reconnu d'ailleurs par les expériences que l'on a faites pour condenser cette chaleur Maintenant, quelle que soit la manière dont la chaleur des molécules environnantes agit par sa répulsion sur la chaleur de la molécule du gaz, pour en détacher une partie, et pour faire rayonner cette molécule, il est clair que ce rayonnement sera en raison composée de la chaleur et de la densité du gaz environnant la molécule, ou de ρc et de la chaleur c contenue dans la molécule, il sera donc proportionnel à ρc^2; ρc^2 est donc proportionnel à l'extinction $q.\Pi(u)$, et nous pourrons supposer

$$\rho c^2 = q'.\Pi(u), \qquad (2)$$

q' étant un facteur constant dépendant de la nature du gaz, et $\Pi(u)$ étant une fonction de la température, indépendante de cette nature.

Les équations (1) et (2) renferment les lois générales des fluides élastiques Elles donnent

$$P = i\rho.\Pi(u), \qquad (3)$$

en désignant par i le facteur $2\pi HK.q'$, qui dépend de la nature du gaz Cette équation donne en supposant la température constante, P proportionnel à ρ, ce qui est la loi de Mariote En supposant ensuite P constant, la température u devenant u' et la densité ρ devenant ρ', on a

$$\frac{\rho'}{\rho} = \frac{\Pi(u)}{\Pi(u')}$$

Le second membre de cette équation étant indépendant de la nature du gaz, on voit que la fraction $\frac{\rho'}{\rho}$ est la même pour tous les gaz, lorsque la température u se change en u'; ce qui est la loi que MM Dalton et Gay-Lussac nous ont fait connaître, et suivant laquelle le même vo-

lume v des divers gaz se change pour tous dans le même volume v', par le même changement de la température u en u'; car on a évidemment

$$\frac{v}{v'} = \frac{\prime}{v}.$$

5 Les considérations et l'analyse précédentes s'appliquent facilement au mélange des gaz et des vapeurs, qui dans ce mélange n'exercent point d'affinité les unes avec les autres. On sait qu'à la longue, la diffusion de ces gaz, les répand en proportions égales dans toutes les parties du mélange. Je vais donc considérer le mélange de deux gaz dans cet état Je le suppose dans une enveloppe sphérique On voit d'abord que chaque molécule de ce mélange, étant en équilibre au milieu de toutes les forces répulsives qu'elle éprouve, la pression doit être la même dans toutes les parties du mélange Si l'on conçoit, comme ci-dessus, une sphère intérieure concentrique à l'enveloppe, et d'un rayon R à très peu près égal à celui de cette enveloppe; on aura l'action répulsive de cette sphère, sur la couche très mince de gaz qui la recouvre, en considérant la sphère et la couche, comme deux sphères et deux couches, formées des deux gaz. Soient ρ et ρ' les densités de ces gaz, l'action de la sphère du premier gaz sur la couche du premier gaz, sera par ce qui précède, $2\pi.\mathrm{HK}c^2\rho^2$, ou $\mathrm{L}c^2\rho^2$, en désignant $2\pi\mathrm{HK}$ par L, c est la chaleur contenue dans chaque molécule du premier gaz, et L dépend de la nature de ce gaz, ou de la manière dont ses molécules se repoussent mutuellement en vertu de la force répulsive de la chaleur qu'elles contiennent Il résulte encore de l'analyse précédente, que l'action répulsive du premier gaz sur la couche du second gaz, peut-être exprimée par $\mathrm{N}.cc'\rho\rho'$, c' étant la chaleur contenue dans une molécule du second gaz, et N étant une constante qui dépend de la manière dont deux molécules du premier et du second gaz, se repoussent mutuellement par la force répulsive de leur chaleur L'action de la sphère du second gaz sur la couche du premier gaz, sera pareillement $\mathrm{N}cc'.\rho\rho'$ Enfin, l'action de la sphère du second gaz sur la couche du second gaz, peut être exprimée par $\mathrm{L}'.c'^2\rho'^2$. En réunissant toutes ces actions dont la somme doit être égale à la pression P du mélange, on aura

$$\mathrm{P} = \mathrm{L}.c^2\rho^2 + 2\mathrm{N}.cc'.\rho\rho' + \mathrm{L}'.c'^2\rho'^2.$$

On voit par ce qui précède, que cette valeur de P a lieu quelle que soit la figure de l'enveloppe

Considérons maintenant, le rayonnement de chaque molécule du gaz mélangé Le rayonnement d'une molécule du premier gaz, et produit par l'action répulsive de la chaleur de ce gaz, sera par ce qui précède, proportionnel à $Lc^2\rho$. Le rayonnement de la même molécule, par l'action du second gaz sera dans le même rapport avec $Ncc'\rho'$ En égalant la somme de ces rayonnemens à l'extinction par la molécule, des rayons qu'elle reçoit, et qui est proportionnelle à la fonction $\Pi(u)$ de la température u, on aura

$$Lc^2\rho + Ncc'\rho' = \iota.\Pi(u),$$

ι étant un facteur dépendant de la manière dont les molécules du premier gaz éteignent les rayons caloriques. On aura pareillement, en considérant le rayonnement d'une molécule du second gaz,

$$L'c'^2\rho' + Ncc'\rho = \iota'.\Pi(u)$$

Ces deux équations multipliées respectivement par ρ et ρ', donnent en les ajoutant

$$L.c^2\rho^2 + 2N.cc'.\rho\rho' + L'c'^2\rho'^2 = \iota.\rho.\Pi(u) + \iota'\rho'.\Pi(u),$$

Le premier membre de cette équation est la pression P du mélange à la température u. La fonction $i\rho.\Pi(u)$ serait par ce qui précède, la pression du premier gaz, s'il existait seul dans l'enveloppe, et $i'\rho'\ \Pi(u)$ serait la pression du second gaz s'il était seul En nommant donc p et p' ces pressions, on aura

$$P = p + p'$$

Il est facile de voir que la pression P d'un nombre quelconque de gaz dont les pressions partielles seraient p, p', p'', etc , sera

$$P = p + p' + p'' + \text{etc},$$

ce qui est donné par l'expérience

Cette équation ayant lieu, quelle que soit N ; elle subsistera en faisant comme M Dalton, N nul, c'est-à-dire, en supposant nulle, l'action répulsive réciproque de deux gaz différens Mais cette hypothèse est bien peu naturelle elle est d'ailleurs contraire à plusieurs phénomènes

L'équation (3) donne pour un même gaz

$$\frac{\Pi.(u')}{\Pi\ (u)} = \frac{P'\rho}{P\rho'};$$

si l'on nomme v et v' es volumes du gaz, aux températures u et u', on aura $\frac{\rho}{\rho'} = \frac{v'}{v}$; on aura donc

$$\frac{\Pi\ (u')}{\Pi\ (u)} = \frac{P'v'}{Pv}$$

En supposant $P = P'$, $\Pi.(u)$ sera proportionnel à v; la fonction $\Pi(u)$ sera donc exprimée par le thermomètre d'un gaz maintenu à une pression constante

Mais que doit-on entendre par la température u, et quelle est sa mesure? Il paraît naturel de prendre pour cette mesure, la densité même du calorique produit dans un espace, par le rayonnement des corps environnans : alors $\Pi.(u)$ devient u, et cette densité est mesurée par les degrés du thermomètre à air, ou par v Pour un degré d'accroissement de température, en partant de la température de la glace fondante, v croît de $0{,}00375.v'$, suivant les expériences de M. Gay-Lussac, la valeur de v, à cette température, étant exprimée par v', d'où il suit que la densité du calorique de l'espace dont la température est celle de la glace fondante, est représentée par $266° \frac{2}{3}$.

Une supposition qu'il paraît très naturel d'admettre, est que l'action du calorique d'une molécule des gaz, sur le calorique d'une autre molécule, ne dépend point de la nature de ces molécules; ce qui donne

$$L = L' = N$$

Alors on a les équations suivantes relatives au mélange d'un nombre quelconque de gaz, renfermé dans un litre, par exemple, mélange qui n'est dans un état stable d'équilibre, qu'autant que chacune de ses plus petites portions contient les molécules des divers gaz, en même rapport que le mélange total.

$$\left.\begin{array}{l} P = k\,.\,(\rho c + \rho' c' + \rho'' c'' + \text{etc.})^2, \\ k\rho c\,.\,(\rho c + \rho' c' + \rho'' c'' + \text{etc}) = q\rho u; \\ k\rho' c'.\,(\rho c + \rho' c' + \rho'' c'' + \text{etc}) = q'\rho' u; \\ k\rho'' c''.(\rho c + \rho' c' + \rho'' c'' + \text{etc}) = q''\rho'' u''; \\ \quad \text{etc.} \end{array}\right\} \text{(A)}$$

P est la pression du mélange, k est une constante dépendante de l'intensité de la force répulsive mutuelle des particules du calorique, c, c', c'', etc., sont les quantités de chaleur contenues dans un gramme du premier gaz, du second, du troisième, etc., ρ, ρ', ρ'', etc., sont les nombres de grammes de ces gaz, dans un litre du mélange, u est la température du mélange, et q, q', q'', etc, sont des constantes dépendantes de la nature de chaque gaz.

Les équations (A) donnent

$$\frac{\rho' c'}{\rho c} = \frac{q'\rho'}{q\rho}; \quad \frac{\rho'' c''}{\rho c} = \frac{q''\rho''}{q\rho}; \text{ etc}$$

on a donc

$$\rho c + \rho' c' + \rho'' c'' + \text{etc} = (\rho q + \rho' q' + \rho'' q'' + \text{etc.}).\frac{c}{q}$$

Ainsi en faisant

$$\rho q + \rho' q' + \rho'' q'' + \text{etc} = (q).(\rho),$$
$$\rho + \rho' + \rho'' + \text{etc.} = (\rho);$$
$$C = \frac{(q).c}{q},$$

les équations (A) donneront

$$P = k.(\rho)^2.C^2; \qquad (5)$$
$$k.(\rho).C^2 = (q).u \qquad (6)$$

Ces équations sont les mêmes que les équations (3) et (4) relatives à un fluide simple. Elles reviennent à considérer comme molécules du fluide composé, un groupe infiniment petit dans lequel les molécules des divers gaz entrent dans le même rapport, que dans le mélange entier. C est le calorique contenu dans un gramme de ce mélange, (ρ) est le poids d'un litre du mélange.

L'air atmosphérique est, comme on sait, composé de quatre différens gaz, savoir, l'azote, l'oxigène, la vapeur aqueuse, et un peu d'acide carbonique, on peut donc appliquer à ce fluide composé, les équations (5) et (6) On peut encore dans les vibrations aériennes, considérer l'air comme formé de groupes pareils à ceux que je viens d'imaginer. A la vérité, chaque molécule d'un de ces groupes étant sollicitée par des forces différentes, les molécules devraient, dans leurs mouvemens, se séparer, mais les obstacles que les autres groupes opposent à cette

séparation, suffisent pour les retenir ensemble, en sorte que le centre de gravité de chaque groupe, se meut comme si ces molécules étaient liées fixement entre elles; et c'est ainsi que nous les envisagerons dans la suite.

Les équations (5) et (6) donnent

$$P = (q).(\rho).u;$$

ainsi la température restant la même, la pression d'un fluide quelconque, simple ou composé, est proportionnelle à sa densité; ce qui est la loi de Mariote

Les mêmes équations donnent encore, pour un autre fluide simple ou composé,

$$P = (q').(\rho').u;$$

(ρ') étant la densité du second fluide, et (q') étant la valeur de (q) relative à ce fluide; on a donc, quelles que soient la pression P et la température u,

$$\frac{(\rho')}{(\rho)} = \frac{(q)}{(q')}.$$

Le rapport des densités des deux fluides reste donc toujours le même; ce qui est la loi de MM Dalton et Gay-Lussac

REMARQUE.

Nous devons faire ici une remarque importante. La chaleur que nous avons désignée par c, est la chaleur libre ou sensible d'une molécule, celle qui exerce une action sensible sur le thermomètre. Les physiciens ont été conduits par les phénomènes, à distinguer dans la chaleur absolue d'une molécule, deux parties, l'une sensible sur le thermomètre, l'autre *latente*, ou qui n'exerce sur lui aucune action En désignant donc par ι, cette chaleur latente; la chaleur absolue sera $c + \iota$.

6. Nous avons supposé dans ce qui précède, que le calorique d'une molécule y était retenu par l'attraction de cette molécule qui n'éprouvait d'action sensible, que par la force répulsive qu'exerce sur ce calorique, celui des molécules environnantes Cependant chaque molécule d'un corps est soumise à l'action de ces trois forces, 1° la force répulsive de son calorique, par le calorique des autres molécules; 2°. l'attraction de

son calorique par ces molécules, 3° l'attraction de la molécule elle-même, soit par le calorique de ces molécules, soit par les molécules mêmes Sans doute, dans l'état aériforme, la première de ces forces l'emporte beaucoup sur les autres, mais il est utile de connaître leur influence

Pour cela, j'imagine un parallélépipède vertical, d'une longueur et d'une largeur indéfinies Je le conçois rempli d'un gaz en équilibre En le divisant par une section horizontale, je puis supposer toutes les molécules du gaz au-dessus de cette section, liées fixement entre elles je considère une de ces molécules que je désigne par A, élevée de la hauteur r, au dessus de la section son calorique sera repoussé par le calorique d'une molécule B placée au-dessous de la section Soit f la distance mutuelle des deux molécules, r' la distance de la molécule B, à la section, et s, la distance horizontale des deux molécules Soit c le calorique contenu dans chaque molécule, ρ la densité du gaz Il est facile de voir que l'ensemble du calorique des molécules pour lesquelles r', f et s sont les mêmes que pour la molécule B, exercera sur le calorique de la molécule A, une force répulsive qui décomposée suivant la verticale, sera

$$2\pi . c^2 . \frac{s\,(r+r')}{f} . \mathrm{H} . \varphi(f),$$

$\mathrm{H}.\varphi(f)$ étant la loi de répulsion du calorique, à la distance f Il faut multiplier cette fonction par $\rho ds dr'$, et pour avoir l'action entière répulsive du gaz inférieur à la section, sur la molécule A, il faut prendre l'intégrale de ce produit, depuis s nul jusqu'à s infini, et depuis r' nul jusqu'à r' infini On a

$$f^2 = (r+r')^2 + s^2,$$

ainsi en ne faisant varier que f et s, on aura

$$f df = s ds,$$

le produit précédent devient donc

$$2\pi . \mathrm{H} . \rho c^2 . (r+r') . df . \varphi(f) . dr'.$$

Nommons $\varphi_1(f)$ l'intégrale $\int df . \varphi(f)$ prise de manière que $\varphi_1(f)$

soit nul, lorsque f est infini En intégrant ce produit, depuis s nul jusqu'à s infini, on aura

$$-2\pi.\mathrm{H}.\rho c^2.(r+r').dr'.\varphi_1(r+r')$$

Désignons par $\psi(f)$, l'intégrale $\int f df.\varphi_1(f)$ prise de manière que $\psi(f)$ soit nul, lorsque f est infini. La fonction précédente intégrée depuis r' nul, jusqu'à r' infini, sera

$$2\pi.\mathrm{H}.\rho c^2.\psi(r),$$

c'est l'expression de la force répulsive que le calorique du gaz inférieur à la section, exerce dans le sens vertical, sur le calorique de la molécule A Soit Q la surface de la section horizontale dont nous avons parlé, il est facile de voir que l'action verticale du calorique du gaz inférieur, sur le calorique du gaz supérieur, et tendante à le soulever, sera

$$2\pi.\mathrm{Q}.\mathrm{H}.\rho^2c^2.\int dr.\psi(r),$$

l'intégrale étant prise depuis r nul jusqu'à r infini

L'intégrale $\int dr.\psi(r)$ est ce que nous avons ci-dessus nommé K; ainsi le gaz supérieur est soulevé par le gaz inférieur, par une force égale à

$$2\pi.\mathrm{Q}.\mathrm{H}.\mathrm{K}.\rho^2c^2$$

Mais le calorique du gaz inférieur, par l'attraction qu'il exerce sur les molécules du gaz supérieur, produit une force contraire. Si l'on désigne par $\mathrm{M}.\Pi(f)$, la loi de cette attraction; il est facile de voir par ce qui précède, qu'en nommant K', ce que devient K, lorsqu'on change $\varphi(f)$ dans $\Pi(f)$, la force résultante de l'attraction des molécules supérieures du gaz, par le calorique des molécules inférieures, sera

$$2\pi.\mathrm{Q}.\mathrm{M}.\mathrm{K}'.\rho^2c,$$

c'est aussi la force résultante de l'attraction du calorique supérieur, par les molécules du gaz inférieur Enfin, si l'on désigne par $\mathrm{N}.\Gamma(f)$, la loi de l'attraction des molécules du gaz, les unes sur les autres; on aura

$$2\pi.\mathrm{Q}.\mathrm{N}.\mathrm{K}''.\rho^2$$

pour la force verticale du gaz supérieur, résultante de l'attraction réci-

proque des molécules; K'' étant ce que devient K, lorsqu'on change $\varphi(f)$ dans $\Gamma(f)$

Par la réunion de ces diverses actions, le gaz supérieur tend à être soulevé par une force égale à

$$2\pi.Q.\rho^2.(HK.c^2 - 2MK'c - NK'').$$

En désignant donc par QP la pression nécessaire pour contenir ce gaz, on aura

$$P = 2\pi.\rho^2.(HK.c^2 - 2MK'c - NK'')$$

Considérons maintenant le rayonnement d'une molécule A d'un gaz. L'action du calorique d'une molécule B sur le calorique de A sera par ce qui précède, $Hc^2.\varphi(r)$, et l'attraction qu'exerce la molécule B sur ce même calorique, sera $Mc.\Pi(r)$. Ainsi, par ces deux actions réunies, la répulsion du calorique de A sera $Hc^2.\varphi(r) - Mc.\Pi(r)$. En considérant donc A, comme le centre d'une sphère indéfinie, la compression de son calorique, par les forces attractives et répulsives des molécules environnantes, sera

$$4\pi\rho\int r^2dr.[Hc^2.\varphi(r) - Mc.\Pi(r)],$$

les intégrales étant prises depuis r nul jusqu'à r infini, ce qui donne pour cette fonction

$$8\pi.\rho.[Hc^2.\psi(o) - Mc.\Psi(o)]$$

$\Psi(r)$ étant ce que devient $\psi(r)$, lorsque l'on change $\varphi(r)$ dans $\Pi(r)$.

Si l'on considère ainsi que nous le faisons, cette compression, comme cause du rayonnement de la molécule A, ce rayonnement devant être supposé proportionnel à la température, ou à la densité u du calorique de l'espace, on aura

$$Hc^2\rho.\psi(o) - Mc\rho.\Psi(o) = L\,u,$$

L étant une constante

Par la loi de Mariote, on a

$$P = q\rho.u$$

On aura donc, en substituant pour P sa valeur précédente,

$$HKc^2 - 2M.K'c - NK'' = \mathcal{C}.[Hc^2.\psi(0) - Mc.\overline{\psi}(0)];$$

$\mathcal{C}$ étant une constante. Cette équation devant subsister, quel que soit c, on voit d'abord que NK'' est nul, ou du moins insensible; c'est-à-dire que dans l'état de gaz, la force attractive des molécules disparaît devant la force répulsive de leurs caloriques On voit ensuite que l'on doit avoir

$$\frac{\psi(0)}{K} = \frac{\overline{\psi}(0)}{2K''},$$

si dans l'état de gaz, l'attraction d'une molécule sur le calorique d'une autre molécule est sensible Or il est visible que cette équation n'a pas lieu, si $\varphi(r)$ est égal à $\Pi(r)$, ou si la loi de cette attraction est la même que la loi de répulsion du calorique; ce qui devient évident, en mettant l'équation précédente sous cette forme,

$$\frac{\psi(0)}{\int dr\ \psi(r)} = \frac{\overline{\psi}(0)}{2\int dr\ \overline{\psi}(r)},$$

les intégrales étant prises depuis r nul jusqu'à r infini. D'ailleurs il n'est pas naturel de supposer dans tous les gaz, $\varphi(r)$ et $\Pi(r)$, tels qu'ils satisfassent à cette équation Il est donc extrêmement probable que la force attractive du calorique d'une molécule par une autre molécule, est insensible dans l'état de gaz, et qu'il n'y a de sensible dans cet état, que la force répulsive du calorique

Nous avons dit précédemment que la densité d'un gaz contenu dans un vase pouvait être supposée la même dans toute son étendue, à l'exception des parties extrêmement voisines des parois du vase Pour le faire voir, nous observerons que, par ce qui précède, la force répulsive du gaz inférieur à la section horizontale sur le gaz supérieur, est

$$-2\pi.H.Q.\int dr dr'.\ \rho_1 c_1.\rho' c'.\ (r+r').\ \varphi_1(r+r');$$

ρ_1, c_1 se rapportant aux molécules du gaz supérieur, ρ', c' se rapportant aux molécules du gaz inférieur Les intégrales doivent être prises depuis r et r' nuls, jusqu'à r et r' infinis Il est visible que si l'on suppose les variations de ρ et de c, incomparablement moins rapides que celle de $\varphi(r)$, comme elles le sont, lorsque les molécules du gaz sont

à une distance sensible des parois ; les termes dus à ces variations, sont insensibles, et l'on peut supposer cette intégrale égale à $2\pi . Q . H . K . \rho^2 c^2$, ρ et c, se rapportant aux molécules contigues à la section horizontale Cette force répulsive doit balancer la pression PQ de la surface supérieure du vase, plus le poids du gaz supérieur, que je désignerai par mQ, ainsi l'on aura

$$2\pi . HK . \rho^2 c^2 = P + m$$

Lorsque le vase a une petite hauteur, m est incomparablement moindre que P, on peut donc alors, supposer dans toute l'étendue du gaz, ρc constant Le rayonnement d'une molécule A contigue à la section horizontale, donne par ce qui précède,

$$H\rho c^2 . \psi(0) = Lu$$

La température u étant donc supposée la même dans toutes les parties du gaz, c doit être constant, ainsi que ρc, donc aussi ρ peut être supposé le même dans toutes ces parties, pourvu qu'elles soient à une distance sensible des parois

CHAPITRE III.

De la vitesse du Son et du mouvement des Fluides élastiques

7 Considérons pour plus de simplicité, un cylindre horizontal, étroit, creux, rempli d'un gaz, et d'une longueur indéfinie Soit x la distance d'une molécule A de gaz placée dans l'axe du cylindre, à l'origine de cet axe, ρ la densité du gaz, correspondante à cette molécule dont c soit la chaleur libre Soient ρ' et c' les expressions des mêmes quantités relatives à une molécule B placée sur l'axe, à la distance $x+s$. Il résulte de ce que nous venons de dire à la fin du chapitre précédent, que la force répulsive du calorique c de la molécule A, par le calorique du gaz entier, est dans le sens horizontal,

$$-2\pi.\mathrm{H}c.\int\rho'c'.\,sds.\varphi_1(s),$$

l'intégrale étant prise depuis s égal à $-\infty$ jusqu'à $s=\infty$ On a

$$\rho'c'=\rho c+s.\frac{d\,\rho c}{dx}+\text{etc}$$

On peut ici ne considérer que les deux premiers termes du développement de $\rho'c'$, alors l'intégrale précédente devient

$$-4\pi.\mathrm{H}c.\frac{d.\rho c}{dx}.\int s^2ds.\varphi_1(s),$$

l'intégrale étant prise depuis s nul, jusqu'à s infini, ce qui donne

$$\int s^2ds.\varphi_1(s)=-\int ds.\psi(s)=-\mathrm{K},$$

ainsi le gaz entier produit dans la molécule A, une force répulsive dirigée vers l'origine des x, et égale à $4\pi.\mathrm{HK}c.\frac{d\,\rho c}{dx}$, ce qui donne,

en nommant dt, l'élément du temps,

$$\left(\frac{ddx}{dt^2}\right) = -4\pi.\mathrm{HK}.c.\frac{d\ \rho c}{dx}.$$

Soit X la coordonnée horizontale de la molécule A dans l'état d'équilibre, et faisons $x = \mathrm{X} + z$, z étant une quantité très petite par rapport à X. Supposons

$$\frac{\left(\frac{d\ \rho c}{dx}\right)}{\rho c} = (1 - \mathcal{E}).\frac{\left(\frac{d\rho}{dx}\right)}{\rho}$$

En nommant (ρ) la densité du gaz dans l'état d'équilibre, on aura

$$\rho = (\rho).\frac{d\mathrm{X}}{d\mathrm{X} + dz}.$$

En négligeant le carré de dz, et observant que $\left(\frac{d\rho}{dx}\right)$ est égal à $\left(\frac{d\rho}{d\mathrm{X}}\right)$, on aura

$$\left(\frac{d\rho}{dx}\right) = -(\rho)\left(\frac{ddz}{d\mathrm{X}^2}\right)$$

On a ensuite

$$\left(\frac{ddx}{dt^2}\right) = \left(\frac{ddz}{dt^2}\right),$$

on aura donc

$$\left(\frac{ddz}{dt^2}\right) = 4\pi.\mathrm{HK}.(\rho)c^2.(1 - \mathcal{E}).\left(\frac{ddz}{d\mathrm{X}^2}\right),$$

équation dans laquelle on peut supposer que c se rapporte ainsi que (ρ), à l'état d'équilibre, puisque l'on néglige les termes de l'ordre z^2. La pression du gaz dans l'état d'équilibre, étant exprimée par P, on a par le chapitre précédent,

$$\mathrm{P} = 2\pi.\mathrm{H}.\mathrm{K}.(\rho)^2.c^2,$$

on aura donc

$$\left(\frac{ddz}{dt^2}\right) = \frac{2\mathrm{P}}{(\rho)}.(1 - \mathcal{E})\left(\frac{ddz}{d\mathrm{X}^2}\right)$$

Ainsi la vitesse du son, ou l'espace qu'il parcourt dans une seconde, étant comme l'on sait, et comme il est facile de le conclure de l'équation précédente, la racine carrée du coefficient de $\left(\frac{ddz}{d\mathrm{X}^2}\right)$; cette vitesse sera

$$\sqrt{\frac{2\mathrm{P}}{(\rho)}.(1 - \mathcal{E})}$$

Pour appliquer cette formule à l'air atmosphérique, soit h la hauteur d'une atmosphère de la densité (ρ), et ε la hauteur dont la pesanteur fait tomber les corps dans une seconde, cette vitesse sera

$$\sqrt{4h\varepsilon.(1-\mathcal{E})}$$

Les géomètres en étendant ces principes et cette analyse au cas où l'air a trois dimensions, trouveront facilement que dans ce cas la vitesse du son a la même expression

La formule de Newton donne $\sqrt{2h\varepsilon}$ pour l'expression de cette vitesse En partant des valeurs connues de ε et de h, elle serait de $283^{met},4$ dans une seconde sexagésimale, à la température de $7°,5$ L'expérience faite en 1738, par les académiciens français, a donné à cette température, $337^{met},2$. Il est donc bien certain que la formule de Newton donne un résultat trop faible Si la valeur de ι était nulle, ce qui rendrait c constant et par conséquent $\mathcal{E}$ nul, la formule trouvée ci-dessus, donnerait $400^{met},4$ pour la vitesse du son; résultat trop considérable. Il est donc bien prouvé par cette expérience, qu'il existe une chaleur latente ι, dans les molécules des gaz

Je vais maintenant déterminer la valeur de $1-\mathcal{E}$, dont dépend, comme on l'a vu, la vitesse du son dans l'atmosphère Pour cela, j'observe que pendant la courte durée d'une vibration aérienne, la chaleur absolue $c+\iota$ d'une molécule d'air, vibrante, peut être supposée constante, car cette chaleur ne pouvant se dissiper que par le rayonnement ou par sa communication aux molécules voisines, il faut, pour avoir ainsi une perte sensible, un temps beaucoup plus grand que la durée d'une vibration, durée qui n'excède pas une tierce Il n'en est pas de même de la chaleur libre c, qui se perd non-seulement par le rayonnement, mais encore par sa combinaison due à la variation de la densité ρ On peut donc, dans le cas présent, supposer dc ou $d(c+\iota-\iota)$ égal à $-d\iota$

La température u de l'espace ou la densité du fluide discret qui la représente, peut aussi être supposée constante pendant la durée d'une vibration aérienne Elle varie dans le point de l'espace, occupé par une molécule aérienne vibrante, à raison de la variation de densité de l'air qui l'environne, mais cette densité n'est variable que dans l'étendue de la vibration, étendue très petite par rapport à l'espace environnant

la variation de u, étant de l'ordre du produit de cette étendue par la variation de la densité de l'air, on voit qu'elle peut être négligée. Maintenant la chaleur absolue $c+\iota$ de la molécule ne peut dépendre que de ces trois choses, la chaleur libre c, la température u de l'espace, la densité ρ de l'air. On pourrait y ajouter la température v de la molécule; mais cette température étant celle de l'espace dans lequel la molécule serait en équilibre de chaleur, elle est donnée par l'équation

$$k\rho c^2 = qv,$$

elle est ainsi fonction de ρ et de c. De la relation qui existe entre les trois choses dont je viens de parler, on conclut que $c+\iota$ est fonction de $k\rho^2c^2$, ρ et u. Désignons par V cette fonction, et par P la quantité $k\rho^2c^2$, les suppositions de $c+\iota$ et de u constans, donneront

$$0 = \frac{dP}{P}.P\left(\frac{dV}{dP}\right) + \frac{d\rho}{\rho}.\rho\left(\frac{dV}{d\rho}\right)$$

On aura ensuite,

$$\frac{2\,d\,\rho c}{\rho c} = \frac{dP}{P} = -\frac{d\rho}{\rho}.\frac{\rho\left(\frac{dV}{d\rho}\right)}{P\left(\frac{dV}{dP}\right)}$$

Mais nous avons désigné $\frac{d\,\rho c}{\rho c}$ par $(1-\mathcal{E}).\frac{d\rho}{\rho}$, on a donc

$$1-\mathcal{E} = -\frac{\frac{1}{2}\rho\left(\frac{dV}{d\rho}\right)}{P\left(\frac{dV}{dP}\right)}$$

La vitesse du son, que nous avons trouvée égale à $\sqrt{4h\varepsilon.(1-\mathcal{E})}$, devient ainsi

$$\left\{\frac{-2h\varepsilon\,\rho\left(\frac{dV}{d\rho}\right)}{P\left(\frac{dV}{dP}\right)}\right\}^{\frac{1}{2}}$$

Il est facile de s'assurer que la fraction $\frac{-\rho\left(\frac{dV}{d\rho}\right)}{P\left(\frac{dV}{dP}\right)}$ est le rapport de la cha-

leur spécifique de l'air, lorsqu'il est soumis à une pression constante, à sa chaleur spécifique, lorsque son volume est constant En effet, en élevant d'un degré la température u, d'une masse d'air soumise à une pression constante, on augmente sa chaleur absolue $c+\iota$, de la quantité

$$-\mu\rho.\left(\frac{dV}{d\rho}\right),$$

$\mu\rho$ étant la diminution de densité que cet accroissement de température produit dans la masse d'air, et μ étant un coefficient qui, suivant les expériences de M Gay-Lussac, est 0,00375 à la température de la glace fondante Si l'on suppose le volume de la masse, constant; la chaleur nécessaire pour accroître d'un degré sa température, sera

$$\mu P.\left(\frac{dV}{dP}\right)$$

Ces deux quantités de chaleur sont ce que l'on nomme *chaleurs spécifiques* dont le rapport est ainsi

$$\frac{-\rho\left(\frac{dV}{d\rho}\right)}{P\left(\frac{dV}{dP}\right)}.$$

De là, il suit que l'on aura la vitesse du son, en multipliant la formule Newtonienne par la racine carrée du rapport de ces chaleurs spécifiques, ce qui est le théorème que j'ai donné sans démonstration, dans les Annales de Physique et de Chimie de l'année 1816

Pour comparer ce résultat à l'expérience, je vais faire usage d'une expérience très intéressante de MM. Desormes et Clément, que ces savans physiciens ont consignée dans le Journal de Physique du mois de novembre 1819. Ils ont rempli d'air atmosphérique, un ballon de verre, dont la capacité était de $28^{litres},70$. La pression de l'air, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, était alors représentée par une hauteur du baromètre, égale à $766^{mil},5$ La température était 12°,5 cette température et la hauteur du baromètre extérieur, ont été constantes pendant la durée de l'expérience, condition indispensable Ils ont ensuite extrait du ballon, une petite quantité d'air, et ils l'ont fermé au moyen d'un robinet Après le temps nécessaire pour que la température intérieure fût redevenue la même que l'extérieure, ils ont observé la différence de pression du dedans au-dehors, au moyen d'un manomètre adapté

au ballon, et ils ont trouvé la pression intérieure moindre que l'extérieure, de $13^{mil},81$ En ouvrant ensuite le robinet, l'air extérieur est entré dans le ballon lorsqu'il a cessé de s'y introduire, ce qu'ils ont jugé, soit par la cessation du bruit que l'air faisait en y entrant, soit par le manomètre qui était revenu au niveau, ils ont promptement fermé le robinet, en sorte que l'intervalle entre son ouverture et sa fermeture, n'a pas été $\frac{2}{5}$ de seconde Le manomètre ensuite a remonté, et lorsqu'il a été stationnaire, ou lorsque la température intérieure est redevenue la même que l'extérieure, il a indiqué une pression intérieure plus petite que l'extérieure, de $3^{mil},611$ Cette expérience, la meilleure de soixante expériences de ce genre qu'ils ont faites, en est le résultat moyen. On peut voir dans le Journal cité, une description plus étendue de l'appareil et des précautions qui ont été prises

Dans cette expérience, la chaleur absolue $c+\iota$, de chaque molécule d'air intérieur, et la température u de l'espace, peuvent être supposées sensiblement constantes comme dans le son, pendant la courte durée de l'ouverture du robinet Mais en désignant par P' la pression intérieure, immédiatement avant l'ouverture du robinet, l'air intérieur pendant l'ouverture du robinet, a passé de cette pression à la pression P de l'atmosphère, puisqu'au moment de la fermeture du robinet, il faisait équilibre à cette dernière pression En nommant ensuite ρ la densité de l'air atmosphérique, ρ' celle de la masse de l'air intérieur, immédiatement avant l'ouverture du robinet, et ρ'' la densité de cette masse, au moment de la fermeture du robinet, les suppositions de $c+\iota$ et de u constans, donneront

$$0 = \left(\frac{P-P'}{P'}\right).P' \left(\frac{dV'}{dP'}\right) + \left(\frac{\rho''-\rho'}{\rho'}\right) \rho' \left(\frac{dV'}{dP'}\right),$$

V', P', ρ' étant ce que deviennent pour l'air du ballon avant l'ouverture du robinet, les quantités V, P, ρ relatives à l'air atmosphérique Il est facile de voir que la densité ρ'' est à très peu près celle de l'air intérieur à la fin de l'expérience, à cause de la très petite quantité d'air introduite dans le ballon, pendant l'ouverture du robinet Cette densité est donc proportionnelle à la pression intérieure à la fin de l'expérience, pression que nous désignerons par P'', ce qui donne

$$\frac{\rho''-\rho'}{\rho'} = \frac{P''-P'}{P'},$$

on a donc

$$\frac{-\rho'\left(\frac{dV'}{d\rho'}\right)}{P'.\left(\frac{dV'}{dP'}\right)} = \frac{P - P'}{P'' - P'}.$$

Ainsi, la température de l'atmosphère étant supposée de douze degrés et demi centigrades, et sa pression étant P', ou $752^{mil},69$, la vitesse du son sera, d'après cette expérience,

$$\sqrt{2h\varepsilon\,\frac{13^{mil},81}{10^{mil},199}},$$

parce que l'on a

$$P - P' = 13^{mil},81,$$
$$P - P'' = 3^{mil},611$$

Le rapport des deux chaleurs spécifiques de l'air est donc, suivant cette expérience, égal à 1,354, lorsque la hauteur du baromètre est $752^{mil},69$, et lorsque sa température est 12°,5

Les expériences sur l'air, donnent à cette température, $\sqrt{2h\varepsilon}$, égal à $286^{m},1$, d'où résulte la vitesse du son égale à $332^{m},9$ Les académiciens français l'ont observée de $337^{m},2$, à la température de 7°,5. Il faut l'augmenter de $3^{m},2$ pour la faire correspondre à une température de 12°,5, ce qui donne $340^{m},4$, résultat qui ne surpasse celui de la théorie, que de $7^{m},5$

MM Gay-Lussac et Welter ont bien voulu me communiquer une des nombreuses expériences qu'ils ont faites sur cet objet, par un moyen qui paraît encore plus précis, tant par la brièveté de l'intervalle pendant lequel l'air intérieur communique avec l'air extérieur, intervalle qui n'est pas d'un sixième de seconde, que par les précautions prises pour s'assurer que le manomètre indique à la fin de cet intervalle la même pression à l'intérieur qu'au dehors Au lieu de raréfier l'air intérieur comme MM Clément et Desormes l'avaient fait, ils le compriment de manière qu'avant la communication avec l'atmosphère, la pression intérieure surpasse l'extérieure Dans l'expérience citée, cet excès était de $16^{mil},3644$. Après cette communication, et lorsque l'air intérieur eut repris la température extérieure, la pression intérieure ne surpassait plus celle de l'atmosphère, que de $4^{mil},4409$. Cette dernière pression a été pen-

dant la durée de l'expérience, égale à 757^{mil}, et la température extérieure a été de 13° On a donc eu dans cette expérience,

$$P = 757^{mil}, \quad P' - P = 16^{mil},3644; \quad P'' - P = 4^{mil},4409,$$

ce qui donne

$$\frac{P - P'}{P'' - P'} = 1,37244$$

C'est le rapport des deux chaleurs spécifiques de l'air, rapport qui, par l'expérience précédente, est 1,354 On voit ainsi que les résultats des deux expériences faites à peu près à la même pression et à la même température, diffèrent peu entre elles, ce qui en prouve la justesse La vitesse du son, conclue de l'expérience de MM Gay-Lussac et Welther, est $335^m,2$ Elle rapproche la théorie, de $2^m,3$, du résultat de l'observation D'autres expériences des mêmes savans, donnent un résultat encore plus rapproché de celui de l'observation Mais ces expériences ont été faites sur de l'air desséché, ce qui peut produire une légère différence entre ces résultats D'ailleurs, l'observation des académiciens français, consignée dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de l'année 1738, doit être répétée avec plus de soin, et en y employant toutes les precautions suggérées par les progrès de la Physique

Cette considération me fit proposer au Bureau des Longitudes, la répétition de cette expérience Elle donne $340^m,889$, à la température de 15°,9 centésimaux la hauteur du baromètre était 755,6 Pour comparer à cette expérience, ma formule de la vitesse du son, j'ai conclu la valeur de h, des expériences de MM Biot et Arago, sur le rapport de la densité de l'air à celle du mercure J'ai déduit la valeur de ε, de l'expérience du pendule par Borda, et l'ensemble des nombreuses expériences de MM Gay-Lussac et Welter, m'a donné 1,3748 pour le rapport des deux chaleurs spécifiques de l'air J'ai trouvé ainsi $337^m,144$ pour la vitesse du son à 15°,9 de température On doit faire à ce résultat, une petite correction dépendante de l'état hygrométrique de l'air Toutes les expériences de MM Biot, Arago, Gay-Lussac et Welter, ont été faites sur un air privé d'humidité La vapeur aqueuse répandue dans l'air atmosphérique étant plus légère que ce fluide, il doit en résulter dans la vitesse du son, un effet analogue à celui de la chaleur Dans la nouvelle expérience, les hygromètres à cheveu indiquaient 72° En partant des expériences

de M Gay-Lussac, sur cet hygromètre, et sur la densité de la vapeur aqueuse, je trouve $0^m,571$ pour l'effet hygrométrique de l'air en l'ajoutant à la vitesse précédente, on aura $337^m,715$, ce qui ne diffère du résultat $340^m,889$, que de $3^m,174$. Cette différence me paraît être dans les limites des petites erreurs dont la nouvelle expérience et les élémens du calcul dont j'ai fait usage, sont encore susceptibles.

Les Savans français et espagnols envoyés au Pérou pour mesurer un degré du méridien, ont fait à Quito, l'observation de la vitesse du son, qu'ils ont trouvée la même à fort peu près que l'on avait observée à Paris, quoiqu'il y ait une grande différence entre les pressions de l'atmosphère dans ces deux villes, la hauteur moyenne du baromètre n'étant à Quito que de 544^{mil} Cette observation fournit le moyen de vérifier le théorème que j'ai donné pour corriger la formule Newtonienne sur la vitesse du son La vérité de ce théorème exige que C désignant la chaleur spécifique de l'air, lorsque la pression est constante, et C_1 désignant cette chaleur spécifique, lorsque le volume est constant, le rapport $\frac{C}{C_1}$ soit à peu près le même, sous les deux pressions barométriques $544^{mil.}$ et 760^{mil} c'est en effet ce que MM Gay-Lussac et Welter ont trouvé par l'expérience

La fonction V est inconnue, et l'avantage des expériences précédentes, est de donner le rapport des deux chaleurs spécifiques de l'air, sans faire aucune supposition sur cette fonction Il serait cependant bien intéressant de la connaître pour la théorie des phénomènes de pression et de chaleur de l'air atmosphérique Pour y parvenir, j'observe que depuis la pression représentée par $144^{mil.}$ jusqu'à la pression 1460^{mil}, et depuis la température $-20°$ jusqu'à la température $40°$, intervalles dans lesquels MM Gay-Lussac et Welter ont étendu jusqu'ici leurs expériences, les résultats de ces expériences comparées à mon analyse donnent $\frac{C}{C_1}$ constant et à très peu près égal à 1,3748 En supposant cette quantité rigoureusement constante, on a

$$-\rho \cdot \left(\frac{dV}{d\rho}\right) = \frac{C}{C_1} \cdot P \cdot \left(\frac{dV}{dP}\right),$$

d'où l'on tire en intégrant

$$V = \psi\left(\frac{P}{\rho}^{\frac{C_1}{C}}\right)$$

ψ étant ici le signe d'une fonction arbitraire La valeur la plus simple de V, comprise dans cette équation, est

$$V = F + H.\frac{P}{\rho}^{\frac{C_1}{C}},$$

F et H étant des constantes. En y substituant au lieu de ρ sa valeur donnée par l'équation

$$P = q\rho v;$$

v étant la température, on aura

$$V = F + Hqv.P^{\frac{C_1}{C}-1}$$

Dans cette supposition, la chaleur absolue d'une molécule d'air croît sous une pression constante, comme la température v, ce qui est conforme aux phénomènes

Cette expression de V satisfait à la vitesse du son et aux expériences de MM Gay-Lussac et Welter Voyons comment elle représente les expériences sur la chaleur que l'air abandonne en passant d'une température élevée v' à une température inférieure v, sous une pression déterminée P La chaleur abandonnée par une molécule d'air sera, d'après l'expression précédente de V,

$$Hq.(v'-v)\ P^{\frac{C_1}{C}-1},$$

et la chaleur abandonnée par un volume d'air à cette pression, sera proportionnelle à cette quantité multipliée par P, parce qu'il y a d'autant plus de molécules d'air dans ce volume, que P est plus considérable En prenant donc pour unité, cette chaleur abandonnée, celle qu'abandonnera un égal volume d'air dans les mêmes circonstances, mais sous la pression P', sera

$$\left(\frac{P'}{P}\right)^{\frac{C_1}{C}}$$

MM Laroche et Bérard ont consigné deux expériences de ce genre, dans leur Mémoire sur la chaleur spécifique des gaz. Dans ces expériences P' était égal à $1005^{mil.},8$ et P était égal à $740^{mil},5$ Ils ont trouvé dans une première expérience, 1,2127 pour le rapport des chaleurs

abandonnées, et 1,2665, dans une seconde expérience La fraction précédente, en y substituant 1,3748 pour $\frac{C}{C_1}$, donne 1,249, ce qui tient à peu près le milieu entre les résultats des deux expériences

Les suppositions de V et u constans, donnent

$$0 = C_1 . \frac{dP}{P} - C . \frac{d\rho}{\rho}.$$

Ainsi P étant $k . \rho^2 e^2$, on aura

$$\frac{dc}{c} = -\frac{d\rho}{\rho} . \left(1 - \frac{C}{2C_1}\right) = -dl$$

Tant que $\frac{C}{C_1}$ sera plus petit que 2, la compression qui fait nécessairement croître la densité ρ, diminuera la chaleur libre c de la molécule aérienne, et augmentera sa chaleur latente l

Si l'on nomme R le rayonnement de la molécule, on aura R proportionnel à $\frac{P}{\rho}$, on aura donc

$$\frac{dR}{R} = \left(\frac{C}{C_1} - 1\right) . \frac{d\rho}{\rho},$$

La compression augmentera donc le rayonnement de la molécule, tant que $\frac{C}{C_1}$ surpassera l'unité elle le diminuera dans le cas contraire Dans le premier cas, il y aura augmentation de température par la compression, et production du froid par la dilatation, dans le second cas, il y aura production de froid par la compression, et augmentation de température par la dilatation

La théorie Newtonienne sur le son, est fondée sur les deux équations suivantes

$$\left(\frac{ddx}{dt^2}\right) = -\frac{dP}{\rho dX},$$

$$P = q\rho u,$$

u étant la température, et P étant la pression La première de ces équations est inexacte, parce que l'air n'agit point sur une couche

aérienne d'une épaisseur infiniment petite, par une simple différence de pression, comme il agirait sur un plan d'une épaisseur sensible De plus, la seconde équation n'est vraie que dans l'état d'équilibre de l'air Cependant il est remarquable que ces équations soient exactes, pourvu que P, au lieu d'exprimer la pression, comme dans l'état d'équilibre, exprime la quantité $k\rho^2c^2$, qui ne représente la pression, que dans l'état d'équilibre cela donne

$$\left(\frac{ddx}{dt^2}\right) = -\frac{2P}{\rho}\cdot\frac{d\,\rho c}{\rho c\;\;dX} = -\frac{2P}{\rho}\cdot(1-\mathcal{E})\cdot\frac{d\rho}{\rho\,dX},$$

d'où l'on tire en substituant pour $\frac{d\rho}{\rho}$ sa valeur ;

$$\left(\frac{ddx}{dt^2}\right) = \frac{2P}{(\rho)}\cdot(1-\mathcal{E})\left(\frac{ddx}{dX^2}\right),$$

équation identique avec celle qui résulte de notre analyse

Equations générales du mouvement des fluides élastiques

8 On peut déduire de cette analyse, les équations générales du mouvement des fluides élastiques Si l'on considère une molécule A du fluide, son calorique c sera repoussé par le calorique c_1 des molécules qui forment l'élément $dx\,dy\,dz$ du même fluide En nommant f la distance de cet élément à la molécule A, ρ' la densité du même élément, et représentant par $H.\varphi(f)$ la loi de répulsion du calorique, l'action répulsive du calorique de l'élément sur le calorique de la molécule A, sera

$$H.\varphi(f).\rho_1c_1c.dx\,dy\,dz.$$

En la multipliant par la variation δf de sa direction, le produit sera

$$H.\varphi(f).\rho_1c_1c.\delta f.dx\,dy\,dz$$

Soient X, Y, Z les trois coordonnées orthogonales de la molécule A, et x, y, z, celles de l'élément, on aura

$$f = \sqrt{(x-X)^2+(y-Y)^2+(z-Z)^2},$$

ce qui donne

$$\delta f = -\frac{[(x-X)\,\delta X+(y-Y)\delta y+(z-Z)\delta Z]}{f}.$$

L'action entière répulsive du calorique du gaz sur le calorique de la molécule A, multipliée par l'élément de sa direction, sera ainsi,

$$-Hc\iiint \rho_1 c_1 . \frac{\varphi(f)}{f} \left[(x-X)\,\delta X+(y-Y)\,\delta Y+(z-Z)\,\delta Z\right] dxdydz,$$

la triple intégrale étant prise depuis les valeurs infinies négatives de x, y, z, jusqu'à leurs valeurs infinies positives. On a ensuite

$$\rho_1 c_1 = \rho c + (x-X).\left(\frac{d\,\rho c}{dX}\right) + (y-Y).\left(\frac{d\,\rho c}{dY}\right) + (z-Z).\left(\frac{d\,\rho c}{dZ}\right) + \text{etc.},$$

ρ étant la densité du fluide, correspondante aux coordonnées X, Y et Z. Soit

$$x-X=x';\quad y-Y=y',\quad z-Z=z',$$

la fonction précédente deviendra

$$-Hc.\iiint\left[\rho c + x'.\left(\frac{d\,\rho c}{dX}\right) + y'.\left(\frac{d.\,\rho c}{dY}\right) + z'.\left(\frac{d.\,\rho c}{dZ}\right)\right].\frac{\varphi(f)}{f}.$$
$$(x'\delta X + y'\delta Y + z'\delta Z).dx'dy'dz'$$

Par la nature de la fonction $\varphi(f)$, on a entre les limites infinies positives et négatives,

$$\iiint x'.\frac{\varphi(f)}{f}.dx'dy'dz' = 0;$$
$$\iiint y'.\frac{\varphi(f)}{f}.dx'dy'dz' = 0;$$
$$\iiint z'.\frac{\varphi(f)}{f}.dx'dy'dz' = 0;$$
$$\iiint x'y'\,\frac{\varphi(f)}{f}.dx'dy'dz' = 0;$$

etc ;

$$\iiint x'^2.\frac{\varphi(f)}{f}.dx'dy'dz' = \iiint y'^2.\frac{\varphi(f)}{f}.dx'dy'dz'$$
$$= \iiint z'^2.\frac{\varphi(f)}{f}.dx'dy'dz';$$

ainsi la fonction précédente devient

$$-Hc.\iiint.\left[\left(\frac{d\,\rho c}{dX}\right).\delta X + \left(\frac{d\,\rho c}{dY}\right).\delta Y\right.$$
$$\left. + \left(\frac{d.\,\rho c}{dZ}\right).\delta Z\right].x'^2.\frac{\varphi(f)}{f}.dx'dy'dz',$$

Concevons un plan perpendiculaire à l'axe des X, à la distance $X+x'$, menons du point d'intersection de ce plan avec l'axe des X, une droite à la molécule dont les coordonnées sont $X+x'$, $Y+y'$, $Z+z'$. Soit s cette droite, et ϖ l'angle qu'elle forme avec le plan des X et des Y On pourra substituer à l'élément $dx'.\ dy'\ dz'$, l'élément $dx'.\ sdsd\varpi$ L'intégrale relative ϖ, doit être prise depuis ϖ nul, jusqu'à ϖ égal à la circonférence 2π L'intégrale relative à s, doit être prise depuis s nul jusqu'à s infini; et l'intégrale relative à x', doit être prise depuis x', égal à moins infini jusqu'à x' égal à plus infini De là on tirera par ce qui précède,

$$\int\!\!\int\!\!\int x'^2 dx'\ dy'.\ dz'.\ \frac{\varphi(f)}{f} = 4\pi K$$

Ainsi en faisant

$$P = 2\pi HK.\rho^2 c^2,$$

la fonction précédente ou la somme des produits des forces répulsives du calorique des molécules du gaz sur le calorique de la molécule A par les élémens de leurs directions, sera

$$-\frac{\delta P}{\rho}.$$

Soient R, S, T, les autres forces qui sollicitent cette molécule, parallèlement aux axes des X, des Y et des Z, la somme des produits de ces forces, par les élémens de leurs directions, sera

$$R.\delta X + S.\delta Y + T.\delta Z$$

Enfin, les produits des mouvemens détruits, par les élémens de leurs directions, seront

$$-\left(\frac{ddX}{dt^2}\right).\delta X - \left(\frac{ddY}{dt^2}\right).\delta Y - \left(\frac{ddZ}{dt^2}\right).\delta Z,$$

on aura donc par le principe des vitesses virtuelles,

$$0 = -\delta P + \rho R.\delta X + \rho S.\delta Y + \rho T.\delta Z \qquad (L)$$
$$-\rho.\left(\frac{ddX}{dt^2}\right).\delta X - \rho.\left(\frac{ddY}{dt^2}\right).\delta Y - \rho.\left(\frac{ddZ}{dt^2}\right).\delta Z$$

Il faut joindre à cette équation, celle du rayonnement de la molécule, et qui est, en représentant $2\pi HK$ par k,

$$k.\rho c^2 = q.v$$

Il faut y joindre encore l'équation (K) du n° 33 du premier Livre, équation qui est relative à la continuité du fluide On aura ainsi les équations générales du mouvement des fluides élastiques

Du mélange de plusieurs gaz

9 Si plusieurs gaz soumis à la pression P et à la température u, sont mêlés ensemble dans un espace tel qu'ils conservent la même pression et la même température, alors en nommant v, v', etc , les volumes respectifs de ces gaz avant le mélange, et U le volume total après le mélange, on aura, comme il est facile de le démontrer par ce qui précède,

$$U = v + v' + \text{etc}$$

Les divers gaz finiront par se mêler entre eux, de manière que la plus petite partie du mélange renferme dans la même proportion les molécules des divers gaz Dans cet état, la chaleur libre c d'une molécule A sera la même qu'avant le mélange En effet, les équations (A) du n° 5 donnent avant comme après le mélange,

$$c.\sqrt{Pk} = qu$$

La chaleur absolue $c + \iota$ de la molécule A reste encore la même Car la molécule A étant soumise dans le mélange, à la même pression et à la même température qu'avant le mélange, et sa chaleur libre c étant la même, sa chaleur absolue $c + \iota$, qui ne peut dépendre que de ces trois choses, doit rester la même

La chaleur spécifique du mélange sous une pression constante, ou sous un volume constant, est visiblement, ρ, ρ', etc , étant ici les nombres de grammes de chaque gaz,

$$\frac{\rho \dfrac{d\,(c+\iota)}{du} + \rho' \dfrac{d\,(c'+\iota')}{du} + \text{etc}}{\rho + \rho' + \text{etc.}}$$

On peut donc facilement la conclure des expériences sur la chaleur spécifique de chacun des gaz

Considérons présentement les mouvemens des molécules du mélange Il est facile de conclure de l'analyse précédente, que si l'on fait

$$P = 2\pi \text{ HK } (\rho c + \rho' c' + \text{etc})^2,$$

la somme des produits des actions répulsives du calorique des molécules du mélange, sur le calorique c d'une molécule A du premier gaz, par les élémens de leurs directions, sera

$$-c \cdot \frac{\sqrt{2\pi \text{ HK}}}{\sqrt{P}} \cdot \delta P,$$

l'équation du mouvement de la molécule A sera donc

$$0 = -c \cdot \frac{\sqrt{2\pi \text{ HK}}}{\sqrt{P}} \cdot \delta P + R\delta X + S \cdot \delta Y + T \cdot \delta Z$$
$$- \left(\frac{ddX}{dt^2}\right) \cdot \delta X - \left(\frac{ddY}{dt^2}\right) \cdot \delta Y - \left(\frac{ddZ}{dt^2}\right) \delta Z$$

Pour une molécule A′ du second gaz, infiniment voisine de A, l'équation du mouvement sera

$$0 = -c' \cdot \frac{\sqrt{2\pi \text{ HK}}}{\sqrt{P}} \cdot \delta P + R' \cdot \delta' X' + S' \cdot \delta Y' + T' \cdot \delta Z'$$
$$- \left(\frac{ddX'}{dt^2}\right) \cdot \delta X' - \left(\frac{ddY'}{dt^2}\right) \cdot \delta Y' - \left(\frac{ddZ'}{dt^2}\right) \cdot \delta Z',$$

et ainsi de suite Toutes ces équations sont différentes, si c, c', etc, sont différens Relativement aux gaz azote et oxigène, élémens de notre atmosphère, c et c' sont peu différens. Les molécules des divers gaz se sépareraient dans l'état de mouvement, si elles n'étaient pas retenues par des forces incomparablement plus puissantes que les forces qui accélèrent leurs mouvemens Dans les corps solides, ces forces sont les attractions mutuelles de leurs molécules, qui font qu'elles s'entraînent réciproquement Dans les gaz, ces forces sont celles qui dépendent des premières puissances de x', y', z', dans l'analyse précédente, et qui se détruisent mutuellement dans l'état d'équilibre et d'un mélange complet des divers gaz Ces forces, par la nature de la fonction $\varphi(f)$,

sont incomparablement plus grandes que les forces accélératrices du mouvement, et qui dépendent des carrés de x', y', z' Elles renaîtraient pour peu que les molécules des divers gaz se séparassent, et par là, elles s'opposent à leur séparation, comme elles établissent l'équilibre stable du mélange, en répandant les molecules des divers gaz suivant la même proportion dans toutes les parties de ce mélange On peut donc, dans l'état de mouvement, considérer comme molécule du melange, un groupe infiniment petit des molécules des divers gaz, dans lequel ces molécules sont en même proportion que dans le mélange total, et l'on peut supposer les molécules de chaque groupe, liées fixement entre elles C'est aux forces dont je viens de parler, qu'est due l'équation de continuité dans le mouvement des fluides

Déterminons d'après ce qui précède, la vitesse du son dans un mélange de plusieurs gaz, et pour simplifier les calculs, ne considérons que deux gaz Soient ρ et ρ', les nombres de grammes de chaque gaz contenu dans un litre du mélange, sous la pression P et à la température u Soient, à la même pression et à la même température, (ρ) et (ρ'), les nombres de grammes de chaque gaz renfermé séparément dans un litre pris pour unité d'espace Désignons encore par C et C_1 les deux chaleurs spécifiques du premier gaz, et par C', C'_1 les mêmes quantités pour le second gaz Ces deux chaleurs relatives au mélange seront

$$\frac{\rho C + \rho' C'}{\rho + \rho'}, \quad \frac{\rho C_1 + \rho' C'_1}{\rho + \rho'}$$

Ainsi l'expression de la vitesse du son dans une atmosphère formée de ce mélange, sera

$$\sqrt{\frac{P}{\rho + \rho'} \cdot \frac{\rho C + \rho' C'}{\rho C_1 + \rho' C'_1}}$$

L'excès du carré de cette vitesse, sur le carré de la vitesse du son dans le premier gaz, sera donc

$$\frac{P}{\rho + \rho'} \cdot \frac{\rho C + \rho' C'}{\rho C_1 + \rho' C'_1} - \frac{P}{(\rho)} \cdot \frac{C}{C_1},$$

on a ensuite, comme il est facile de le voir,

$$\frac{\rho}{(\rho)} + \frac{\rho'}{(\rho')} = 1.$$

On conclut de là ce singulier paradoxe, savoir, que dans le mélange de deux gaz, la vitesse du son peut n'être pas intermédiaire entre les deux vitesses du son dans chaque gaz elle peut surpasser la plus grande, ou être inferieure à la plus petite En supposant égales, les vitesses du son dans chacun de ces gaz, ce qui donne

$$\frac{C}{(\rho)C_1} = \frac{C'}{(\rho')C'_1};$$

on trouve l'excès du carré de la vitesse du son dans le mélange, sur le carré de la vitesse du son dans chaque gaz, égal à

$$\frac{P\ \rho.\rho'\ [(\rho') - (\rho)]\ (C' - C)}{(\rho)\ (\rho')\ (\rho + \rho')\ (\rho C_1 + \rho' C'_1)};$$

ainsi dans ce cas, la vitesse du son dans le mélange surpassera cette vitesse dans chaque gaz, ou lui sera inférieure, suivant que $[(\rho') - (\rho)].(C' - C)$ sera positif ou négatif.

Des atmosphères.

10. Les fluides élastiques ne peuvent exister qu'autant qu'ils sont contenus par une cause extérieure qui les empêche de se dissiper, telle que les parois d'un espace limité, ou par une force intérieure, telle que l'attraction d'un grand corps qu'ils environnent : c'est le cas des atmosphères de la Terre et des corps célestes. Je vais considérer ici spécialement l'atmosphère terrestre

Imaginons un tuyau conique très étroit dont le sommet soit au centre de la Terre, et qui s'élève jusqu'aux limites de l'atmosphère. Représentons par R le rayon terrestre, et par s la hauteur au-dessus de la surface de la Terre, d'une molécule aérienne située sur l'axe du cône; sa pesanteur sera $\frac{g}{(R+s)^2}$, $\frac{g}{R^2}$ étant la pesanteur à la surface de la Terre Soit c la chaleur de la molécule, u la température de l'espace ou de la partie du tuyau qui correspond à cette molécule, on aura

$$k\rho c^2 = qu;$$

ensuite, on aura par ce qui précède, dans l'état d'équilibre,

$$0 = -\frac{\delta P}{\rho} - \frac{g}{(R+s)^2}.\delta s.$$

On peut ici changer δ en d, parce que l'on ne doit considérer que la seule coordonnée s; et alors on a

$$dP = -\frac{g\rho ds}{(R+s)^2};$$

P est égal à $k\rho^2c^2$; et dans l'état d'équilibre, il exprime la pression On a donc

$$P = q\rho u;$$

ce qui donne

$$dP = -\frac{gPds}{qu.(R+s)^2};$$

d'où l'on tire en intégrant

$$P = (P).c^{-\int\frac{gds}{qu\,(R+s)^2}},$$

$$\rho = \frac{(\rho)\,(u)}{u}.c^{-\int\frac{gds}{qu.(R+s)^2}},$$

(P), (ρ), (u) étant ce que deviennent P, ρ, et u, à la surface de la Terre, et c étant ici le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité Ces deux équations servent de fondement aux théories du baromètre et des réfractions.

Pour déterminer la vitesse du son, dans le sens vertical; j'observe que si l'on suppose l'air renfermé dans un tube vertical cylindrique, ce qui ne change point l'expression de la vitesse, comme il est facile de s'en assurer, et si l'on fait $s = S + s'$, S étant la hauteur initiale de la molécule, on aura par ce qui précède,

$$\left(\frac{dds'}{dt^2}\right) = -\frac{2P}{\rho}.(1-\mathcal{C}).\frac{d\rho}{\rho ds} - \frac{g}{(R+S+s')^2}$$

Si l'on développe cette équation, les termes indépendans de s' se détruisent par les conditions de l'équilibre; et l'on trouvera pour l'expression fort approchée de la vitesse du son,

$$\sqrt{\frac{(P)u}{(\rho)(u)}\cdot\frac{C}{C_1}},$$

C étant la chaleur spécifique de l'air, sous une pression quelconque P, et correspondante à la température u. C_1 est sa chaleur spécifique sous un volume constant, à la pression P et à la température u. Cette ex-

pression est une fonction de S, en la désignant par M, on aura, à très peu près, pour le temps t que le son emploie à s'élever à la hauteur S,

$$t = \int \frac{dS}{M}$$

Dans le système des ondes lumineuses, il faut considérer chaque molécule de lumière, comme un point répulsif dont la répulsion ne s'exerce sensiblement qu'à des distances insensibles Ici, la considération de la température devient inutile, et c doit être supposé constant on peut le prendre pour la molécule même, au lieu que dans les gaz, la chaleur qu'il représente est distincte de la molécule, et varie avec la température, ce qui distingue essentiellement le fluide lumineux, des gaz qui nous sont connus On a, dans le cas de l'équilibre,

$$dP = -\frac{g\rho ds}{(R+s)^2},$$

$$P = k\rho^2 c^2,$$

$$2kc^2 d\rho = -\frac{g ds}{(R+s)^2},$$

et en intégrant

$$\rho = \frac{g}{2kc^2\,(R+s)} + (\rho),$$

(ρ) étant la valeur de ρ, lorsque s est infini

Si l'on conçoit maintenant que le corps dont le fluide est l'atmosphère, le fasse vibrer, pour produire la lumière, on trouvera par l'analyse exposée ci-dessus, que la vitesse de la lumière est à fort peu près dans le sens vertical, $\sqrt{2k\rho c^2}$, ou

$$\sqrt{2k(\rho)c^2 + \frac{g}{R+s}}$$

En supposant donc qu'ainsi que dans les atmosphères de la Terre et des astres, (ρ) soit nul, la vitesse de la lumière sera $\sqrt{\frac{g}{R+s}}$ elle sera nulle à une distance infinie; et à la surface elle sera $\sqrt{\frac{g}{R}}$

A la surface du Soleil, cette vitesse n'est pas la sept-centième partie de celle de la lumière, telle qu'on l'a observée, car en nommant ε l'espace dont la pesanteur fait tomber les corps à cette surface dans la première seconde prise pour unité, on a

$$2\varepsilon = \frac{g}{R^2},$$

ce qui donne

$$\sqrt{\frac{g}{R}} = \sqrt{2\varepsilon R}$$

Cette dernière quantité est d'environ 437810 mètres, et elle n'est pas la sept-centième partie de l'espace décrit par la lumière dans une seconde Il faut donc supposer (ρ) dans l'espace, incomparablement plus grand que l'accroissement de densité du fluide, dû à la pesanteur solaire nous ne connaissons dans l'espace céleste, aucune force comprimante qui puisse donner à (ρ) cette valeur

De la vapeur aqueuse

11 Si l'on introduit un volume d'eau dans un vase vide hermétiquement fermé et placé dans un espace d'une température donnée, il s'élèvera de la surface du liquide, des vapeurs qui continueront de s'élever jusqu'à ce que leur pression arrête cet effet La pression et la densité de la vapeur parvenue à cet état d'équilibre, sont d'autant plus grandes, que la chaleur de l'espace est plus considérable On a formé par l'expérience, des tables du rapport entre la pression et la température, mais la loi rigoureuse de ce rapport n'est connue, ni *à priori*, ni par les observations. Appliquons à cette vapeur naissante, la formule suivante que nous avons donnée dans le n° 7 pour les gaz

$$V = F + Hq\, v.P^{\frac{C_1}{C}-1}.$$

Il est facile d'en conclure que si l'on désigne par V′ le nombre de grammes d'eau bouillante sous la pression barométrique $0^m,76$, dont la chaleur employée à former un gramme de sa vapeur, peut élever d'un degré la température, si l'on nomme ensuite $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}_1$ les nombres de grammes de ce liquide, dont la température peut être élevée d'un degré, par les chaleurs employées pour élever d'un degré, la température d'un gramme de

vapeurs, lorsque la pression P reste constante, et lorsque le volume est constant; enfin, si l'on nomme $(\mathcal{C})$ et (v), ce que deviennent $\mathcal{C}$ et v, lorsque P est égal à la pression barométrique $0^m,76$; on aura

$$V' = F' + \frac{(\mathcal{C})}{1^\circ} \cdot \left[v \cdot P^{\frac{\mathcal{C}_1}{\mathcal{C}} - 1} - (v) \right].$$

F' étant une constante et P exprimant ici le nombre de fois que la pression P contient la pression barométrique $0^m,76$. Il est facile de voir que $F' - 1$ est le nombre de grammes d'eau à la température de 100°, dont un gramme de vapeurs de cette température, et sous la pression $0^m,76$, réduites en liquide, élèverait d'un degré, la température Ce nombre, d'après un grand nombre d'expériences, est à peu près égal à 550; ainsi un gramme de vapeurs en se réduisant en eau à la température de 100°, élèverait d'un degré, la température d'un nombre de grammes d'eau égal à

$$551^\circ + \frac{(\mathcal{C})}{1^\circ} \cdot \left[v \cdot P^{\frac{\mathcal{C}_1}{\mathcal{C}} - 1} - (v) \right]$$

On aura par ce qui précède, les valeurs de v et de (v), en ajoutant aux températures indiquées par un thermomètre d'air, $266^\circ \frac{2}{3}$, ce qui donne

$$(v) = 366^\circ \tfrac{2}{3}.$$

Suivant quelques physiciens, le terme

$$\frac{(\mathcal{C})}{1^\circ} \cdot \left[v \cdot P^{\frac{\mathcal{C}_1}{\mathcal{C}} - 1} - (v) \right]$$

se réduit à $\frac{v - (v)}{1^\circ}$ Ce qui suppose $(\mathcal{C}) = 1$, c'est-à-dire que la chaleur spécifique de la vapeur aqueuse est égale à celle de l'eau bouillante Cela suppose encore que $\frac{\mathcal{C}_1}{\mathcal{C}}$ est égal à l'unité Mais ces deux suppositions pourraient n'être qu'approchées, et représenter les expériences de ces physiciens, dans les limites des erreurs dont ces expériences délicates sont susceptibles. D'autres physiciens ont cru trouver ce terme nul, par leurs expériences Ce terme ne peut devenir nul, qu'en supposant $(\mathcal{C})$ nul, ce qui est impossible, et ce qui paraît d'ailleurs contraire aux expériences que l'on a faites pour déterminer $(\mathcal{C})$

Considérations sur la Théorie précédente des gaz.

12. Je terminerai ces recherches par les considérations suivantes.

La théorie précédente du son est fondée sur la seule hypothèse que l'état élastique d'un gaz est dû à la force répulsive du calorique libre c, de chaque molécule du gaz ; hypothèse bien naturelle, et qui me paraît clairement indiquée par l'accroissement du ressort des gaz, lorsque leur chaleur augmente. Alors on a, comme je l'ai fait voir ci-dessus,

$$P = k\rho^2 c^2,$$

et l'on en conclut par ce qui précède,

$$\left(\frac{ddx}{dt^2}\right) = -\frac{dP}{\rho dX}.$$

Ensuite, le peu de durée d'une vibration aérienne permet de supposer insensible, la perte qu'éprouve la chaleur absolue $c+i$ de la molécule vibrante pendant la courte durée de sa vibration, durée qui n'excède pas une tierce Considérant donc cette chaleur comme une fonction V de la pression P et de la densité ρ du gaz, ce que l'on peut faire, puisque cette pression et cette densité étant déterminées, la chaleur absolue $c+i$, et la chaleur libre c, sont déterminées ; on peut supposer V constant pendant la durée de la vibration, ce qui donne

$$0 = \frac{dP}{P}.P\left(\frac{dV}{dP}\right) + \frac{d\rho}{\rho}.\rho\left(\frac{dV}{d\rho}\right);$$

d'où l'on tire l'expression précédente $\sqrt{4h\varepsilon.(1-\mathcal{E})}$ de la vitesse du son, et le théorème que j'ai publié dans les Annales de Physique et de Chimie de 1816, suivant lequel il faut, pour avoir cette vitesse, multiplier la formule Newtonienne $\sqrt{2h\varepsilon}$ par la racine carrée du rapport $\frac{C}{C_1}$, C étant la chaleur spécifique du gaz, lorsque la pression est constante, et C_1 étant sa chaleur spécifique, lorsque son volume ou sa densité sont constans.

Ayant supposé précédemment

$$\frac{d.\rho c}{\rho c} = (1-\mathcal{E}).\frac{d\rho}{\rho},$$

il en résulte

$$\frac{dc}{c} = -\mathcal{C}\,.\,\frac{d\rho}{\rho}.$$

La supposition de la chaleur absolue $c + i$ constante donne $dc = -di$, on a donc

$$di = \mathcal{C}c\,.\,\frac{d\rho}{\rho},$$

ainsi la chaleur latente ou combinée i de l'air s'accroît par la pression, du moins à la surface de la mer A cette surface, les observations sur le son donnent à peu près $\mathcal{C} = 0{,}3$ Ainsi l'existence d'une chaleur latente i, et son accroissement par la pression, sont des résultats de l'observation L'existence d'une chaleur latente i est encore indiquée par les expériences de MM. Laroche et Bérard sur la chaleur spécifique de l'air En effet, on a

$$\rho c = \sqrt{\frac{P}{k}}$$

L'équation

$$P = q\rho v$$

donne

$$\rho = \frac{P}{qv},$$

on a donc

$$c = \frac{qv}{\sqrt{Pk}}$$

Si la chaleur libre c était la chaleur absolue $c + i$, ou si la chaleur latente i était nulle, on aurait $\frac{C_1}{C}$ égal à $\frac{1}{2}$. On aurait donc, dans l'analyse que nous avons donnée sur les expériences de MM. Laroche et Bérard,

$$\left(\frac{P'}{P}\right)^{\frac{C_1}{C}} = 1{,}173,$$

et ces expériences donnent, par un milieu, le premier membre de cette équation égal à 1,24

La théorie que j'ai proposée sur la chaleur suppose le rayonnement du calorique la facilité d'expliquer par ce rayonnement les divers

phénomènes de la chaleur, l'a fait admettre par le plus grand nombre des physiciens Mais ma théorie ajoute à la supposition de ce rayonnement, celle de sa production par la force répulsive du calorique libre des molécules environnantes. C'est ce que je vais déduire des phénomènes à l'égard des gaz

La loi de Mariote donne

$$P = \rho . \varphi(u),$$

u étant la température que je représente ici par la densité du fluide discret produit par les rayonnemens des divers corps renfermés dans un espace Pour un autre gaz, on a

$$P = \rho' . \psi(u),$$

ρ' étant la densité de ce nouveau gaz Suivant la loi de M. Gay-Lussac, la pression P restant la même, le rapport de ρ' à ρ reste le même, quelle que soit la température u, le rapport de $\varphi(u)$ à $\psi(u)$ est donc constant, quel que soit u, ce qui donne

$$\varphi(u) = q . \Pi . (u),$$
$$\psi(u) = q' . \Pi . (u),$$

q et q' étant des constantes, et $\Pi(u)$ étant une fonction quelconque de u, commune à tous les gaz · alors on a

$$P = q\rho . \Pi(u) = k\rho^2 c^2$$

Désignons par R le rayonnement d'une molécule d'un gaz, ce rayonnement est égal à l'absorption du calorique discret de l'espace, par la molécule, en vertu de l'équilibre de température; et cette absorption doit être supposée proportionnelle à u; on a donc

$$R = f . u,$$

f étant une constante dépendante de la nature du gaz; donc

$$R = \sqrt{Pk} . \frac{cfu}{q\ \Pi(u)} = k\rho c . \frac{cfu}{q\ \Pi(u)}.$$

Ainsi, en considérant le rayonnement comme produit par une force

agissante sur le calorique c de la molécule proportionnellement à ce calorique, l'intensité de cette force sera proportionnelle à ρc; or ρc est par le n° 6 proportionnel à la force répulsive du calorique du gaz, la force productrice du rayonnement est donc proportionnelle à cette force répulsive. La même chose a lieu relativement au mélange de plusieurs gaz. Car ce mélange étant supposé soumis à la même pression et à la même température que le gaz dont je viens de parler, et que je suppose entrer dans ce mélange, le rayonnement d'une molécule A de ce gaz, sera le même dans ces deux cas. Lorsque le gaz est entré dans le mélange, les forces extérieures qui agissent sur la molécule, savoir, la température et la force répulsive du calorique environnant, qui est proportionnelle à $\rho c + \rho' c' +$ etc ou à $\sqrt{\frac{P}{k}}$, étant supposées les mêmes, l'état intérieur de la molécule A doit être encore le même; ainsi la chaleur libre c de la molécule, sa chaleur absolue $c + \iota$, et son rayonnement R doivent être les mêmes dans le cas où le gaz existait seul, et dans le cas où il entre dans le mélange. On a donc encore dans ce dernier cas, comme dans le premier,

$$R = \sqrt{Pk} \cdot \frac{c f u}{q \cdot \Pi(u)} = (\rho c + \rho' c' + \text{etc}) \cdot k \cdot \frac{c f u}{q\ \Pi(u)}$$

Le rayonnement est ainsi proportionnel à la force répulsive du calorique du mélange. Il est donc naturel de prendre cette force répulsive, pour la force même qui fait rayonner le calorique de la molécule. Cette force produit par son action, l'état gazeux du fluide, sa pression P, et le rayonnement R de ses molécules en détachant les parcelles du calorique qu'elles tendent à retenir par leur attraction. Si, comme il est naturel de l'admettre, ce dernier effet ne dépend comme le second, que du produit de cette force, par le calorique c contenu dans la molécule A, alors $\frac{u}{\Pi(u)}$ devient une constante. C'est, d'ailleurs, la manière la plus simple de concevoir que la fonction $\Pi(u)$ soit commune à tous les gaz, et nous l'avons adoptée. On voit ainsi que les hypothèses sur lesquelles ma théorie de la chaleur est fondée, sont toutes indiquées par les phénomènes.

FIN DU LIVRE XII.

LIVRE XIII.

DES OSCILLATIONS DES FLUIDES QUI RECOUVRENT LES PLANETES.

CHAPITRE Ier.

Notice historique des recherches des géomètres sur cet objet et spécialement sur le Flux et le Reflux de la mer.

1 Newton a donné le premier, la vraie théorie du flux et du reflux de la mer, en la rattachant à son grand principe de la pesanteur universelle. Képler avait bien reconnu la tendance des eaux de la mer vers les centres du Soleil et de la Lune, mais ignorant la loi de cette tendance, et les méthodes nécessaires pour la soumettre au calcul, il n'a pu donner sur cet objet, qu'un aperçu vraisemblable Galilée, dans ses Dialogues sur le Système du monde, exprime son étonnement et ses regrets de ce qu'un aperçu qui lui semblait ramener dans la philosophie naturelle, les qualités occultes des anciens, eût été présenté par un homme aussi pénétrant que Képler Il expliqua le flux et le reflux, par les changemens diurnes que la rotation de la Terre, combinée avec sa révolution autour du Soleil, produit dans le mouvement absolu de chaque molécule de la mer Son explication lui parut tellement incontestable, qu'il la donna comme l'une des preuves principales du système de Copernic, dont la défense lui suscita tant de persécutions Les découvertes ultérieures ont confirmé l'aperçu de Képler, et détruit l'explication de Galilée, entièrement contraire aux lois de l'équilibre et du mouvement des fluides Je n'en parle ici que pour montrer jusqu'à quel point les meilleurs esprits s'abusent quelquefois sur leurs propres conceptions

La théorie de Newton parut en 1687, dans son ouvrage des Principes

mathématiques de la Philosophie naturelle Ce grand géomètre, dans le corollaire 19 de la proposition 66 du premier livre, conçoit un canal circulaire environnant la Terre, et rempli d'un fluide qui, tournant avec elle, est attiré par un astre. Il observe que le mouvement de chaque molécule fluide doit être accéléré dans ses conjonctions et dans ses oppositions avec cet astre, et qu'il doit être retardé dans ses quadratures, en sorte que le fluide doit avoir un mouvement de flux et de reflux analogue à celui de la mer Mais il ne donne ni la loi, ni la mesure de ce mouvement. L'explication véritable de ce phénomène est renfermée dans les propositions 26 et 27 du troisième livre, où Newton détermine les forces du Soleil et de la Lune pour mouvoir les eaux de la mer Il y considère la mer, comme un fluide de même densité que la Terre qu'il recouvre totalement, et qui prend à chaque instant, la figure où il serait en équilibre sous l'action du Soleil En supposant ensuite que cette figure est celle d'un ellipsoide de révolution, dont le grand axe est dirigé vers le Soleil; il détermine le rapport des deux axes par le même procédé qui lui avait donné le rapport des axes de la Terre aplatie par la force centrifuge de son mouvement de rotation Le grand axe de l'ellipsoide aqueux étant dirigé constamment vers le Soleil, la plus grande hauteur de la mer dans chaque port, quand le Soleil est à l'équateur, doit arriver à midi et à minuit le plus grand abaissement doit avoir lieu au lever et au coucher de cet astre L'action de la Lune produit un ellipsoide semblable, mais plus alongé, parce que l'action de cet astre est plus puissante Le peu d'excentricité de ces ellipsoides permet de les concevoir superposés l'un à l'autre, en sorte que le rayon de la surface de la mer soit la somme des rayons correspondans de leurs surfaces, moins le rayon correspondant de la surface d'équilibre que la mer prendrait sans l'action des deux astres

De là naissent les principales variétés du flux et du reflux de la mer Dans les syzygies, les deux grands axes coincident, et la plus grande hauteur de la mer arrive aux instans de midi et de minuit. Le plus grand abaissement a lieu au lever et au coucher des astres Dans les quadratures, le grand axe de l'ellipsoide lunaire et le petit axe de l'ellipsoide solaire coincident La pleine mer a donc lieu au lever et au coucher des astres, et elle est le *minimum* des pleines mers la basse mer arrive aux instans de midi et de minuit, elle est le *maximum* des basses mers En exprimant donc l'action de chaque astre, par la différence des deux

demi-axes de son ellipsoïde, qui lui est évidemment proportionnelle, on voit que si le port est situé à l'équateur, l'excès de la plus haute mer syzygie sur la plus basse mer syzygie, exprimera la somme des actions lunaire et solaire; et l'excès de la plus haute mer quadrature sur la plus basse mer quadrature, exprimera la différence de ces actions. Si le port n'est pas à l'équateur, il faut multiplier ces excès par le carré du cosinus de sa latitude. On peut donc, par l'observation des hauteurs des marées syzygies et quadratures, déterminer le rapport de l'action de la Lune à celle du Soleil. Newton conclut de quelques observations faites à Bristol, que ce rapport est celui de six et un tiers à l'unité. Les distances des astres au centre de la Terre influent sur tous ces effets, l'action de chaque astre étant réciproque au cube de sa distance.

Quant à l'intervalle des pleines mers d'un jour à l'autre, Newton observe qu'il est le plus petit dans les syzygies, qu'il croît en allant d'une syzygie à la quadrature suivante; que dans le premier octant, il est égal à un jour lunaire, et qu'il est à son *maximum* dans la quadrature : qu'ensuite il diminue, qu'à l'octant suivant, il redevient égal au jour lunaire, et qu'enfin, dans la syzygie, il reprend son *minimum*. Sa valeur moyenne est le jour lunaire, en sorte qu'il y a autant de pleines mers, que de passages de la Lune au méridien supérieur et inférieur.

Tels seraient, suivant la théorie de Newton, les phénomènes des marées, si le Soleil et la Lune se mouvaient dans le plan de l'équateur. Mais l'observation a fait connaître que les plus hautes mers n'arrivent point au moment même de la syzygie, mais un jour et demi après. Newton attribue ce retard, au mouvement d'oscillation de la mer qui se conserverait encore quelque temps, si l'action des astres venait à cesser. La théorie exacte des ondulations de la mer produites par cette action, fait voir que, sans les circonstances accessoires, les plus hautes pleines mers coïncideraient avec la syzygie, et que les pleines mers les plus basses coïncideraient avec la quadrature. Ainsi leur retard sur les instans de ces phases, ne peut être attribué à la cause que Newton lui assigne : il dépend, ainsi que l'heure de la pleine mer dans chaque port, des circonstances accessoires. Cet exemple nous montre combien on doit se défier des aperçus même les plus vraisemblables, quand ils ne sont point vérifiés par une rigoureuse analyse.

Cependant la considération de deux ellipsoïdes superposés l'un à l'autre, peut encore représenter les marées, pourvu que l'on dirige le

grand axe de l'ellipsoïde solaire vers un soleil fictif, toujours également éloigné du vrai Soleil Le grand axe de l'ellipsoïde lunaire doit être pareillement dirigé vers une lune fictive, toujours également éloignée de la véritable, mais à une distance telle, que la conjonction des deux astres fictifs n'arrive qu'un jour et demi après la syzygie

Cette considération de deux ellipsoïdes, étendue au cas où les astres se meuvent dans des orbes inclinés à l'équateur, ne peut se concilier avec les observations. Si le port est situé à l'équateur, elle donne, vers le *maximum* des marées, les deux pleines mers du matin et du soir, à très peu près égales, quelle que soit la déclinaison des astres, seulement l'action de chaque astre est diminuée dans le rapport du carré du cosinus de sa déclinaison à l'unité Mais si le port a une latitude, ces pleines mers pourraient être fort différentes, et quand la déclinaison des astres est égale à l'obliquité de l'écliptique, la marée du soir à Brest serait environ huit fois plus grande que celle du matin Cependant les observations très multipliées dans ce port font voir qu'alors ces deux marées y sont presque égales, et que leur plus grande différence n'est pas un trentième de leur somme Newton attribue la petitesse de cette différence, à la même cause par laquelle il avait expliqué le retard de la plus haute mer, sur l'instant de la syzygie, savoir au mouvement d'oscillation de la mer, qui, suivant lui, reporte une grande partie de la marée du soir, sur la haute mer suivante du matin, et rend ces deux marées presque égales Mais la théorie des ondulations de la mer fait voir encore que cette explication n'est pas exacte, et que, sans les circonstances accessoires, les deux marées consécutives ne seraient égales, que dans le cas où la mer aurait partout la même profondeur

Newton, dans les éditions suivantes de son Ouvrage, n'a presque rien ajouté à sa théorie du flux et du reflux de la mer, exposée dans la première, seulement il a eu égard, dans le calcul de l'action de la Lune, au changement de la distance lunaire, produit par l'inégalité de la *variation* La plus haute mer suivant d'un jour et demi l'instant de la syzygie, il a cru que dans le calcul du *maximum* de la marée, l'action du Soleil devait être multipliée par le cosinus du double du mouvement synodique de la Lune, pendant cet intervalle Mais cette correction est fautive, parce que la marée dans un port, n'est pas le résultat de l'action immédiate des astres, mais celui de leur action antérieure d'un jour et demi On peut assimiler ces marées à celles qui, étant dues à

l'action immédiate des astres, emploieraient un jour et demi à parvenir dans le port.

En 1738, l'Académie des Sciences proposa la cause du flux et du reflux de la mer, pour le sujet du prix de Mathématiques, qu'elle décerna en 1740 Quatre pièces furent couronnées les trois premières, fondées sur le principe de la pesanteur universelle, étaient de Daniel Bernoulli, d'Euler et de Maclaurin Le jésuite Cavalleri, auteur de la quatrième, avait adopté le système des tourbillons. Ce fut le dernier honneur rendu à ce système, par l'Académie qui se remplissait alors de jeunes géomètres dont les heureux travaux devaient contribuer si puissamment aux progrès de la Mécanique céleste

Les pièces qui ont pour base, la loi de la pesanteur universelle, sont des développemens de la théorie de Newton elles s'appuient non-seulement sur cette loi, mais encore sur l'hypothèse adoptée par ce grand géomètre, savoir que la mer prend à chaque instant la figure où elle serait en équilibre sous l'astre qui l'attire. La pièce de Bernoulli est celle qui contient les développemens les plus étendus. L'auteur recherche d'abord la figure d'équilibre de la mer attirée par le Soleil, dans le cas où ce fluide recouvrirait la Terre entière supposée sphérique et formée de couches sphériques dont la densité varie du centre à la surface, suivant une loi quelconque. Il conçoit deux canaux communiquant ensemble au centre de la Terre, le premier étant dirigé vers le Soleil, et le second étant perpendiculaire au premier Ces deux canaux sont remplis des parties des couches terrestres et de la mer qu'ils traversent; il suppose toutes ces parties fluides dans l'intérieur des canaux, et il détermine l'alongement de la colonne dirigée vers le Soleil, pour qu'elle soit en équilibre avec l'autre colonne. La loi de densité des couches du sphéroide terrestre, peut être coordonnée de manière que la formule à laquelle on parvient ainsi, donne un alongement propre à satisfaire aux hauteurs observées des marées, pour lesquelles Bernoulli juge que la formule de Newton donne des résultats trop faibles. En appliquant à l'atmosphère, la formule de Bernoulli, on trouve que dans l'intervalle de la haute mer à la basse mer suivante, la hauteur du baromètre varierait d'environ cent cinquante millimètres vers les syzygies; et cependant les observations n'indiquent alors aucune variation sensible dans le baromètre; ce que Bernoulli attribue au ressort de l'air, qui, suivant lui, rétablit très promptement l'équilibre de l'atmosphère. Un rétablissement

aussi prompt, dans une masse fluide aussi étendue, est trop contraire aux principes du mouvement des fluides, pour être admis, mais d'Alembert, dans ses recherches sur la cause des vents, a remarqué le vice de la formule de Bernoulli, en ce que le globe terrestre étant solide, on ne doit point étendre jusqu'à son centre, l'équilibre des canaux, qui n'a lieu que pour les canaux extérieurs à ce globe Cette formule n'est exacte que dans le cas où la densité de la mer est égale à la densité moyenne de la Terre, et alors, elle donne le résultat de la formule de Newton.

Bernoulli détermine les hauteurs et les heures des marées, en supposant d'abord le Soleil et la Lune mus dans le plan de l'équateur Il donne les expressions de ces quantités, en ayant égard aux variations de la distance de la Lune à la Terre, et il réduit ces expressions en tables. Il conclut le rapport des actions du Soleil et de la Lune sur la mer, des retards journaliers des marées, retards qui sont à leur *minimum* dans les syzygies, et à leur *maximum* dans les quadratures Ce moyen d'obtenir ce rapport, lui semble préférable à la considération du *maximum* et du *minimum* des hauteurs, employée par Newton Cependant l'observation des hauteurs des pleines mers étant plus facile et plus sûre que celle des heures de leur arrivée, elle doit donner une valeur plus précise de ce rapport, pourvu qu'on ait égard à toutes les causes qui peuvent la modifier Par cette raison, j'ai préféré pour cet objet la considération des hauteurs des marées. Quant au retard des *maxima* et des *minima* des marées, sur les instans des syzygies et des quadratures, Bernoulli l'attribue, comme Newton, à l'inertie des eaux de la mer, et peut-être, ajoute-t-il, une partie de ce retard dépend du temps que l'action de la Lune emploie à parvenir à la Terre. Mais j'ai reconnu que l'attraction universelle se transmet entre les corps célestes avec une vitesse qui, si elle n'est pas infinie, surpasse plusieurs millions de fois la vitesse de la lumière; et l'on sait que la lumière de la Lune parvient en moins de deux secondes, à la Terre

Bernoulli considère ensuite le cas de la nature, dans lequel les orbes du Soleil et de la Lune sont inclinés à l'équateur Il trouve que l'excès des hauteurs de deux pleines mers consécutives, l'une sur l'autre, serait très grand dans nos ports, vers les syzygies solsticiales. Il explique, comme Newton, le peu de différence que l'on observe entre ces hauteurs, par le mouvement d'oscillation de la mer, en vertu duquel la plus

grande marée donne à très peu près, à la plus petite, ce qui manque à celle-ci pour l'égaler Mais nous avons remarqué ci-dessus le vice de cette explication. Bernoulli termine sa pièce par la recherche du point fixe, auquel il convient de rapporter les hauteurs des pleines mers. Il place ce point à la surface d'équilibre que la mer prendrait si le Soleil et la Lune cessaient de l'agiter, et il trouve qu'il est aux deux tiers de l'intervalle du *maximum* des hautes mers au *minimum* des basses mers; ce qui n'est pas exact, par les considérations suivantes L'expression des actions du Soleil et de la Lune, développée en cosinus d'angles proportionnels au temps, est formée de deux parties, l'une indépendante du mouvement de rotation de la Terre, l'autre dépendante de ce mouvement La première partie n'élève pas à Brest, la mer, d'un tiers de mètre au-dessus de sa surface d'équilibre Elle n'est point sensiblement modifiée par les circonstances accessoires L'autre partie, considérablement augmentée par ces circonstances, élève la mer autant au-dessus de sa surface d'équilibre, qu'elle l'abaisse au-dessous C'est donc à fort peu près au milieu de l'intervalle de la plus haute à la plus basse mer, que le point dont il s'agit, doit être placé

Euler, dans sa pièce, conçoit d'abord, ainsi que Newton et Daniel Bernoulli, la mer en équilibre sous l'action du Soleil Il détermine la figure qu'elle doit prendre pour être en équilibre, par la condition que la force dont chaque molécule est animée, soit perpendiculaire à cette surface. En n'ayant point égard à l'attraction mutuelle des molécules de la mer, ce qui simplifie beaucoup le problème, il trouve une figure elliptique dont l'extrémité du grand axe dirigé vers le Soleil, s'élève au-dessus de la surface d'équilibre de la mer non soumise à l'action du Soleil, d'une quantité égale à la masse du Soleil, divisée par le cube de sa distance au centre de la Terre, la masse de cette planète et son rayon étant pris pour unité Ce résultat n'est qu'environ le quart de celui de Newton Euler en conclut que la méthode de Newton est erronée, et que ce grand géomètre n'a pas même touché la question. Mais le peu d'accord de leurs résultats provient de ces deux causes; l'une, que Newton donne la différence des deux demi-axes du sphéroïde aqueux, ou la hauteur de la pleine mer au-dessus de la basse mer; tandis qu'Euler ne donne que la hauteur de la pleine mer au-dessus de sa surface d'équilibre, hauteur qui n'est que les deux tiers de la première La seconde cause est l'attraction mutuelle des molécules de la mer que

Newton suppose de même densité que la Terre, et qui augmente la différence des deux demi-axes du sphéroïde aqueux Par la réunion de ces deux causes, le résultat d'Euler est à celui de Newton, dans le rapport de quatre à quinze. Ainsi, au lieu des reproches qu'Euler fait à la méthode de Newton, il devait plutôt en admirer la finesse Euler s'élevant au-dessus de l'hypothèse que la mer est à chaque instant en équilibre sous l'action du Soleil, essaie dans sa pièce, de soumettre au calcul les oscillations de ce fluide Mais la théorie du mouvement des fluides, à laquelle il a tant contribué lui-même, n'était pas encore connue Il y a suppléé par la supposition qu'une molécule de la mer en mouvement, tend à revenir à sa position verticale d'équilibre, avec une force proportionnelle à sa distance verticale de cette position En combinant cette force avec l'action du Soleil, il parvient, pour déterminer cette distance, à une équation différentielle linéaire du second ordre Euler donne une méthode pour intégrer ce genre d'équations qui se rencontrent si fréquemment dans la Physique céleste. C'est la chose la plus remarquable de sa pièce, et la seule à laquelle on reconnaît le grand analyste qui, par ses découvertes dans toutes les branches de l'Analyse et par la perfection qu'il a su donner à la langue analytique, peut être regardé comme le père de l'Analyse moderne

Je viens enfin à la pièce de Maclaurin, dont j'ai déjà parlé dans le premier chapitre du Livre XI. Elle offre peu de détails sur le flux et le reflux de la mer, mais par l'importance et la nouveauté des théorèmes qu'elle contient sur les attractions des sphéroïdes, et par l'élégance de leurs démonstrations synthétiques, elle méritait au moins de partager le prix de l'Académie

D'Alembert, dans son Traité sur la cause générale des vents, qui remporta, en 1746, le prix proposé sur cet objet par l'Académie des Sciences de Prusse, considéra les oscillations de l'atmosphère, produites par les attractions du Soleil et de la Lune En supposant la Terre privée de son mouvement de rotation, dont il jugeait la considération inutile dans ces recherches, et supposant l'atmosphère partout également dense et soumise à l'attraction d'un astre en repos, il détermina les oscillations de ce fluide Mais lorsqu'il voulut traiter le cas où l'astre est en mouvement, la difficulté du problème le força de recourir, pour le simplifier, à des hypothèses précaires dont les résultats ne peuvent pas même être considérés comme des approximations Ses formules donnent

un vent constant d'orient en occident, mais dont l'expression dépend de l'état initial de l'atmosphère, or les quantités dépendantes de cet état ont dû disparaître depuis long-temps, par toutes les causes qui rétabliraient l'équilibre de l'atmosphère, si l'action des astres venait à cesser, on ne peut donc pas expliquer ainsi, les vents alisés Le traité de d'Alembert est remarquable par les solutions de quelques problèmes sur le calcul intégral aux différences partielles, solutions dont il fit un an après, l'application la plus heureuse au mouvement des cordes vibrantes.

Le mouvement des fluides qui recouvrent les planètes était donc un sujet presque entièrement neuf, lorsque j'entrepris, en 1774, de le traiter Aidé par les découvertes que l'on venait de faire sur le calcul aux différences partielles et sur la théorie du mouvement des fluides, découvertes auxquelles d'Alembert eut beaucoup de part, je publiai dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, pour l'année 1775, les équations différentielles du mouvement des fluides qui recouvrent la Terre, quand ils sont attirés par le Soleil et la Lune. J'appliquai d'abord ces équations au problème que d'Alembert avait tenté inutilement de résoudre, celui des oscillations d'un fluide qui recouvrirait la Terre supposée sphérique et sans rotation, en considérant l'astre attirant en mouvement autour de cette planète. Je donnai la solution générale de ce problème, quelle que soit la densité du fluide et son état initial, en supposant même que chaque molécule fluide éprouve une résistance proportionnelle à sa vitesse, ce qui me fit voir que les conditions primitives du mouvement sont anéanties à la longue par le frottement et par la petite viscosité du fluide. Mais l'inspection des équations différentielles me fit bientôt reconnaître la nécessité d'avoir égard au mouvement de rotation de la Terre Je considérai donc ce mouvement, et je m'attachai spécialement à déterminer les oscillations du fluide, indépendantes de son état initial, les seules qui soient permanentes. Ces oscillations sont de trois espèces Celles de la première espèce sont indépendantes du mouvement de rotation de la terre, et leur détermination offre peu de difficultés Les oscillations dépendantes de la rotation de la Terre, et dont la période est d'environ un jour, forment la seconde espèce Enfin, la troisième espèce est composée des oscillations dont la période est à peu près d'un demi-jour elles surpassent considérablement les autres dans nos ports Je déterminai ces diverses

oscillations, exactement dans les cas où cela se peut, et par des approximations très convergentes, dans les autres cas L'excès de deux pleines mers consécutives l'une sur l'autre, dans les solstices, dépend des oscillations de la seconde espèce Cet excès très peu sensible à Brest, y serait fort grand suivant la théorie de Newton Ce grand géomètre et ses successeurs attribuaient, comme je l'ai dit, cette différence entre leurs formules et les observations, à l'inertie des eaux de l'Océan Mais l'Analyse me fit voir qu'elle dépend de la loi de profondeur de la mer Je cherchai donc la loi qui rendrait nul cet excès, et je trouvai que la profondeur de la mer devait être pour cela, constante En supposant ensuite la figure de la Terre, elliptique, ce qui donne pareillement à la mer une figure elliptique d'équilibre, je donnai l'expression générale des inégalités de la seconde espèce, et j'en conclus cette proposition remarquable, savoir que les mouvemens de l'axe terrestre sont les mêmes que si la mer formait une masse solide avec la terre, ce qui était contraire à l'opinion des géomètres et spécialement de d'Alembert qui, dans son important ouvrage sur la Précession des équinoxes, avait avancé que la fluidité de la mer lui ôtait toute influence sur ce phénomène Mon analyse me fit encore reconnaître la condition générale de la stabilité de l'équilibre de la mer Les géomètres, en considérant l'équilibre d'un fluide placé sur un sphéroïde elliptique, avaient remarqué qu'en aplatissant un peu sa figure, il ne tendait à revenir à son premier état, que dans le cas où le rapport de sa densité à celle du sphéroïde serait au-dessous de $\frac{5}{3}$, et ils avaient fait de cette condition, celle de la stabilité de l'équilibre du fluide Mais il ne suffit pas, dans cette recherche, de considérer un état de repos du fluide, très voisin de l'état d'équilibre, il faut supposer à ce fluide un mouvement initial quelconque très petit, et déterminer la condition nécessaire pour que le mouvement reste toujours contenu dans d'étroites limites En envisageant ce problème, sous ce point de vue général, je trouvai que si la densité moyenne de la Terre surpasse celle de la mer, ce fluide dérangé par des causes quelconques, de son état d'équilibre, ne s'en écartera jamais que de quantités très petites, mais que les écarts pourraient être fort grands, si cette condition n'était pas remplie Enfin je déterminai les oscillations de l'atmosphère sur l'Océan qu'il recouvre et je trouvai que les attractions du Soleil et de la Lune ne peuvent produire le mouvement constant d'orient en occident, que l'on observe sous le nom de *vents alisés* Les oscillations de l'atmosphère

produisent dans la hauteur du baromètre, de petites oscillations dont l'étendue à l'équateur est d'un demi-millimètre, et qui méritent l'attention des observateurs.

Les recherches précédentes, quoique fort générales, sont encore loin de représenter les observations des marées dans nos ports. Elles supposent la surface du sphéroïde terrestre, régulière et recouverte entièrement par la mer, et l'on sent que les grandes irrégularités de cette surface doivent modifier considérablement le mouvement des eaux dont elle n'est qu'en partie, recouverte. L'expérience montre en effet, que les circonstances accessoires produisent des variétés considérables dans les hauteurs et dans les heures des marées, des ports même très rapprochés. Il est impossible de soumettre au calcul, ces variétés, parce que les circonstances dont elles dépendent, ne sont pas connues, et quand même elles le seraient, l'extrême difficulté du problème empêcherait de le résoudre. Cependant, au milieu des modifications nombreuses du mouvement de la mer, dues aux circonstances, ce mouvement conserve avec les forces qui le produisent, des rapports propres à indiquer la nature de ces forces, et à vérifier la loi des attractions du Soleil et de la Lune sur la mer. La recherche de ces rapports des causes à leurs effets n'est pas moins utile dans la Philosophie naturelle, que la solution directe des problèmes, soit pour vérifier l'existence de ces causes, soit pour déterminer les lois de leurs effets : elle est d'un usage plus fréquent, et elle est ainsi que le Calcul des probabilités, un heureux supplément à l'ignorance et à la faiblesse de l'esprit humain. Dans la question présente, j'ai fait usage du principe suivant, qui peut être utile dans d'autres occasions :

« L'état d'un système de corps dans lequel les conditions primitives » du mouvement ont disparu par les résistances que ce mouvement » éprouve, est périodique comme les forces qui l'animent. »

De là j'ai conclu que si la mer est sollicitée par une force périodique exprimée par le cosinus d'un angle qui croît proportionnellement au temps, il en résulte un flux partiel exprimé par le cosinus d'un angle croissant de la même manière, mais dont la constante renfermée sous le signe *cosinus*, et le coefficient de ce cosinus, peuvent être, en vertu des circonstances accessoires, très différens des mêmes constantes dans l'expression de la force, et ne peuvent être déterminés que par l'observation. L'expression des actions du Soleil et de la Lune sur la mer,

peut être développée dans une série convergente de pareils cosinus. De là naissent autant de flux partiels qui, par le principe de la coexistence des petites oscillations, s'ajoutent ensemble pour former le flux total que l'on observe dans un port. C'est sous ce point de vue, que j'ai envisagé les marées dans le quatrième Livre. Pour lier entre elles les diverses constantes des flux partiels, j'ai considéré chaque flux comme produit par l'action d'un astre qui se meut uniformément dans le plan de l'équateur. Les flux dont la période est d'environ un demi-jour, sont dus à l'action d'astres dont le mouvement propre est fort lent par rapport au mouvement de rotation de la Terre, et comme l'angle du cosinus qui exprime l'action d'un de ces astres, est un multiple de la rotation de la Terre, plus ou moins un multiple du mouvement propre de l'astre, et que d'ailleurs les constantes des cosinus qui expriment les flux produits par deux astres, auraient les mêmes rapports aux constantes des cosinus qui expriment leurs actions, si les mouvemens propres étaient égaux; j'ai supposé que les rapports varient d'un astre à l'autre, proportionnellement à la différence des mouvemens propres. L'erreur de cette hypothèse, s'il y en a une, n'a point d'influence sensible sur les principaux résultats de mes calculs.

Les plus grandes variations de la hauteur des marées dans nos ports, sont dus à l'action du Soleil et de la Lune, supposés mus uniformément dans leurs orbites et toujours à la même distance de la Terre. Mais pour avoir la loi de ces variations, il faut combiner les observations de manière que toutes les autres variations disparaissent de leur résultat. C'est ce que l'on obtient, en considérant les hauteurs des pleines mers, au-dessus des basses mers voisines, dans les syzygies et les quadratures prises en nombre égal vers chaque équinoxe et vers chaque solstice. Par ce moyen, les flux indépendans de la rotation de la Terre, et ceux dont la période est d'environ un jour, disparaissent, ainsi que les flux produits par la variation de la distance du Soleil à la Terre. En considérant trois syzygies ou trois quadratures consécutives, et en doublant l'intermédiaire, on fait disparaître les flux que produit la variation de la distance de la Lune, parce que si cet astre est périgée dans une syzygie, il est à peu près apogée dans la syzygie suivante, et la compensation est d'autant plus exacte, que l'on emploie un plus grand nombre d'observations. Par ce procédé, l'influence des vents sur le résultat de observations devient presque nulle, car si le vent élève la

hauteur d'une pleine mer, il élève à peu près autant la basse mer voisine, et son effet disparaît dans la différence des deux hauteurs C'est ainsi qu'en combinant les observations de manière que leur ensemble ne présente qu'un élément, on parvient à déterminer successivement tous les élémens des phénomènes. L'analyse des probabilités fournit pour obtenir ces élémens, une méthode plus sûre encore, et que l'on peut désigner par le nom de *méthode la plus avantageuse.* Elle consiste à former entre les élémens, autant d'équations de condition, qu'il y a d'observations. On réduit par les règles de cette méthode, le nombre de ces équations, à celui des élémens que l'on détermine en résolvant les équations ainsi réduites C'est par ce procédé, que M Bouvard a construit ses excellentes Tables de Jupiter, de Saturne et d'Uranus. Mais les observations des marées, étant loin d'atteindre la précision des observations astronomiques, le très grand nombre de celles qu'il faut employer pour que leurs erreurs se compensent, ne permet pas de leur appliquer la méthode la plus avantageuse.

Sur l'invitation de l'Académie des Sciences, on fit au commencement du dernier siècle, dans le port de Brest, des observations des marées pendant six années consécutives C'est à ces observations publiées par Lalande, que j'ai comparé dans le Livre cité, mes formules La situation de ce port est très favorable à ce genre d'observations . il communique avec la mer par un vaste canal au fond duquel on l'a construit Les irrégularités du mouvement de la mer parviennent ainsi dans le port, très affaiblies, à peu près comme les oscillations que le mouvement irrégulier d'un vaisseau produit dans le baromètre, sont atténuées par un étranglement fait au tube de cet instrument D'ailleurs, les marées étant considérables à Brest, les variations accidentelles n'en sont qu'une faible partie Aussi l'on remarque dans les observations de ces marées, pour peu qu'on les multiplie, une grande régularité que n'altère point la petite rivière qui vient se perdre dans la rade immense de ce port. Frappé de cette régularité, je proposai au gouvernement d'ordonner que l'on fît à Brest une nouvelle suite d'observations des marées, et qu'elle fût continuée au moins pendant une période du mouvement de nœuds de l'orbite lunaire. C'est ce que l'on a entrepris. Ces nouvelles observations datent du premier juin de l'année 1806, et depuis cette époque, elles ont été continuées chaque jour sans interruption On a considéré celles de l'année 1807, et des quinze années suivantes. Je

dois au zèle infatigable de M Bouvard pour tout ce qui intéresse l'Astronomie, les calculs immenses que la comparaison de mon analyse avec les observations a exigés Il y a employé près de six mille observations les résultats de ces calculs sont consignés dans les tableaux que l'on verra ci-après Pour avoir les hauteurs des pleines mers, et leur variation qui, près du *maximum* et du *minimum*, est proportionnelle au carré du temps, on a considéré vers chaque équinoxe et vers chaque solstice, trois syzygies consécutives entre lesquelles l'équinoxe ou le solstice était compris on a doublé les résultats de la syzygie intermediaire, pour détruire les effets de la parallaxe lunaire. On a pris dans chaque syzygie, la hauteur de la pleine mer du soir, au-dessus de la basse mer du matin, du jour qui précède la syzygie, du jour même de la syzygie et des quatre jours qui la suivent, parce que le *maximum* des marées tombe à peu près au milieu de cet intervalle le choix des heures est fondé sur ce que les observations faites pendant le jour, en deviennent plus sûres et plus exactes On a fait pour chacune des seize années, une somme des hauteurs des marées des jours correspondans dans les syzygies équinoxiales, et une pareille somme relativement aux syzygies solsticiales, et l'on en a conclu les *maxima* des hauteurs des pleines mers, près des syzygies, soit équinoxiales, soit solsticiales, et les variations de ces hauteurs près de leurs *maxima*. L'inspection de ces hauteurs et de leurs variations montre la régularité de ce genre d'observations dans le port de Brest

Dans les quadratures, on a suivi un procédé semblable, avec la seule différence que l'on a pris l'excès de la haute mer du matin sur la basse mer du soir, du jour de la quadrature et des trois jours qui la suivent. L'accroissement des marées quadratures, à partir de leur *minimum*, étant beaucoup plus rapide, que la diminution des marées syzygies, à partir de leur *maximum*, on a dû restreindre à un plus petit intervalle, la loi de variation proportionnelle au carré du temps On a formé pour chacune des seize années, des tableaux pareils à ceux des marées syzygies

Tous ces tableaux montrent avec évidence, l'influence des déclinaisons du Soleil et de la Lune, non-seulement sur les hauteurs absolues des marées, mais encore sur leurs variations Plusieurs savans et spécialement Lalande, avaient révoqué en doute cette influence, parce qu'au lieu de considérer un grand ensemble d'observations, ils s'étaient attachés à quelques observations isolées où la mer, par l'effet de causes

accidentelles, s'était élevée à une grande hauteur vers les solstices. Mais l'application la plus simple du calcul des probabilités, aux résultats de M. Bouvard, suffit pour voir que la probabilité de l'influence de la déclinaison des astres, est excessive et bien supérieure à celle d'un grand nombre de faits sur lesquels on ne se permet aucun doute.

On a conclu des variations des marées près de leurs *maxima* et de leurs *minima*, l'intervalle dont ces *maxima* et ces *minima* suivent les syzygies et les quadratures, et l'on a trouvé cet intervalle, d'un jour et demi à fort peu près, ce qui est parfaitement d'accord avec ce que les observations anciennes m'ont donné dans le quatrième Livre. Le même accord a lieu relativement aux grandeurs de ces *maxima* et de ces *minima*, et par rapport aux variations des hauteurs des marées, à partir de ces points; en sorte que la nature, après un siècle, s'est retrouvée conforme à elle-même. L'intervalle dont je viens de parler, dépend des constantes renfermées sous les signes cosinus dans les expressions des deux flux principaux dus aux actions du Soleil et de la Lune. Les constantes correspondantes de l'expression des forces sont différemment modifiées par les circonstances accessoires au moment de la syzygie, le flux lunaire précède le flux solaire, et ce n'est qu'un jour et demi après, que le flux lunaire retardant chaque jour sur le flux solaire, ces deux flux coïncident et produisent ainsi le *maximum* des marées. Une modification semblable a lieu dans les constantes qui multiplient les cosinus; il en résulte un accroissement dans l'action des astres sur la mer. J'ai donné dans le quatrième Livre, le moyen de reconnaître cet accroissement que j'avais trouvé d'un dixième, par les observations anciennes, mais quoique les observations des marées quadratures s'accordassent sur ce point avec les observations des marées syzygies, j'avais dit qu'un élément aussi délicat exigeait un bien plus grand nombre d'observations. Les calculs de M. Bouvard ont confirmé l'existence de cet accroissement, et l'ont porté à un quart à fort peu près, pour la Lune. La détermination de ce rapport est nécessaire pour conclure des observations des marées, les rapports véritables des actions du Soleil et de la Lune dont dépendent les phénomènes de la précession des équinoxes et de la nutation de l'axe terrestre. En corrigeant les actions des astres sur la mer, de leurs accroissemens dus aux circonstances accessoires; on trouve en secondes sexagésimales $9'',4$ pour la nutation, $6'',8$ pour l'équation lunaire des tables du Soleil, et la masse de la

Lune, un 75e de celle de la Terre. Ces résultats sont à très peu près ceux que donne la discussion des observations astronomiques. L'accord de valeurs obtenues par des moyens si divers, est bien remarquable. C'est en comparant à mes formules, les *maxima* et les *minima* des hauteurs observées des marées, que les actions du Soleil et de la Lune sur la mer et leurs accroissemens ont été déterminés. Les variations des hauteurs des marées près de ces points, en sont une suite nécessaire; en substituant donc les valeurs de ces actions, dans mes formules, on doit retrouver à fort peu près les variations observées. C'est ce que l'on retrouve en effet. Cet accord est une grande confirmation de la loi de la pesanteur universelle: elle reçoit une nouvelle confirmation, des observations des marées syzygies vers l'apogée et vers le périgée de la Lune. Je n'avais considéré dans le quatrième Livre, que la différence des hauteurs des marées dans ces deux positions de la Lune. Je considère de plus la variation de ces hauteurs à partir de leurs *maxima*; et sur ces deux points, mes formules représentent les observations.

Les heures des marées et leurs retards d'un jour à l'autre, offrent les mêmes variétés que leurs hauteurs. M. Bouvard en a formé des tableaux pour les marées qu'il avait employées dans la détermination des hauteurs. On y voit évidemment l'influence des déclinaisons des astres et de la parallaxe lunaire. Ces observations comparées à mes formules, offrent le même accord que les observations des hauteurs. On ferait sans doute disparaître les petites anomalies que ces comparaisons présentent encore, en déterminant convenablement les constantes de chaque flux partiel. Le principe par lequel j'ai lié entre elles ces constantes diverses, peut n'être pas rigoureusement exact. Peut-être encore, les quantités que l'on néglige en adoptant le principe de la coexistence des oscillations, deviennent sensibles dans les grandes marées. Je me suis ici contenté de noter ces anomalies légères, afin de diriger ceux qui voudront reprendre ces calculs, lorsque les observations des marées que l'on continue à Brest, et qui sont déposées à l'Observatoire royal, seront assez nombreuses pour donner la certitude que ces anomalies ne sont point dues aux erreurs des observations. Mais avant que de modifier les principes dont j'ai fait usage, il faudra porter plus loin les approximations analytiques.

Enfin j'ai considéré le flux dont la période est d'environ un jour. En comparant les différences de deux hautes mers, et de deux

basses mers consécutives, dans un grand nombre de syzygies solsticiales' j'ai déterminé la grandeur de ce flux et l'heure de son *maximum* dans le port de Brest J'ai trouvé un cinquième de mètre à fort peu près pour sa grandeur, et un dixième de jour environ pour le temps dont il précède à Brest l'heure du *maximum* de la marée semi-diurne Quoique sa grandeur ne soit pas un trentième de la grandeur du flux semi-diurne, cependant les forces génératrices de ces deux flux sont à peu près égales, ce qui montre combien différemment les circonstances accessoires influent sur la grandeur des marées On n'en sera point surpris, si l'on considère que dans le cas même où la surface de la Terre serait régulière et recouverte entièrement par la mer, le flux diurne disparaîtrait si la profondeur de la mer était constante.

Les circonstances accessoires peuvent encore faire disparaître dans un port les inégalités semi-diurnes, et rendre très sensibles les inégalités diurnes Alors il n'y a chaque jour qu'une marée, qui disparaît lorsque les astres sont dans l'équateur. C'est ce que l'on a observé à Batsham, port du royaume de Tunquin, et dans quelques îles de la mer du Sud J'observerai relativement à ces circonstances, que les unes s'étendent à la mer entière et se rapportent à des causes très éloignées du port où l'on observe les marées, on ne peut douter, par exemple, que les ondulations de l'Océan atlantique et de la mer du Sud, réfléchies par la côte orientale de l'Amérique, qui s'étend presque d'un pôle à l'autre, n'aient une grande influence sur les marées du port de Brest. C'est principalement de ces circonstances, que dépendent les phénomènes qui sont à peu près les mêmes dans nos ports Tel paraît être le retard de la plus haute marée sur l'instant de la syzygie. D'autres circonstances plus rapprochées du port, telles que les côtes ou les détroits voisins, produisent les différences que l'on observe entre les hauteurs et les heures des marées, dans des ports peu distans entre eux De là il suit qu'un flux partiel n'a point avec la latitude du port, le rapport indiqué par la force qui le produit, puisqu'il dépend de flux semblables correspondans à des latitudes fort éloignées et même à un autre hémisphère On ne peut donc déterminer que par l'observation, le signe et la grandeur de ce flux.

Les phénomènes des marées, dont je viens de parler, dépendent des termes du développement de l'action des astres, divisés par le cube de leurs distances à la Terre, les seuls que l'on ait considérés jusqu'ici.

Mais la Lune est assez rapprochée de la Terre, pour que les termes de l'expression de son action, divisés par la quatrième puissance de sa distance, soient sensibles dans les résultats d'un grand nombre d'observations, car on sait par la théorie des probabilités, que le nombre des observations supplée à leur défaut de précision, et fait connaître des inégalités beaucoup moindres que les erreurs dont chaque observation est susceptible On peut même, par cette théorie, assigner le nombre d'observations nécessaires pour acquérir une grande probabilité que l'erreur du résultat obtenu est renfermée dans des limites données J'ai donc pensé que l'influence des termes de l'action de la Lune, divisés par la quatrième puissance de sa distance à la Terre, pourrait se manifester dans l'ensemble des nombreuses observations discutées par M Bouvard Les flux correspondans aux termes divisés par le cube de la distance ne donnent aucune différence entre les marées des nouvelles lunes et celles des pleines lunes Mais ceux qui ont pour diviseur, la quatrième puissance de la distance, mettent une différence entre ces marées Ils produisent un flux dont la période est d'environ un tiers de jour Les observations de M. Bouvard, discutées sous ce point de vue, indiquent avec une grande probabilité l'existence de ce flux partiel Elles établissent encore, sans aucun doute, que l'action de la Lune pour élever la mer à Brest, est plus grande lorsque sa déclinaison est australe, que lorsqu'elle est boréale, ce qui ne peut être dû qu'aux termes de l'action lunaire, divisés par la quatrième puissance de la distance

On voit par cet exposé, que la recherche des rapports généraux entre les phénomènes des marées, et les actions du Soleil et de la Lune sur la mer, supplée heureusement à l'impossibilité d'intégrer les équations différentielles de son mouvement, et à l'ignorance des données nécessaires pour déterminer les fonctions arbitraires qui entrent dans leurs intégrales il en résulte une certitude entière, que ces phénomènes ont pour unique cause, l'attraction de ces deux astres, conformément à la loi de la pesanteur universelle

J'ai insisté particulièrement sur le flux et le reflux de la mer, parce qu'il est de tous les effets de l'attraction des corps célestes, le plus près de nous et le plus sensible, d'ailleurs il m'a paru très propre à montrer comment on peut reconnaître et déterminer par un grand nombre d'observations même peu précises, les lois et les causes des phénomènes dont

il est impossible d'obtenir les expressions analytiques, par la formation et l'intégration de leurs équations différentielles. Tels sont les effets de la chaleur solaire sur l'atmosphère, dans la production des vents alisés et des moussons, et dans les variations régulières, soit diurnes, soit annuelles, du baromètre et du thermomètre.

Pour arriver à l'Océan, l'action du Soleil et de la Lune traverse l'atmosphère qui doit, par conséquent, en éprouver l'influence, et être assujettie à des mouvemens semblables à ceux de la mer, mouvemens dont j'ai donné la théorie dans le quatrième Livre De là résultent des vents et des oscillations dans le baromètre, dont les périodes sont les mêmes que celles du flux et du reflux Mais ces vents sont peu considérables et presque insensibles dans une atmosphère d'ailleurs fort agitée : l'étendue des oscillations du baromètre n'est pas d'un millimètre, à l'équateur même où elle est la plus grande Cependant, les circonstances locales qui augmentent considérablement les oscillations de la mer, peuvent également accroître les oscillations du baromètre dont l'observation suivie sous ce rapport, mérite l'attention des physiciens.

Le flux atmosphérique est produit par les trois causes suivantes : la première est l'action directe du Soleil et de la Lune sur l'atmosphère; la seconde est l'élévation et l'abaissement périodique de l'Océan, base mobile de l'atmosphère, la troisième enfin, est l'attraction de ce fluide par la mer dont la figure varie périodiquement Ces trois causes dérivant des mêmes forces attractives du Soleil et de la Lune; elles ont ainsi que leurs effets, les mêmes périodes que ces forces, conformément au principe sur lequel j'ai fondé ma théorie des marées Le flux atmosphérique est donc soumis aux mêmes lois que le flux de l'Océan il est, comme lui, la combinaison de deux flux partiels produits, l'un par l'action du Soleil, l'autre par l'action de la Lune. La période du flux atmosphérique solaire est d'un demi-jour solaire, et celle du flux lunaire est d'un demi-jour lunaire. L'action de la Lune sur la mer à Brest, étant triple de celle du Soleil, le flux lunaire atmosphérique est au moins double du flux solaire. Ces considérations doivent nous guider dans le choix des observations propres à déterminer d'aussi petites quantités, et dans la manière de les combiner, pour se soustraire, le plus qu'il est possible, à l'influence des causes qui produisent les grandes variations du baromètre.

Depuis plusieurs années, on observe, chaque jour, à l'Observatoire

royal, les hauteurs du baromètre et du thermomètre, à neuf heures sexagésimales du matin, à midi, à trois heures après midi, et à neuf heures du soir. Ces observations faites avec les mêmes instrumens, et presque toutes par le même observateur, sont par leur précision et par leur grand nombre, propres à indiquer le flux atmosphérique, s'il est sensible. On voit avec évidence, la variation diurne du baromètre, dans les résultats de ces observations : un mois suffit pour la manifester. L'excès de la plus grande hauteur du baromètre observée qui répond à neuf heures du matin, sur la plus petite qui répond à trois heures du soir, est à Paris de huit dixièmes de millimètre, par le résultat moyen des observations faites chaque jour, pendant six années consécutives.

La hauteur du baromètre due au flux solaire, redevenant chaque jour, la même à la même heure, ce flux se confond avec la variation diurne qu'il modifie, et il n'en peut être distingué par les observations faites à l'Observatoire royal. Il n'en est pas ainsi des hauteurs barométriques dues au flux lunaire, et qui se réglant sur les heures lunaires, ne redeviennent les mêmes aux mêmes heures solaires, qu'après un demi-mois d'intervalle. Les observations dont je viens de parler, comparées de demi-mois en demi-mois, sont disposées de la manière la plus favorable pour indiquer le flux lunaire. Si, par exemple, le *maximum* de ce flux arrive à neuf heures du matin, le jour de la syzygie; son *minimum* arrivera vers trois heures du soir. Le contraire aura lieu, le jour de la quadrature. Ce flux augmentera donc la variation diurne du premier de ces jours, il diminuera la variation diurne du second, et la différence de ces variations sera le double de la grandeur du flux lunaire atmosphérique. Mais le *maximum* de ce flux n'arrivant pas à neuf heures du matin dans la syzygie, il faut, pour déterminer sa grandeur et l'heure de son arrivée, employer les observations barométriques de neuf heures du matin, de midi et de trois heures du soir, faites chaque jour, soit de la syzygie, soit de la quadrature. On peut également faire usage des observations des jours qui précèdent ou qui suivent ces phases, du même nombre de jours, et faire concourir à la détermination d'élémens aussi délicats, toutes les observations de l'année.

On doit faire ici une remarque importante sans laquelle il serait impossible de reconnaître une aussi petite quantité que le flux lunaire, au milieu des grandes variations du baromètre. Plus les observations sont rapprochées, moins l'effet de ces variations est sensible : il est presque

nul sur un résultat conclu d'observations faites le même jour et dans le court intervalle de six heures : le baromètre varie presque toujours avec assez de lenteur, pour ne pas troubler alors sensiblement l'effet des causes régulières Voilà pourquoi le résultat moyen des variations diurnes de chaque année est toujours le même à fort peu près, quoiqu'il y ait des différences de plusieurs millimètres dans les hauteurs moyennes absolues barométriques des diverses années; en sorte que si l'on comparait la hauteur moyenne de neuf heures du matin, d'une année, à la hauteur moyenne de trois heures du soir, d'une autre année, on aurait une variation diurne, souvent très fautive, quelquefois même d'un signe contraire à la véritable Il importe donc pour déterminer de très petites quantités, de les déduire d'observations faites le même jour, et de prendre une moyenne entre un grand nombre de valeurs ainsi obtenues On ne peut conséquemment déterminer le flux lunaire, que par un système d'observations faites, chaque jour, au moins à trois heures différentes, conformément au système suivi à l'Observatoire.

M. Bouvard a bien voulu relever sur ses registres, les observations barométriques du jour même de chaque syzygie et de chaque quadrature, du jour qui précède ces phases, et des premier et second jours qui les suivent. Elles embrassent les huit années écoulées depuis le 1er octobre 1815 jusqu'au 1er octobre 1823 J'ai employé les observations de neuf heures du matin, de midi et de trois heures du soir je n'ai point considéré les observations de neuf heures du soir, pour diminuer, le plus qu'il est possible, l'intervalle des observations. D'ailleurs, celles des trois premières heures ont été faites plus exactement aux heures indiquées, que celles de neuf heures du soir; et le baromètre étant éclairé par la lumière du jour, dans ces premières heures, la différence qui peut venir de la manière diverse dont les instrumens sont éclairés, disparaît En comparant à mes formules, les résultats de ces nombreuses observations qui correspondent à 1584 jours, je trouve un dix-huitième de millimètre pour la grandeur du flux lunaire atmosphérique, et trois heures et un tiers sexagésimales, pour l'heure de son *maximum* du soir, le jour de la syzygie

C'est ici surtout que se fait sentir la nécessité d'employer un très grand nombre d'observations, de les combiner de la manière la plus avantageuse, et d'avoir une méthode pour déterminer la probabilité que l'erreur des résultats obtenus, est renfermée dans d'étroites limites,

méthode sans laquelle on est exposé à présenter comme lois de la nature, les effets des causes irrégulières, ce qui est arrivé souvent en Météorologie J'ai donné cette méthode dans ma Théorie analytique des Probabilités En l'appliquant aux observations, j'ai déterminé la loi des anomalies de la variation diurne du baromètre, et j'ai reconnu que l'on ne peut pas, sans quelque invraisemblance, attribuer les résultats précédens, à ces anomalies seules il est probable que le flux lunaire atmosphérique diminue la variation diurne dans les syzygies, qu'il l'augmente dans les quadratures, mais dans des limites telles que ce flux ne fait pas varier la hauteur du baromètre, d'un dix-huitième de millimètre en plus ou en moins, ce qui montre combien peu l'action de la Lune sur l'atmosphère est sensible à Paris Quoique ces résultats aient été conclus de 4752 observations, la méthode dont je viens de parler fait voir que pour leur donner une probabilité suffisante, et pour obtenir avec exactitude un élément aussi petit que le flux lunaire atmosphérique, il faut employer au moins quarante mille observations L'un des principaux avantages de cette méthode est de faire connaître jusqu'à quel point on doit multiplier les observations, pour qu'il ne reste aucun doute raisonnable sur leurs résultats

Quelle est sur le flux lunaire, l'influence respective des trois causes du flux atmosphérique que j'ai citées? Il est difficile de répondre à cette question Cependant le peu de densité de la mer par rapport à la moyenne densité de la Terre, ne permet pas d'attribuer un effet sensible au changement périodique de sa figure. Sans les circonstances accessoires, l'effet direct de l'action de la Lune serait insensible sous nos latitudes Ces circonstances ont, il est vrai, une grande influence sur la hauteur des marées dans nos ports, mais le fluide atmosphérique étant repandu autour de la Terre, beaucoup moins irrégulièrement que la mer, leur influence sur le flux atmosphérique doit être beaucoup moindre que sur le flux de l'Océan Ces considérations me portent à regarder comme cause principale du flux lunaire atmosphérique, dans nos climats, l'élévation et l'abaissement périodiques de la mer Des observations barométriques faites chaque jour, dans les ports où la marée s'élève à une grande hauteur, éclairciraient ce point curieux de Météorologie

M Bouvard a trouvé que la variation diurne moyenne du baromètre, de neuf heures du matin à trois heures du soir, a été positive pour

chacun des 72 mois des six années écoulées depuis le 1er janvier 1817, jusqu'au 1er janvier 1823, et d'où il a conclu la variation diurne moyenne égale à $0^{mm},8014$. La loi de probabilité des anomalies de la variation diurne, à laquelle je suis parvenu, donne à très peu près $\frac{1}{2}$ pour la probabilité de ce résultat.

En examinant le tableau des hauteurs moyennes du baromètre pour chacun des 72 mois considérés par M. Bouvard, j'ai reconnu que le résultat moyen des variations diurnes de neuf heures du matin à trois heures du soir, des trois mois de novembre, décembre et janvier, a été constamment plus faible, chaque année, que le résultat moyen des trois mois suivans, février, mars et avril. La variation moyenne des six années, a été $0^{mm},5428$, pour les trois premiers mois, et $1^{mm},0567$, ou presque double pour les trois mois suivans. La moyenne de ces six mois est à fort peu près huit dixièmes de millimètre et par conséquent égale à la variation diurne moyenne. Les six autres mois n'offrent rien de semblable. Une différence aussi considérable indique une cause annuelle qui diminue la variation diurne, dans les trois mois de novembre, décembre et janvier, et qui l'augmente dans les trois mois suivans. En appliquant à cette différence l'analyse des probabilités, je trouve qu'il y a une probabilité de plus de trois cent mille contre un, qu'elle n'est pas l'effet du hasard. Ce qui augmente encore cette probabilité, est que la variation diurne moyenne de neuf heures du matin à midi, a été $0^{mm},1933$ dans les trois premiers mois et $0^{mm},3733$ dans les trois mois suivans ; pareillement la variation diurne moyenne de trois heures du soir à neuf heures du soir, a été $0^{mm},3033$, dans les trois premiers mois, et $0^{mm},6000$, dans les trois mois suivans ; ces variations sont à peu près dans le rapport des variations correspondantes de neuf heures du matin à trois heures du soir. Je ne cherche point ici la cause de ce phénomène ; je me borne à constater son existence. La période de la variation diurne, réglée sur le jour solaire, indique évidemment que cette variation est due à l'action du Soleil. L'extrême petitesse de l'action attractive du Soleil sur l'atmosphère est prouvée par la petitesse de l'action attractive de la Lune. C'est donc par l'action de sa chaleur, que le Soleil produit la variation diurne. Mais il est presque impossible de soumettre les effets de cette action à l'analyse, et toute explication de ce genre de phénomènes, qui n'est point fondée sur le Calcul, doit être bannie de la Philosophie naturelle.

CHAPITRE II

Nouvelles recherches sur la Théorie des Marées

2 Ma théorie des marées, exposée dans le quatrième Livre, repose sur ce principe, savoir que *l'état d'un système de corps, dans lequel les conditions primitives du mouvement ont disparu par les résistances qu'il éprouve, est périodique comme les forces qui l'animent*. Ce principe combiné avec celui de la coexistence des oscillations très petites, explique d'une manière singulièrement heureuse, tous les phénomènes des marées, indépendans des circonstances locales. Les forces productrices de ces phénomènes, relatives à l'action d'un astre L, sont, comme on le voit dans le n° 16 du Livre IV, exprimées par les différences partielles de la fonction

$$\frac{3L}{2r^3}\left\{\left[\cos\theta.\sin\nu+\sin\theta.\cos\nu.\cos(nt+\varpi-\psi)^2\right]-\frac{1}{3}\right\}, \qquad (a)$$

L désignant la masse de l'astre, r sa distance au centre de la Terre; ν sa déclinaison, ψ son ascension droite comptée de l'intersection de son orbite avec l'équateur, t le temps, $nt+\varpi$, l'angle horaire de cette intersection, et θ le complément de la latitude du port. Soit ε l'inclinaison de l'orbite à l'équateur, et φ la distance angulaire de l'astre L à l'intersection de l'orbite et de l'équateur, on aura par les formules de la Trigonométrie sphérique,

$$\begin{aligned}
\sin\nu &= \sin\varepsilon\ \sin\varphi,\\
\cos\nu\ \sin\psi &= \cos\varepsilon.\sin\varphi;\\
\cos\nu\ \cos\psi &= \cos\varphi,\\
\cos^2\nu &= \tfrac{1}{2}.(1+\cos^2\varepsilon)+\tfrac{1}{2}.\sin^2\varepsilon\ \cos 2\varphi,\\
\cos^2\nu.\sin 2\psi &= \cos\varepsilon.\sin 2\varphi,\\
\cos^2\nu.\cos 2\psi &= \tfrac{1}{2}.\sin^2\varepsilon+\tfrac{1}{2}.(1+\cos^2\varepsilon).\cos 2\varphi,
\end{aligned}$$

la formule (a) devient ainsi

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{3L}{2r^3}\cdot\left\{\begin{matrix}\frac{1}{2}\cdot\cos^2\theta\cdot\sin^2\varepsilon+\frac{1}{4}\cdot(1+\cos^2\varepsilon)\cdot\sin^2\theta-\frac{1}{3}\\ -\frac{1}{2}\cdot(\cos^2\theta-\frac{1}{2}\cdot\sin^2\theta)\cdot\sin^2\varepsilon\cdot\cos 2\varphi\end{matrix}\right\}\\
&+\frac{3L}{2r^3}\cdot\sin\theta\cdot\cos\theta\cdot\left\{\begin{matrix}\sin\varepsilon\cdot\cos\varepsilon\cdot\sin(nt+\varpi)\\ -\sin\varepsilon\cdot\frac{(1+\cos\varepsilon)}{2}\cdot\sin(nt+\varpi-2\varphi)\\ +\sin\varepsilon\cdot\frac{(1-\cos\varepsilon)}{2}\cdot\sin(nt+\varpi+2\varphi)\end{matrix}\right\}\\
&+\frac{3L}{4r^3}\cdot\sin^2\theta\cdot\left\{\begin{matrix}\cos^4\frac{1}{2}\varepsilon\cdot\cos(2nt+2\varpi-2\varphi)\\ +\sin^4\frac{1}{2}\varepsilon\cdot\cos(2nt+2\varpi+2\varphi)\\ +\frac{1}{2}\cdot\sin^2\varepsilon\cdot\cos(2nt+2\varpi)\end{matrix}\right\}
\end{aligned}\right\}(b)$$

Si l'on ne considère dans les observations des marées, que l'excès d'une haute mer sur l'une des deux basses mers voisines, si, de plus, on prend ces excès en nombre égal dans les syzygies et dans les quadratures, des équinoxes du printemps, des équinoxes d'automne, des solstices d'été, et des solstices d'hiver; enfin, si pour détruire l'effet de la parallaxe lunaire, on considère les trois syzygies ou les trois quadratures les plus voisines de l'équinoxe ou du solstice, en doublant les observations relatives à la syzygie ou à la quadrature intermédiaire, les résultats de l'observation ne dépendront que des flux relatifs aux angles $2nt+2\varpi$, $2nt+2\varpi-2\varphi$, $2nt+2\varpi+2\varphi$, flux dont la période est d'environ un demi-jour, et dont les deux premiers sont dans nos ports, beaucoup plus grands que tous les autres flux. $\sin^4\frac{1}{2}\varepsilon$ étant une très petite fraction, on peut négliger le terme qu'elle multiplie. Alors, les flux partiels dont la période est d'environ un demi-jour, dépendent des termes

$$\begin{aligned}
&\frac{3L}{4r^3}\cdot\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon\cdot\sin^2\theta\cdot\cos(2nt+2\varpi-2\varphi)\\
&+\frac{3L}{4r^3}\cdot\sin^2\theta\cdot\tfrac{1}{2}\cdot\sin^2\varepsilon\cdot\cos(2nt+2\varpi).
\end{aligned}$$

Ces termes produisent, comme on l'a vu dans le n° 17 du Livre IV, deux flux partiels que l'on peut représenter par

$$\begin{aligned}
&\frac{A\ L}{r^3}\ \cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon\cdot\cos(2nt-2mt+2\varpi-2\lambda)\\
&+\frac{B\ L}{r^3}\cdot\tfrac{1}{2}\cdot\sin^2\varepsilon\cdot\cos(2nt+2\varpi-2\gamma),
\end{aligned}$$

mt étant le moyen mouvement de l'astre L dans son orbite A, B, λ et γ sont des constantes dépendantes des circonstances du port.

Ces deux flux sont les mêmes que ceux qui seraient produits par deux astres mus dans le plan de l'équateur, à la distance r du centre de la Terre, et dont le premier représenté par $L.\cos^4 \frac{1}{2}\varepsilon$, aurait le même mouvement moyen, que l'astre L dans son orbite, et passerait en même temps que lui par l'intersection de cette orbite avec l'équateur. Le second astre représenté par $\frac{1}{2}.L.\sin^2\varepsilon$, correspondrait constamment au point de cette intersection. Le *maximum* des hautes marées correspond à la conjonction ou à l'opposition des deux astres fictifs : alors la haute mer du premier coïncide avec celle du second. Le *minimum* des hautes marées, correspond aux quadratures de ces astres fictifs : alors la haute mer du premier coïncide avec la basse mer du second. Ce *maximum* et ce *minimum* donneront donc la valeur de la fraction $\frac{A}{B}$, et par conséquent le rapport des deux actions. Si cette fraction surpasse l'unité, l'action de l'astre L est augmentée par son mouvement propre mt dans son orbite, en vertu des circonstances accessoires : je nomme ainsi l'ensemble de toutes les causes qui modifient les marées dans un port. J'ai fait voir la possibilité de cette augmentation, dans le n° 18 du quatrième Livre.

Au moment de la coïncidence des hautes mers de deux astres fictifs, on a, en désignant par π la demi-circonférence,

$$2nt + 2\varpi - 2mt - 2\lambda = 2i\pi,$$
$$2nt + 2\varpi - 2\gamma = 2i'\pi,$$

i et i' étant des nombres entiers, ce qui donne pour le temps t de la coïncidence

$$t = \frac{(i'-i)\,\pi}{m} + \frac{\gamma - \lambda}{m},$$

$nt + \varpi - mt$ est l'angle horaire de l'astre L, réduit en jours mesurés par les retours de cet astre au méridien, et il exprime l'heure de la coïncidence. Si, comme nous le supposerons dans la suite, l'astre L est le Soleil, λ sera l'heure de la haute marée solaire, et comme il y a deux marées chaque jour, nous supposerons que λ se rapporte à la pleine mer du soir, en sorte que les heures étant comptées de minuit, λ surpassera

la demi-circonférence. En désignant par T le temps de la conjonction ou de l'opposition des deux astres fictifs, on aura

$$mT = (\iota' - \iota) \cdot \pi,$$

donc

$$t - T = \frac{\gamma - \lambda}{m}.$$

Si γ surpasse λ, l'instant de la coïncidence des hautes mers suivra le moment de la conjonction ou de l'opposition des astres. C'est donc de la différence de ces deux constantes, différence qui tient aux circonstances du port, que dépend le retard du *maximum* des pleines mers sur ce moment. Ce retard serait très petit, si le mouvement de l'astre dans son orbite, était fort petit. Mais on verra dans la suite, qu'il est très sensible pour la Lune, dans le port de Brest où il s'élève à un jour et demi.

Supposons maintenant que les lettres L, r, m, A, ε, λ et γ, se rapportent au Soleil, et marquons d'un trait pour la Lune, les mêmes lettres. On aura par l'action réunie de ces deux astres et en n'ayant égard qu'aux inégalités dont la période est d'environ un demi-jour, la hauteur de la mer au-dessus de son niveau, égale à

$$\left.\begin{aligned}
&\frac{AL}{r^3} \cdot \cos^4 \tfrac{1}{2}\varepsilon \cdot \cos(2nt + 2\varpi - 2mt - 2\lambda) \\
&+ \tfrac{1}{2} \cdot \frac{BL}{r^3} \cdot \sin^2 \varepsilon \cdot \cos(2nt + 2\varpi - 2\gamma) \\
&+ \frac{A'L'}{r'^3} \cdot \cos^4 \tfrac{1}{2}\varepsilon' \cdot \cos(2nt + 2\varpi - 2m't - 2\lambda') \\
&+ \tfrac{1}{2} \cdot \frac{BL'}{r'^3} \cdot \sin^2 \varepsilon' \cdot \cos(2nt + 2\varpi - 2\gamma')
\end{aligned}\right\}, \qquad (A)$$

la constante B devant être la même à très peu près pour le Soleil et pour la Lune, parce que les angles $2nt - 2\gamma$, et $2nt - 2\gamma'$ varient à très peu près de la même manière, vu la lenteur du mouvement des nœuds de l'orbe lunaire. γ' serait égal à γ, si l'intersection de l'orbe lunaire avec l'équateur coïncidait avec l'équinoxe du printemps. En comptant les angles mt et $m't$ de cet équinoxe, et désignant par δ l'ascension droite de l'intersection de l'orbe lunaire avec l'équateur, on aura

$$\gamma' = \gamma + \delta.$$

Les constantes A, A′, B, γ, λ, λ', ne peuvent être déterminées que par les observations, mais comme elles ne diffèrent d'un astre à l'autre, qu'à raison de la différence des moyens mouvemens de ces astres dans leurs orbites, différence toujours très petite relativement à nt ou au mouvement de rotation de la Terre, il est assez naturel de supposer que ces constantes varient d'un astre à l'autre, proportionnellement à la différence des moyens mouvemens, ainsi en désignant par x et y deux constantes indéterminées, nous ferons

$$A = (1 + mx) \,.\, B, \qquad A' = (1 + m'x) \,.\, B,$$
$$\lambda = \gamma - my, \qquad \lambda' = \gamma - m'y$$

Les observations feront connaître jusqu'à quel point ces suppositions sont approchées

Les deux plus grands termes de la fonction (A), étant ceux qui dépendent des cosinus des angles $2nt + 2\varpi - 2mt - 2\lambda$, et $2nt + 2\varpi - 2m't - 2\lambda'$, ces cosinus doivent, au moment de la pleine mer, différer peu de l'unité, en faisant donc

$$nt + \varpi - mt - \lambda = \iota\pi + l,$$
$$nt + \varpi - m't - \lambda' = \iota'\pi + l',$$

ι et ι' étant des nombres entiers, on pourra supposer l et l' fort petits. Ces deux équations donnent

$$-(m' - m) \,.\, t = (\iota' - \iota) \,.\, \pi + \lambda' - \lambda + l' - l,$$

faisons

$$t = T + t',$$

T étant le temps de la syzygie moyenne. Au moment de cette phase, les angles $m'T$ et mT doivent être égaux, ou différer d'un nombre entier de demi-circonférences, en sorte que l'on a

$$(m' - m) \,.\, T = \iota''\pi,$$

ι'' étant un nombre entier, on a donc, en observant que $\lambda - \lambda'$ est égal à $(m' - m) \,.\, y$,

$$-\iota''\pi - (m' - m)t' = (\iota' - \iota)\pi - (m' - m)y + l' - l$$

Les angles $(m'-m)t'$, $(m'-m)y$, et $l'-l$ étant peu considérables, on doit avoir $-t''$ égal à $t'-t$, en faisant donc

$$t'=t''+y;$$

on aura

$$l'=l-(m'-m)\,t''.$$

Ainsi l'on aura

$$\cos(2nt+2\varpi-2mt-2\lambda)=\cos 2l,$$
$$\cos(2nt+2\varpi-2m't-2\lambda')=\cos[2l-2(m'-m).t'']$$

On a

$$\cos(2nt+2\varpi-2\gamma)=\cos(2nt+2\varpi-2mt-2\lambda+2mt+2\lambda-2\gamma)$$
$$=\cos(2l+2mt-2my)$$

Substituant pour mt, sa valeur $m\mathrm{T}+mt''+my$, on aura

$$\cos(2nt+2\varpi-2\gamma)=\cos(2m\mathrm{T}+2l+2mt'')$$

On trouvera pareillement

$$\cos(2nt+2\varpi-2\gamma')=\cos(2m\mathrm{T}+2l+2mt''-2\delta).$$

Cela posé, si l'on fait

$$a=\frac{\mathrm{AL}}{r^3}.\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon,\quad a'=\frac{\mathrm{A'L'}}{r'^3}.\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon',$$

$$b=\tfrac{1}{2}.\frac{\mathrm{BL}}{r^3}.\sin^2\varepsilon.\cos 2m\mathrm{T}+\tfrac{1}{2}\frac{\mathrm{BL'}}{r'^3}.\sin^2\varepsilon'.\cos(2m\mathrm{T}-2\delta);$$

$$h=\tfrac{1}{2}.\frac{\mathrm{BL}}{r^3}.\sin^2\varepsilon.\sin 2m\mathrm{T}+\tfrac{1}{2}.\frac{\mathrm{BL'}}{r'^3}.\sin^2\varepsilon'.\sin(2m\mathrm{T}-2\delta);$$

l'expression (A) de la hauteur de la mer, deviendra au moment de la pleine mer, en la réduisant en série par rapport aux puissances de l, $l-(m'-m)t''$, $l+mt''$, et en négligeant seulement les produits de quatre dimensions de ces quantités, et les produits des troisièmes puissances de $l+mt''$, par $\sin^2\varepsilon$, et $\sin^2\varepsilon'$,

$$a(1-2l^2)+a'\{1-2[l-(m'-m)t'']^2\}$$
$$+b[1-2(l+mt'')^2]-2h(l+mt''),\qquad\text{(B)}$$

Aux instans de la haute et de la basse mer, cette fonction est à son

maximum et à son *minimum*, sa différentielle prise par rapport au temps t, est donc nulle On ne doit y faire varier que l et t'', le temps T de la syzygie devant être supposé constant, et alors on a

$$dl = (n - m)\,dt, \quad dt'' = dt,$$

on a donc

$$0 = -4al(n-m) - 4a'l(n-m') + 4a'(n-m')\ (m'-m)t'' \\ - 2nh - 4l\,.\,nb - 4nmbt'', \qquad (C)$$

ce qui donne

$$l = \frac{(n-m')\ a'\ (m'-m)t'' - nmbt'' - \frac{1}{2}nh}{(n-m)\ a + (n-m')\ a' + nb},$$

$$l - (m'-m)\,.\,t'' = -\frac{[(n-m)\ a + nb]\ (m'-m)\ t'' - nmbt'' - \frac{1}{2}nh}{(n-m)\ a + (n-m')\ a' + nb},$$

$$l + mt'' = \frac{(n-m')\ a'\ (m'-m)t'' + [(n-m)a + (n-m')a']\ mt'' - \frac{1}{2}nh}{(n-m)\ a + (n-m')a' + nb}.$$

La fonction (B) donnera ainsi cette expression fort approchée de la hauteur de la pleine mer,

$$a + a' + b - \frac{h^2}{2\,(a+a'+b)} - \frac{2ha'(m'-m)\,t''}{a+a'+b},$$

$$-\frac{2a'\left[a + b\,\frac{(m'+m)}{m'-m}\right]}{a+a'+b}\,.\,(m'-m)^2\ t''^2$$

On peut dans l'ensemble d'un grand nombre de syzygies, supposer le terme

$$-\frac{2ha'\,(m'-m)t''}{a+a'+b}$$

alternativement positif et négatif, en sorte que la somme de ses diverses valeurs soit nulle et puisse être négligée cela est d'autant plus permis, que ce terme est fort petit, l'un des deux termes de son expression étant multiplié par $\sin^2\varepsilon$, et l'autre étant multiplié par $\sin^2\varepsilon'$. De plus, ayant négligé les termes qui ont pour facteur $\sin^4 . \frac{1}{2}\varepsilon'$, nous pouvons à plus forte raison, négliger le terme $\frac{-h^2}{2(a+a'+b)}$; la formule précédente devient ainsi

$$a + a' + b - \frac{2a'\left(a + b\,\frac{m'+m}{m'-m}\right)}{a+a'+b'}\ (m'-m)^2\ t''^2, \qquad (D)$$

3 Introduisons présentement les inégalités du mouvement et de la distance des astres, dans l'expression de la hauteur des marées Pour cela, développons le terme de la fonction (b) du n° 2, rapportée à la Lune,

$$\frac{3L'}{4r'^3}\sin^2\theta\,.\,\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon'.\,\cos(2nt+2\varpi-2\varphi')$$

Soit $f.\sin(st+\theta')$ une des inégalités du mouvement lunaire, et $h\cos(st+\theta')$ l'inégalité correspondante du rayon vecteur r' de la Lune, ces deux inégalités introduisent dans le terme précédent, les termes

$$\frac{3L'}{4r'^3}\sin^2\theta\,.\,\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon'.\left[\begin{array}{l}(f-\tfrac{3}{2}h)\,.\,\cos(2nt+2\varpi-2m't-st-\theta')\\ -(\tfrac{3}{2}h+f)\,.\,\cos(2nt+2\varpi-2m't+st+\theta')\end{array}\right]$$

$\overline{r'}$ étant la moyenne distance de la Lune à la Terre. Ces termes donnent naissance à deux flux partiels que l'on peut considérer comme produits par l'action de deux astres mus uniformément dans le plan de l'équateur, à la distance $\overline{r'}$, et dont les masses sont respectivement

$$L'.\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon.(f-\tfrac{3}{2}h),\qquad L'\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon'.(\tfrac{3}{2}h+f),$$

leurs moyens mouvemens étant $\left(m'+\frac{s}{2}\right).t$, et $\left(m'-\frac{s}{2}\right).t$ On a vu précédemment que le terme

$$\frac{3L'}{4r'^3}.\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon'.\sin^2\theta\,.\,\cos(2nt+2\varpi-2m't)$$

produit dans l'expression de la hauteur de la mer, le terme

$$(1+m'x)\,.\,\frac{BL'}{r'^3}.\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon'.\,\cos(2nt+2\varpi-2m't+2m'\gamma-2\gamma).$$

Il est facile d'en conclure que les termes dus à l'action des astres supposés, produisent dans cette expression, les termes

$$\left[1+\left(m'+\frac{s}{2}\right)x\right].\frac{BL'}{r'^3}.\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon'.(f-\tfrac{3}{2}h)\times$$
$$\cos\left[2nt+2\varpi-2m't-st-\theta'-2\gamma+2\left(m'+\frac{s}{2}\right)\gamma\right]$$
$$-\left[1+\left(m'-\frac{s}{2}\right)x\right]\frac{BL'}{r'^3}.\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon'.(f+\tfrac{3}{2}h)\times$$
$$\cos\left[2nt+2\varpi-2m't+st+\theta'-2\gamma+2\left(m'-\frac{s}{2}\right)\gamma\right]$$

Nous avons supposé, au moment de la haute mer,

$$nt - m't + \varpi - \gamma + m'\gamma = i'\pi + l',$$

i' étant un nombre entier.

Les deux termes précédens deviennent ainsi

$$\left[1 + \left(m' + \frac{s}{2}\right)x\right] \frac{BL'}{r'^3} \cdot \cos^4 \tfrac{1}{2}\varepsilon' \cdot \left(f - \tfrac{3}{2}h\right) \cos\left(2l' - st - \theta' + s\gamma\right)$$

$$-\left[1 + \left(m' - \frac{s}{2}\right)x\right] \frac{BL'}{r'^3} \cos^4 \tfrac{1}{2}\varepsilon' \cdot \left(f + \tfrac{3}{2}h\right) \cos\left(2l' + st + \theta' - s\gamma\right)$$

On a par ce qui précède

$$t = T + \gamma + t'',$$

ce qui réduit les deux termes précédens à ceux-ci,

$$\left[1 + \left(m' + \frac{s}{2}\right)x\right] \cdot \frac{BL'}{r'^3} \cos^4 \tfrac{1}{2}\varepsilon' \left(f - \tfrac{3}{2}h\right) \cos\left(sT + \theta' + st'' - 2l'\right).$$

$$-\left[1 + \left(m' - \frac{s}{2}\right)x\right] \cdot \frac{BL'}{r'^3} \cdot \cos^4 \tfrac{1}{2}\varepsilon' \left(f + \tfrac{3}{2}h\right) \cos\left(sT + \theta' + st'' + 2l'\right),$$

Ces deux termes développés en séries, ajouteront donc à l'expression (B) de la hauteur des marées, la quantité

$$\begin{aligned}
&- a'\left(3h - \frac{fsx}{1 + m'x}\right) \cos(sT + \theta') \\
&+ a'st''\left(3h - \frac{fsx}{1 + m'x}\right) \sin(sT + \theta') \\
&+ 4a'l'\left[f - \frac{3hsx}{4(1 + m'x)}\right] \sin(sT + \theta') \\
&+ a'\left[\frac{3h}{2} - \frac{fsx}{2(1 + m'x)}\right] (s^2t''^2 + 4l'^2) \cos(sT + \theta') \\
&+ 4a'\left[f - \frac{3hsx}{4(1 + m'x)}\right] st''l' \cdot \cos(st + \theta')
\end{aligned}$$

La différentielle de cette quantité, prise par rapport au temps t, et divisée par dt, doit être ajoutée au second membre de l'équation (C) du numéro précédent, pour avoir l'instant de la haute mer. On peut dans la différenciation, ne faire varier que l', et supposer $dl' = ndt$, à cause

de la petitesse de m' et de s, relativement à n. On aura ainsi pour la différentielle de la quantité, divisée par dt,

$$4a'n\left[f-\frac{3hsx}{4(1+m'x)}\right]\sin(sT+\theta')$$
$$+4a'nl'\left(3h-\frac{fsx}{1+mx'}\right)\cos(sT+\theta')$$
$$+4a'nst''\left[f-\frac{3hsx}{4(1+m'x)}\right]\cos(sT+\theta')$$

Nous pouvons supposer que dans l'ensemble d'un grand nombre d'observations, les valeurs de $\sin(sT+\theta')$, ont été alternativement positives et négatives, en sorte que leur somme soit nulle à fort peu près. En nommant $4X$, la somme des deux derniers termes de la quantité précédente, on voit qu'ils ajoutent aux numérateurs des valeurs de l, $l-(m'-m).t''$, et $l+mt''$, données dans le numéro précédent, la quantité X, et qu'en négligeant le carré de X, et le produit hX, cette quantité disparaîtra de l'expression (B) de la hauteur de la marée. Mais il faut ajouter à cette expression, et par conséquent à l'expression (D) de la même hauteur, la quantité

$$-a'\left(3h-\frac{fsx}{1+m'x}\right)\cos(sT+\theta')$$
$$+\tfrac{1}{2}a'\left(3h-\frac{fsx}{1+m'x}\right).(s^2t''^2+4l'^2)\cos(sT+\theta')$$
$$+4a'\left[f-\frac{3hsx}{4(1+m'x)}\right]l'st''.\cos(sT+\theta')$$

Le terme

$$\frac{3L'}{8r'^3}.\sin^2\theta.\sin^2\varepsilon'.\cos(2nt+2\varpi-2\delta)$$

de la fonction (b) transportée à la Lune, produit les deux suivans

$$-\frac{3}{4}\frac{BL'}{r^3}\sin^2\varepsilon'\,h.\left[\begin{array}{l}\left(1+\frac{sx}{2}\right)\cos(2nt+2\varpi-st-\theta'-2\gamma+s\gamma-2\delta)\\+\left(1-\frac{sx}{2}\right)\cos(2nt+2\varpi+st+\theta'-2\gamma-s\gamma-2\delta)\end{array}\right].$$

En substituant pour B sa valeur $\frac{A'}{1+m'x}$, pour $\sin^2\varepsilon'$, $4\sin^2\frac{1}{2}\varepsilon'\cos^2\frac{1}{2}\varepsilon'$, et a' pour $\frac{A'L'\cos^4\frac{1}{2}\varepsilon'}{r'^3}$, ces deux termes deviennent

$$-\frac{3a'h\,\tang^2\frac{1}{2}\varepsilon'}{1+m'x}\left[\begin{array}{l}\left(1+\frac{sx}{2}\right)\cos(2nt+2\varpi-st+sy-\theta'-2\gamma-2\delta)\\+\left(1-\frac{sx}{2}\right)\cos(2nt+2\varpi+st+\theta'-2\gamma-sy-2\delta)\end{array}\right].$$

On trouvera par l'analyse précédente, en supposant nulles dans l'ensemble des observations, les moyennes de $\sin(sT+\theta')$, $\sin(2m'T-2\gamma)$, et de leurs produits, qu'ils ajoutent à l'expression (D) de la hauteur de la pleine mer, la quantité

$$-\frac{6a'h\,\tang^2\frac{1}{2}\varepsilon'}{1+m'x}.\cos(2m'T-2\delta)\cos(sT+\theta').\left\{\begin{array}{l}1-\left[\frac{s^2t''^2+4(l'+m't'')^2}{2}\right]\\+sx.st''(l'+m't'')\end{array}\right\};$$

l'expression de la hauteur de la pleine mer devient ainsi

$$\left.\begin{array}{l}a+a'+b+2a'\,\dfrac{\left[a+\frac{b(m'+m)}{m'-m}\right](m'-m)^2t''^2}{a+a'+b}\\-\Sigma a'.\cos(sT-\theta')\left\{\begin{array}{l}3h-\frac{fsx}{1+m'x}+\frac{6h\,\tang^2\frac{1}{2}\varepsilon'}{1+m'x}.\cos(2m'T-2\delta)\\-\frac{1}{2}\left[3h-\frac{fsx}{1+m'x}\right](s^2t''^2+4l'^2)\\-4\left[f-\frac{3hsx}{4(1+m'x)}\right]st''l'\\-\frac{3h\,\tang^2\frac{1}{2}\varepsilon'}{1+m'x}\cos(2m'T-2\delta)\left\{\begin{array}{l}s^2t''^2+4(l'+m't'')^2\\-2sx(l'+m't'')st''\end{array}\right\}\end{array}\right.\end{array}\right\},\quad(M)$$

le signe intégral Σ embrassant tous les termes semblables relatifs aux diverses inégalités de la Lune

On a par ce qui précède, au moment de la pleine mer,

$$nt+\varpi-mt-\lambda=i\pi+l,$$

il est facile d'en conclure que la valeur de l, réduite en temps, à raison de la circonférence entière pour un jour, exprime le retard des marées. On trouvera par l'analyse précédente, qu'en désignant par α la partie

de l'expression de la hauteur des marées, indépendante de l' et de t'', on aura

$$l=(m'-m)t''a'\left\{\frac{1-\dfrac{mb}{(m'-m)a'}-\Sigma\cos(sT+\theta')\left\{\begin{array}{l}3h-\dfrac{fsx}{1+m'x}\\ -\dfrac{s}{m'-m}\left[f-\dfrac{3hsx}{4(1+m'x)}\right]\\ -\dfrac{3h\ \mathrm{tang}^2\frac{1}{2}\varepsilon'\cos(2m'T-2\delta)}{(1+m'x)(m'-m)t''}\left\{\begin{array}{l}2mt''\\ -\frac{1}{2}sx\ st''\end{array}\right.\end{array}\right.}{\alpha+\dfrac{(m'-m)a}{n-m'}+\dfrac{m'b}{n-m'}}\right\} \quad (N)$$

On fera entrer par la même analyse, les inégalités du mouvement solaire, dans les expressions de la hauteur et du retard des marées

Parmi les inégalités lunaires, celle que l'on nomme *variation* augmente dans les syzygies, la parallaxe de la Lune et sa vitesse angulaire, de quantités constantes elle les diminue des mêmes quantités, dans les quadratures Relativement à cette inégalité, s est égal à $2(m'-m)$, et dans les syzygies, le cosinus de $2(m'-m)T$, est l'unité il est -1 dans les quadratures. La théorie lunaire donne par rapport à cette inégalité, $3h=-0{,}02334$, et $f=0{,}01$ De plus, on verra dans la suite que $m'x$ est à fort peu près égal à $\frac{1}{4}$, en sorte que l'on peut supposer, en négligeant la valeur de m,

$$\frac{fsx}{1+m'x}=0{,}004,$$

ce qui donne

$$3h-\frac{fsx}{1+m'x}=-0{,}02734.$$

On peut, vu la petitesse de $\mathrm{tang}^2\frac{1}{2}\varepsilon'$, substituer sans erreur sensible, $-0{,}02734$, au lieu de $3h$, dans le facteur de cette quantité, on aura donc égard à l'inégalité de la variation, dans la valeur de α, en multipliant L' par $1{,}02734$ dans les syzygies, et l'on y aura égard dans les quadratures, en multipliant L' par $0{,}97266$.

3 Soit p le carré du cosinus de la déclinaison du Soleil, à l'instant de la syzygie, on aura par le n° 2

$$p=\frac{1+\cos^2\varepsilon}{2}+\frac{1}{2}\sin^2\varepsilon.\cos 2m'T,$$

ou on a

$$\cos^4 \tfrac{1}{2}\varepsilon = \frac{1+\cos^2\varepsilon}{2} - \sin^4 \tfrac{1}{2}\varepsilon,$$

en négligeant donc comme nous l'avons fait, $\sin^4 \frac{1}{2}\varepsilon$, on aura

$$2A\,\frac{L}{r^3}.\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon + B.\sin^2\varepsilon.\frac{L}{r^3}.\cos 2mT$$
$$= 2A.\frac{L}{r^3}.p - (A-B)\frac{L}{r^3}.\sin^2\varepsilon.\cos 2m'T$$

En nommant pareillement p' le carré du cosinus de la déclinaison de la Lune à l'instant de la syzygie, on aura

$$2A'.\frac{L'}{r'^3}.\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon' + B.\sin^2\varepsilon'.\frac{L'}{r'^3}.\cos(2m'T - 2\delta)$$
$$= 2A'.\frac{L'}{r'^3}.p' - (A'-B)\sin^2\varepsilon'.\frac{L'}{r'^3}.\cos(2m'T - 2\delta)$$

Dans les syzygies des solstices, mT et $m'T$ sont à peu près égaux à $\frac{1}{2}\pi$. En désignant alors par $\frac{1}{2}\pi + mT'$, et $\frac{1}{2}\pi + m'T'$ les angles mT et $m'T$, ce qui revient à compter du solstice, les arcs mT' et $m'T'$; on aura

$$\cos 2mT = -\cos 2mT',\ \cos(2m'T - 2\delta) = -\cos(2m'T' - 2\delta):$$

en désignant donc par q et q' les carrés des cosinus des déclinaisons solaires et lunaires à l'instant de la syzygie solsticiale, on aura

$$2A.\frac{L}{r^3}.\cos^4.\tfrac{1}{2}\varepsilon + B.\sin^2\varepsilon\,\frac{L}{r^3}.\cos.2mT$$
$$= 2A.\frac{L}{r^3}.q + (A-B)\sin^2\varepsilon\,\frac{L}{r^3}.\cos 2mT',$$
$$2A'.\frac{L'}{r'^3}.\cos^4.\tfrac{1}{2}\varepsilon' + B.\sin^2\varepsilon'.\frac{L'}{r'^3}.\cos(2m'T - 2\delta)$$
$$= 2A'.\frac{L'}{r'^3}.q' + (A'-B).\sin^2\varepsilon'.\frac{L'}{r'^3}.\cos(2m'T' - 2\delta)$$

On peut supposer dans l'ensemble d'un grand nombre de syzygies, que la somme des cosinus de $2mT$ est égale à la somme des cosinus de

$2m'T'$, et que la somme des cosinus de $2m'T - 2\delta$ est égale à la somme des cosinus de $2m'T' - 2\delta$, parce que ces cosinus diffèrent peu de l'unité, et que d'ailleurs ils sont multipliés par les facteurs très petits $(A - B).\sin^2\varepsilon$, et $(A' - B).\sin^2\varepsilon'$ En supposant donc que P et Q expriment les sommes des carrés des cosinus des déclinaisons du Soleil, aux instans des syzygies équinoxiales et solsticiales, et que P' et Q' expriment les mêmes sommes pour la Lune, on aura en ne considérant que l'inégalité lunaire de la variation, pour un nombre i, de syzygies équinoxiales

$$2i\alpha = 2A.\frac{L}{r^3}\,P + 2A'.1{,}02734.\frac{L'}{r'^3}.P'$$
$$-(A - B).\frac{L}{r^3}(P - Q) - (A' - B).1{,}02734.\frac{L'}{r'^3}(P' - Q')$$

et pour le même nombre i de syzygies solsticiales, on aura

$$2i\alpha' = 2A.\frac{L}{r^3}\,Q + 2A'.1{,}02734.\frac{L'}{r'^3}.Q'$$
$$+(A - B)\,\frac{L}{r^3}(P - Q) + (A' - B).1{,}02734.\frac{L'}{r'^3}(P' - Q'),$$

α' étant ce que devient α dans les syzygies solsticiales

La hauteur de la pleine mer syzygie, donnée par la formule (M) du n° précédent, étant de la forme $\alpha - \beta t''^2$, il est clair que la basse mer syzygie sera $-\alpha + \beta t''^2$, ce qui revient à changer L et L' dans $-L$ et $-L'$ Dans les quadratures, la basse mer solaire coïncide avec la haute mer lunaire. De là il suit que si l'on désigne par P_1 et Q_1 les sommes des carrés des cosinus des déclinaisons du Soleil dans les quadratures équinoxiales et solsticiales, si l'on désigne par Q'_1 et P'_1 la somme des carrés des cosinus des déclinaisons de la Lune dans les mêmes quadratures, enfin, si l'on désigne par α'' et α''' ce que deviennent α α' dans les quadratures, on aura pour i quadratures équinoxiales, en n'ayant égard qu'à l'inégalité de la variation,

$$2i\alpha'' = 2A'.0{,}97266.\frac{L'}{r'^3}Q'_1 - 2A.\frac{L}{r^3}.P_1$$
$$+(A' - B).0{,}97266.\frac{L'}{r'^3}(P'_1 - Q'_1) + (A - B).\frac{L}{r^3}(P_1 - Q_1),$$

et pour ι quadratures solsticiales, on aura

$$2\iota\alpha'' = 2A'\ 0{,}97266.\frac{L'}{r'^3}.P'_1 - 2A.\frac{L}{r^3}.Q_1$$

$$-(A'-B)\ 0{,}97266.\frac{L'}{r'^3}(P'_1 - Q'_1) - (A-B)\frac{L}{r^3}.(P_1 - Q_1).$$

Dans le calcul des valeurs de $\mathcal{E}t'^2$, et l données par les formules (M) et (N), on fera pour les ι syzygies équinoxiales

$$\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon = \frac{P+Q}{2l};\ \cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon' = \frac{P'+Q'}{2l},$$

$$\sin^2\varepsilon.\cos 2mT = \frac{P-Q}{l},\ \sin^2\varepsilon'.\cos(2m'T - 2\delta') = \frac{P'-Q'}{l},$$

$$\tang^2\tfrac{1}{2}\varepsilon'.\cos(2m'T - 2\delta') = \tfrac{1}{2}.\frac{(P'-Q')}{P'+Q'}.$$

Il faut, dans les syzygies solsticiales, changer les signes des seconds membres des trois dernières équations

Dans les quadratures, il faut changer L en — L, et faire

$$\cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon = \frac{P_1+Q_1}{2l},\ \cos^4\tfrac{1}{2}\varepsilon' = \frac{P'_1+Q'_1}{2l}$$

Dans les quadratures équinoxiales, il faut faire

$$\sin^2\varepsilon.\cos 2mT = \frac{P_1-Q_1}{l},\ \sin^2\varepsilon'\cos(2m'T - 2\delta') = \frac{Q'_1-P'_1}{l},$$

$$\tang^2\tfrac{1}{2}\varepsilon'\ \cos(2m'T - 2\delta'^2) = \tfrac{1}{2}\frac{(Q'_1-P'_1)}{P'_1-Q'_1}$$

Dans les quadratures solsticiales, il faut changer les signes des seconds membres de ces trois dernières équations.

CHAPITRE III.

Comparaison de l'analyse précédente avec les observations des hauteurs des marées dont la période est d'environ un demi-jour.

4. On a considéré les syzygies équinoxiales suivantes :

TABLE I

Des Hauteurs des Marées.

J'ai considéré les syzygies équinoxiales suivantes :

1807	9 mars	23 mars	8 avril	2 sept	16 sept	1er octobre.
1808	12	27	10	4	20	4
1809	2	15	31 mars	9	23	9
1810	5	21	4 avril	13	28	12
1811	10	24	8	2	17	2
1812	13	27	11	5	20	5
1813	2	17	1	10	24	10
1814	6	21	4	13	29	13
1815	11	25	9	3	18	2
1816	13	28	12	6	21	6
1817	3	17	1	11	25	10
1818	7	22	5	31 août	14	30 septemb.
1819	11	25	10	4 sept.	19	3 octobre.
1820	29 février	14	29 mars	7	22	7
1821	4	18	2 avril	11	26	4
1822	7	23	6	1	15	30 septemb.

On a pris dans les syzygies, l'excès de la haute mer du soir sur la basse mer du matin, relatif au jour qui précède la syzygie, au jour même de la syzygie, et aux quatre jours qui la suivent. On a fait, pour

chaque année, une somme des excès relatifs à chacun de ces jours, et doublant les résultats correspondans à la syzygie la plus voisine de l'équinoxe, et qui est la moyenne des trois syzygies considérées dans chaque équinoxe. On a obtenu ainsi les résultats suivans exprimés en mètres.

TABLE II.

Syzygies équinoxiales

	(−1)	(0)	(+1)	(+2)	(+3)	(+4)
1807	44,425	49,020	51,460	50,720	48,830	45,070
1808	44,740	49,155	51,120	51,060	48,495	43,910
1809	44,495	48,520	50,910	51,135	49,305	44,910
1810	46,300	49,711	51,740	50,275	47,711	43,079
1811	44,205	49,030	51,290	51,100	48,860	43,850
1812	43,527	48,446	51,348	51,630	49,619	46,015
1813	45,330	49,069	51,041	50,804	47,928	43,466
1814	44,211	48,651	50,551	50,705	48,465	44,707
1815	43,997	48,768	51,852	50,917	48,641	43,857
1816	43,980	48,350	51,380	51,370	49,000	44,180
1817	43,730	48,250	50,630	50,580	49,000	44,290
1818	43,500	48,060	50,330	50,250	48,560	43,650
1819	43,758	48,226	50,592	50,281	48,802	43,316
1820	45,028	49,762	51,857	51,446	48,639	43,860
1821	44,265	48,605	50,660	49,630	48,815	42,107
1822	44,453	48,364	50,777	49,983	47,759	42,640
Sommes	709,944 $= f$	779,987 $= f'$	817,538 $= f''$	811,886 $= f'''$	778,429 $= f^{\text{IV}}$	702,897 $= f^{\text{V}}$

$f, f', f'', f''', f^{\text{IV}}, f^{\text{V}}$, sont les sommes des hauteurs relatives à chacun des six jours. Si l'on désigne la loi de ces sommes par

$$\zeta\, t^2 + \zeta' t + \zeta'',$$

t étant le temps écoulé depuis la haute mer du soir du jour qui précède la syzygie, l'intervalle de deux marées consécutives du soir étant pris

pour unité, on aura les six équations de conditions suivantes :

$$\begin{aligned}
\zeta'' &= f,\\
\zeta + \zeta' + \zeta'' &= f',\\
4.\zeta + 2\,\zeta' + \zeta'' &= f'',\\
9.\zeta + 3.\zeta' + \zeta'' &= f''',\\
16.\zeta + 4.\zeta' + \zeta'' &= f^{\text{iv}},\\
25.\zeta + 5.\zeta' + \zeta'' &= f^{\text{v}}.
\end{aligned}$$

Si l'on multiplie chacune de ces équations respectivement par les coefficiens de ζ, et que l'on fasse la somme des produits; si l'on fait des sommes semblables relativement aux coefficiens de ζ' et ζ''; ces trois sommes donneront les équations suivantes.

$$\begin{aligned}
979.\zeta + 225.\zeta' + 55.\zeta'' &= f' + 4f'' + 9f''' + 16f^{\text{iv}} + 25.f^{\text{v}},\\
225.\zeta + 55.\zeta' + 15.\zeta'' &= f' + 2f'' + 3f''' + 4f^{\text{iv}} + 5.f^{\text{v}},\\
55.\zeta + 15.\zeta' + 6.\zeta'' &= f + f' + f'' + f''' + f^{\text{iv}} + f^{\text{v}}.
\end{aligned}$$

Ces équations donnent

$$\zeta = \frac{10(f + f^{\text{v}} - f'' - f''') + 2(f'' + f''' - f' - f^{\text{iv}})}{112},$$

$$\zeta' = \frac{5(f^{\text{v}} - f') + 3(f^{\text{iv}} - f') + f''' - f''}{35} - 5\zeta,$$

$$\zeta'' = \frac{f + f' + f'' + f''' + f^{\text{iv}} + f^{\text{v}}}{6} - \frac{5}{2}\zeta' - \frac{55}{6}.\zeta.$$

Maintenant on a, le mètre étant pris pour unité,

$$\begin{aligned}
f &= 709{,}944,\ f' = 779{,}987,\ f'' = 817{,}538,\\
f''' &= 811{,}886,\ f^{\text{iv}} = 778{,}429,\ f^{\text{v}} = 702{,}897.
\end{aligned}$$

On trouve ainsi

$$\begin{aligned}
\zeta &= -\ 18{,}06977,\\
\zeta' &= \ 89{,}04710,\\
\zeta'' &= \ 809{,}8021.
\end{aligned}$$

L'expression

$$\zeta.t^2 + \zeta'.t + \zeta'' \text{ ou } \zeta'' - \frac{\zeta'^2}{4\zeta} + \zeta\left(t + \frac{\zeta'}{2\zeta}\right)^2,$$

des valeurs de f, f', f'', etc., devient

$$819{,}5070 - 18{,}06977\ .\ (t - 2{,}46398)^2.$$

Exprimons par t' la distance d'une haute marée du soir à l'instant

de la syzygie, t' étant supposé positif pour les marées qui suivent la syzygie Soit y une constante arbitraire, dont nous disposerons de manière que $\alpha - \beta(t'-y)^2$ représente cette haute marée La basse marée qui la précède, sera, comme on l'a vu d'après la loi de la pesanteur universelle, $-\alpha + \beta(t'-y-\frac{1}{4})^2$. L'excès de la haute mer sur cette basse mer sera donc

$$2\alpha - \frac{\beta}{32} - 2\beta(t'-y-\tfrac{1}{8})^2.$$

Ainsi, en nommant i le nombre des syzygies employées pour former les valeurs de f, f', f'', etc, l'expression générale des sommes de ces valeurs sera

$$2i\alpha - \frac{i\beta}{32} - 2i\beta(t'-y-\tfrac{1}{8})^2 \qquad (a)$$

Désignons par k la moyenne des quantités dont les syzygies ont précédé, dans les observations précédentes, les instans des hautes marées du soir des jours mêmes des syzygies, on aura

$$t'-y = t - 1 + k - y$$

La formule (a) devient ainsi

$$2i\alpha - \frac{2i\beta}{64} - 2i\beta(t - \tfrac{9}{8} + k - y)^2.$$

Cette formule doit coïncider avec l'expression

$$\zeta'' - \frac{\zeta'^2}{4\zeta} + \zeta\left(t + \frac{\zeta'}{2\zeta}\right)^2, \qquad (b)$$

on a donc

$$\frac{\zeta'}{2\zeta} = -\tfrac{9}{8} + k - y,$$

ce qui donne

$$y = k - \tfrac{9}{8} - \frac{\zeta'}{2\zeta}.$$

En substituant les valeurs précédentes de ζ' et de ζ, on a

$$y = 1{,}33898 + k.$$

Dans les syzygies précédentes, le retard journalier des marées a été 0,026136 On a ainsi, en parties du jour solaire,

$$1{,}33898 = 1{,}37398.$$

La valeur moyenne k, dont les syzygies ont précédé les marées du

soir, est $0^{l},10615$. On a ainsi

$$y = 1^{l},48013.$$

La comparaison des expressions (a) et (b) donne

$$2i\alpha = 819,7895,$$
$$2i\beta = 18,0698,$$

i étant égal à 128, parce que l'on a employé 128 syzygies, en comptant pour deux, chaque syzygie intermédiaire dont on a doublé les résultats.

Pour que l'on puisse apprécier la régularité des observations des marées faites dans le port de Brest, on a déterminé, comme ci-dessus, les valeurs de $2i\alpha$ et de $2i\beta$ pour chacune des seize années, et, comme le nombre des observations de chaque année n'est qu'un seizième du nombre total des observations que nous venons d'employer, on a multiplié les divers résultats par seize, pour les comparer aux précédens. On a formé ainsi la table suivante

TABLE III

Valeurs de $2i\beta$ et de $2i\alpha$ conclues des marées équinoxiales syzygies

	$2i\beta$	$2i\alpha$
1807	16,884	821,585
1808	18,034	822,271
1809	16,851	820,878
1810	16,739	820,992
1811	19,193	825,188
1812	17,676	827,212
1813	17,256	818,212
1814	16,443	814,340
1815	19,776	826,075
1816	19,300	825,287
1817	17,712	815,962
1818	18,069	811,234
1819	18,614	814,466
1820	19,194	828,424
1821	19,200	814,194
1822	18,202	810,998
Moyennes	18,0714	819,8320

Le peu de différence de ces valeurs de $2i\beta$ et de $2i\alpha$ à leurs moyennes, montre la régularité des marées dans le port de Brest, ces écarts ayant été rendus seize fois plus grands, en vertu de leur multiplication par seize.

5 On a considéré de la même manière les syzygies solsticiales suivantes, qui correspondent aux mêmes années.

TABLE IV

1807	6 juin	20 juin	5 juill	15 déc	29 déc.	
1808	13 janv	8	24 juin	7 juill	3 dec	17 déc
1809	1 janv	13	27	12	7	21
1810	5	3	17	1	10	26
1811	9	6	20	6	15	29
1812	14	9	24	8	4	18
1813	2	14	28	13	7	22
1814	6	3	17	2	11	26
1815	10	7	21	6	16	30
1816	15	10	25	9	4	18
1817	3	30 mai	14	28 juin.	8	23
1818	6	3 juin	18	3 juill	12	27
1819	11	8	22	7	1	17 31
1820	10 juin	26	10 juill	5 déc	19	»
1821	4	31 mai	15 juin	29 juin	9	24
1822	7	4 juin	19	4 juill	13	28
1823	12					

On a fait, comme ci-dessus, les sommes des excès des hautes marées du soir sur les basses mers du matin du jour qui précède la syzygie, du jour même de la syzygie, et des quatre jours qui la suivent, en doublant les résultats relatifs à la syzygie intermédiaire dans chaque solstice. On a obtenu ainsi les résultats suivans

TABLE V.

Syzygies solsticiales.

	(−1)	(0)	(+1)	(+2)	(+3)	(+4)
1807	41,030	43,040	44,745	45,545	43,830	41,575
1808	41,365	44,260	46,075	45,920	44,875	42,535
1809	41,195	44,140	46,885	45,945	45,610	43,334
1810	41,942	45,481	46,623	46,487	45,425	41,242
1811	40,695	44,163	45,159	45,736	45,219	43,284
1812	42,058	44,759	45,932	45,478	43,474	40,904
1813	41,733	44,867	45,821	44,845	43,302	39,784
1814	40,380	43,665	45,767	45,050	44,017	41,264
1815	40,045	43,043	45,129	44,834	43,289	40,867
1816	40,830	42,390	44,090	43,850	41,640	39,620
1817	39,440	42,720	44,380	43,880	41,910	40,120
1818	39,474	42,400	43,575	44,145	42,048	39,468
1819	39,457	41,030	42,733	42,325	41,268	38,261
1820	38,320	40,990	42,222	42,454	41,208	39,029
1821	39,220	42,130	42,160	41,825	41,225	38,055
1822	38,194	41,824	43,357	43,524	42,532	39,470
Somm =	645,358	690,902	714,592	712,843	690,872	648,792

L'ensemble de ces hauteurs donne

$$f = 645{,}358,\ f' = 690{,}902,\ f'' = 714{,}592,$$
$$f''' = 712{,}843,\ f^{\text{IV}} = 690{,}872,\ f^{\text{V}} = 648{,}792.$$

On trouve ainsi

$$\zeta = -\ 11{,}08513,$$
$$\zeta' = 55{,}86375,$$
$$\zeta'' = 645{,}84780.$$

L'expression $\zeta'' - \frac{\zeta'^2}{4\zeta} + \zeta\left(t + \frac{\zeta'}{2\zeta}\right)$ des valeurs de f, f', etc., devient

$$716{,}2293 - 11{,}08515(t - 2{,}51976)^2;$$

d'où l'on tire comme dans le n° précédent,

$$2\iota\alpha' = 716{,}40250,$$
$$2\iota\beta' = 11{,}08515.$$

On a, comme dans le même n°,

$$\frac{\zeta'}{2\zeta} = -\frac{9}{8} + k - y,$$

ce qui donne

$$y = 1{,}39476 + k.$$

Dans les syzygies des solstices, le retard journalier des marées a été $0^j{,}028376$, en sorte que l'intervalle pris pour unité est ici $1^j{,}028376$. On a ainsi, en parties du jour solaire,

$$1{,}39476 = 1^j{,}43434$$

Dans les syzygies solsticiales précédentes, on a

$$k = 0^j{,}11250,$$

ce qui donne

$$y = 1^j{,}54684$$

Pour apprécier la régularité de ces observations solsticiales des marées, on a déterminé, pour chaque année, les valeurs de $2\iota\beta'$ et de $2\iota\alpha'$, et on les a multipliées par seize, pour les comparer aux valeurs précédentes des mêmes quantités relatives aux seize années d'observations. On a formé ainsi la table suivante.

TABLE VI.

Valeurs de $2i\beta'$ et $2i\alpha'$ conclues des marées solsticiales syzygies.

	$2i\beta'$.	$2i\alpha'$.
1807	9,681	722,122
1808	10,747	738,531
1809	12,121	751,449
1810	13,557	745,930
1811	9,448	733,925
1812	11,147	732,925
1813	12,357	731,510
1814	12,208	729,610
1815	11,893	720,851
1816	9,583	701,618
1817	11,392	706,605
1818	13,034	705,261
1819	9,697	682,144
1820	9,659	679,984
1821	9,406	680,378
1822	12,446	700,525
Moyennes	11,1485	716,4630

Le peu de différence de ces valeurs de $2i\beta'$ et de $2i\alpha'$ à leurs moyennes, prouve leur régularité En les comparant aux mêmes valeurs relatives aux syzygies équinoxiales, on voit clairement l'influence des déclinaisons sur les valeurs de 2α et de 2β : la plus petite des valeurs de $2i\alpha$, dans les syzygies équinoxiales de la Table III, est 810,998 ; elle surpasse la plus grande des valeurs de $2i\alpha'$ dans les syzygies solsticiales de la Table VI, et qui ne s'élève qu'à 751,449 Pareillement, la plus petite des valeurs de $2i\beta$, dans les syzygies équinoxiales de la Table III, est 16,443, elle surpasse la plus grande des valeurs de $2i\beta'$ dans les syzygies solsticiales, qui, par la Table VI, ne s'élève qu'à 13,034. Une telle disposition n'est point l'effet du hasard, car alors, en admettant que la plus grande des trente-deux valeurs de $2i\beta$ et de $2i\beta'$, et qui, par la Table III, est 19,776, et la plus petite des ces valeurs, qui, par la Table VI, est 9,406, sont les limites entre lesquelles ces valeurs

ont pu également s'étendre, on aura la supposition la plus favorable au hasard un plus grand intervalle de limites diminuerait sa probabilité Dans cette supposition, la probabilité qu'une valeur syzygie équinoxiale de $2i\beta$ ne sera pas au-dessous de 16,443, sera

$$\frac{19,776 - 16,443}{19,776 - 9,406} \text{ ou } \frac{3,333}{10,370}.$$

Pareillement, la probabilité qu'une valeur syzygie solsticiale de $2i\beta'$ ne sera pas au-dessus de 13,034, sera

$$\frac{13,034 - 9,406}{19,776 - 9,406} \text{ ou } \frac{3,628}{10,370}$$

De là il suit, par les principes connus de la théorie des probabilités, que la probabilité qu'aucune des seize valeurs syzygies équinoxiales de $2i\beta$ ne sera au-dessous de 16,443, en même temps qu'aucune des valeurs syzygies solsticiales $2i\beta'$ ne surpassera pas 13,034, est égale à

$$\left(\frac{3,333}{10,370}\right)^{16}\left(\frac{3,628}{10,370}\right)^{16}.$$

Ce produit est moindre qu'une fraction qui, ayant l'unité pour numérateur, aurait pour dénominateur 15, suivi de quatorze zéros. L'excessive petitesse de cette fraction prouve incontestablement l'influence des déclinaisons du Soleil et de la Lune sur les valeurs de $2i\beta$ et de $2i\beta'$. Un raisonnement semblable, appliqué aux valeurs de $2i\alpha$ et de $2i\alpha'$, montre pareillement l'influence des déclinaisons sur ces valeurs.

6 J'ai considéré, d'une manière à peu près semblable, les quadratures équinoxiales suivantes

TABLE VII.

Quadratures équinoxiales

1807	1er mars	17 mars.	30 mars	8 sept	24 sept	8 octob.
1808	5	19	4 avril	13	26	12
1809	8	24	7	1	16	1
1810	13	28	11	6	20	5
1811	2	17	31 mars	9	25	9
1812	6	19	4 avril.	13	27	13
1813	9	25	7	2	17	2
1814	14	28	12	7	21	6
1815	2	18	1	10	26	10
1816	7	20	5	29 août	14	28 sept
1817	10	26	8	3 sept	17	3 octob.
1818	28 févr.	15	29 mars	7	21	7
1819	3 mars.	19	2 avril.	11	26	11
1820	7	21	6	30 août.	15	29 sept
1821	10	26	9	4 sept.	18	4 octob
1822	28 févr	15	29 mars.	8	23	7

On a pris l'excès de la haute mer du matin sur la basse mer du soir, relatif au jour même de la quadrature et aux trois jours qui la suivent. Je n'ai pas considéré six jours, comme je l'ai fait relativement aux syzygies, parce que la variation des marées quadratures étant plus rapide que celles des marées syzygies, la loi de variation proportionnelle au carré du temps ne pourrait pas, sans erreur sensible, s'étendre à un intervalle de six jours On a fait, pour chaque marée, une somme des excès relatifs à chacun des quatre jours, en doublant les résultats relatifs à la quadrature intermédiaire des trois quadratures considérées dans chaque équinoxe. On a formé ainsi la Table suivante.

TABLE VIII

Quadratures équinoxiales.

	(0)	(1)	(2)	(3)
1807	25,130	20,100	20,180	26,106
1808	26,770	20,950	20,935	26,320
1809	26,130	21,400	21,130	25,280
1810	24,500	20,974	21,483	27,080
1811	26,055	21,440	21,130	26,167
1812	26,927	21,500	20,625	25,111
1813	25,419	20,341	20,681	25,916
1814	23,861	19,754	20,004	25,943
1815	24,867	20,106	19,949	26,173
1816	25,250	19,380	21,130	23,720
1817	23,380	18,610	18,560	22,520
1818	23,860	18,330	19,010	23,610
1819	22,575	17,178	17,284	24,254
1820	23,002	16,798	16,828	23,159
1821	23,140	17,060	17,080	22,755
1822	23,228	18,102	17,024	22,045
Sommes	394,094	312,023	313,033	396,159

Si l'on nomme f, f', f'', f''' les sommes des hauteurs relatives à chacun des quatre jours, et que l'on représente la loi de ces sommes par

$$\zeta t^2 + \zeta' t + \zeta'',$$

t étant le temps écoulé depuis la haute marée du matin du jour de la quadrature, l'intervalle de deux marées quadratures du matin étant pris pour unité, on aura les quatre équations de condition suivantes

$$\begin{aligned} \zeta'' &= f, \\ \zeta + \zeta' + \zeta'' &= f', \\ 4\zeta + 2\zeta' + \zeta'' &= f'', \\ 9\zeta + 3\zeta' + \zeta'' &= f'''. \end{aligned}$$

Si l'on multiplie chacune de ces équations respectivement par leurs coefficiens de ζ, et que l'on fasse nulle la somme de leurs produits, si l'on fait les sommes semblables, relativement aux coefficiens de ζ' et de ζ''; ces trois sommes égalées à zéro, formeront les équations suivantes

$$98.\zeta + 36.\zeta' + 14.\zeta'' = f' + 4f'' + 9f''',$$
$$36\,\zeta + 14.\zeta' + 6.\zeta'' = f' + 2f'' + 3f''',$$
$$14.\zeta + 6.\zeta' + 4.\zeta'' = f + f' + f'' + f''',$$

ces équations donnent

$$\zeta = \frac{f - f' - f'' + f'''}{4},$$
$$\zeta' = \frac{-\frac{21}{2}(f - f' - f'' + f''') + 2(f''' - f'') + 4(f''' - f')}{10},$$
$$\zeta'' = \frac{f + f' + f'' + f'''}{4} - \tfrac{3}{2}.\zeta' - \tfrac{7}{2}\zeta$$

Maintenant on a

$$f = 394{,}094,\ f' = 312{,}023,\ f'' = 313{,}033,\ f''' = 396{,}159,$$

ce qui donne

$$\zeta = 41{,}29925,\ \zeta' = -\ 123{,}1812,\ \zeta'' = 394{,}0515$$

L'expression

$$\zeta t^2 + \zeta' t + \zeta'',$$

devient ainsi

$$302{,}2016 + 41{,}29925\,(t - 1{,}49131)^2; \quad (a)$$

Nommons t' la distance d'une haute marée du matin, à l'instant de la quadrature, et représentons par $\alpha'' + \beta''(t' - \gamma)^2$, cette haute marée. La hauteur de la basse mer qui la suit sera

$$-\alpha'' - \beta''(t' - \gamma + \tfrac{1}{4})^2;$$

l'excès de la haute mer sur cette basse mer sera donc

$$2\alpha'' + \frac{9\beta''}{64} + 2\beta''(t' - \gamma + \tfrac{1}{8})^2.$$

Nommons k' la valeur moyenne des quantités dont les quadratures ont suivi les hautes marées du matin, du jour de la quadrature, on aura $t' = t - k'$ La formule précédente devient ainsi, en la multipliant par le nombre ι des quadratures considérées

$$2\iota\alpha'' + \frac{2\iota\beta''}{64} + 2\iota\beta''(t - k' - y + \tfrac{1}{8})^2$$

Cette formule sera l'expression des valeurs de f, f', etc en la comparant à la formule (a), on a

$$k' + y - \tfrac{1}{8} = 1,49131,$$

ce qui donne

$$y = 1,61631 - k'$$

L'intervalle pris pour unité est l'intervalle de deux marées consécutives du matin vers les syzygies équinoxiales, et l'on verra ci-après que cet intervalle est $1^j,057828$, on aura ainsi

$$1,61631 = 1^j,70978$$

La valeur de k', relative aux marées précédentes, est $0^j,20014$, on aura donc

$$y = 1^j,50964,$$

on a ensuite

$$2\iota\beta'' = 41,29925,$$
$$2\iota\alpha'' = 301,55690$$

Pour apprécier la régularité de ces marées à Brest, on a déterminé les valeurs de $2\iota\alpha''$ et de $2\iota\beta''$ pour chaque année, et on les a multipliées par 16, ce qui a produit la Table suivante

TABLE IX.

Valeurs de $2i\beta''$ et $2i\alpha''$ conclues des marées équinoxiales en quadratures

	$2i\beta''$.	$2i\alpha''$.
1807	43,824	310,467
1808	44,820	323,148
1809	35,520	330,551
1810	36,492	318,768
1811	38,608	330,099
1812	39,732	324,982
1813	41,251	317,168
1814	36,174	310,179
1815	43,940	308,568
1816	37,040	302,939
1817	34,920	287,984
1818	40,520	287,957
1819	49,467	262,213
1820	50,140	271,685
1821	47,019	268,339
1822	40,589	269,891
Moyennes	41,2535	302,5624

Le peu de différence de ces valeurs de $2i\alpha''$ et de $2i\beta''$ à leurs moyennes, prouve la régularité de ces valeurs.

7. J'ai considéré de la même manière les quadratures solsticiales suivantes.

TABLE X

Marées quadratures solsticiales.

J'ai considéré les quadratures solsticiales suivantes

1807	13 juin	28 juin.	12 juill	6 déc	22 déc	«
1808	5 janv.	2	15 juin	1 juill	10	24 déc
1809	9	5	20	4	13	29
1810	12	10	23	9	3	19
1811	1	13	29	12	6	22
1812	6	2	16	1	11	25
1813	9	5	21	5	1	14 30 déc
1814	11 juin	24	10 juill	4	19	«
1815	2 janv	31 mai	14 juin.	29 juin	8	23
1816	7	3 juin	17	2 juill	12	26
1817	10	6	22	6	1	15 31 déc
1818	11 juin	25	11 juill	4 déc	20	«
1819	3 janv	1	14 juin	30 juin	9	23
1820	8	3	18		12	27
1821	11	7	22 juin	7 juill	2	16 31 déc
1822	12 juin	26	11 juill.	5 déc	21	4 janv 1823

On a fait, comme ci-dessus, les sommes des excès des hautes mers du matin sur les basses mers qui les suivent, pour le premier jour de la quadrature et pour les trois jours qui la suivent, ce qui a donné la Table suivante

TABLE XI.

Quadratures solsticiales.

	(0)	(1)	(2)	(3)
1807	28,720	26,495	25,310	27,135
1808	28,910	25,765	25,145	27,120
1809	28,950	26,863	24,840	25,815
1810	29,586	25,750	26,477	27,940
1811	29,319	26,445	25,943	28,034
1812	28,106	25,837	25,823	27,705
1813	26,584	24,908	26,234	28,684
1814	27,196	24,431	25,500	28,384
1815	25,780	24,787	25,285	28,224
1816	26,870	25,500	24,900	28,370
1817	25,640	24,100	25,370	28,930
1818	26,607	24,713	24,853	26,769
1819	26,611	24,677	24,304	26,574
1820	26,934	24,412	23,709	26,226
1821	27,355	25,180	24,415	26,430
1822	28,047	25,014	24,204	26,036
Sommes. .	441,215	404,877	402,312	438,376

L'ensemble de ces hauteurs donne

$$f = 441{,}215\,,\ f' = 404{,}877\,,\ f'' = 402{,}312\,,\ f''' = 438{,}376\,,$$

d'où l'on tire

$$\zeta = 18{,}1005\,,\ \zeta' = -55{,}4097\,,\ \zeta'' = 441{,}4578.$$

L'expression

$$\zeta . t^2 + \zeta' t + \zeta'',$$

devient ainsi

$$399{,}0524 + 18{,}1005\,(t - 1{,}53062)^2\,,$$

ce qui donne par un calcul semblable à celui que nous venons de faire relativement aux quadratures équinoxiales,

$$2i\beta''' = 18,1005,$$
$$2i\alpha''' = 398,7696,$$

on trouve ensuite, comme ci-dessus,

$$y = 1,65561 - k'.$$

L'intervalle pris pour unité est ici $1^{j},046847$, et la valeur de k', relative à ces marées quadratures, $0^{j},22048$, d'où l'on tire

$$y = 1^{j},51269$$

Les marées quadratures équinoxiales ont donné

$$y = 1^{j},50964,$$

la moyenne est

$$y = 1,51116,$$

c'est la quantité dont le *minimum* des marées suit la quadrature. On a vu précédemment que les marées syzygies équinoxiales et solsticiales donnent pour les valeurs correspondantes de y,

$$1^{j},48013, \quad 1^{j},54684$$

La moyenne de ces deux valeurs est $1^{j},51349$, c'est la quantité dont le *maximum* des marées suit la syzygie. On voit ainsi que cet intervalle est à très peu près égal à l'intervalle dont le minimum des marées suit la quadrature, ces deux intervalles peuvent donc être supposés égaux. Les observations anciennes m'ont donné pour ces intervalles $1^{j},50724$ et $1^{j},5077$ (Livre IV, n°s 24 et 31), ce qui est à très peu près d'accord avec les résultats des nouvelles observations.

Pour juger de la régularité des marées quadratures solsticiales dans le port de Brest, on a déterminé, pour chaque année, les valeurs de $2i\alpha'''$ et de $2i\beta'''$, en les multipliant par seize, ce qui a produit la Table suivante

TABLE XII.

Valeurs de $2\iota\beta'''$ et $2\iota\alpha'''$ conclues des marées solsticiales en quadratures.

	$2\iota\beta'''$	$2\iota\alpha'''$.
1807	16,200	408,743
1808	20,480	400,719
1809	12,248	403,736
1810	21,196	411,650
1811	19,860	413,200
1812	16,604	408,811
1813	16,504	402,496
1814	22,596	392,835
1815	15,728	393,822
1816	19,360	397,539
1817	20,400	396,448
1818	15,240	396,466
1819	16,816	387,373
1820	20,160	377,789
1821	16,760	401,355
1822	19,427	387,027
Moyennes	18,0312	398,7504

En comparant ces valeurs de $2\iota\alpha'''$ et de $2\iota\beta'''$ à celles qui sont relatives aux marées quadratures équinoxiales, on voit clairement l'influence des déclinaisons des astres sur ces valeurs Dans les quadratures équinoxiales, la déclinaison du Soleil est presque nulle, et la déclinaison de la Lune est vers son *maximum;* le contraire a lieu dans les quadratures solsticiales où la déclinaison de la Lune est fort petite, et celle du soleil, vers son *maximum* Dans les quadratures équinoxiales, la plus grande des valeurs de $2\iota\alpha''$ a été, par la Table IX, égale à 330,551, valeur inférieure à la plus petite des valeurs de $2\iota\alpha'''$ relatives aux quadratures solsticiales, et qui, par la Table XI, est 377,789

Au contraire, la plus petite des valeurs de $2i\beta''$ des marées quadratures équinoxiales de la Table IX, et qui est 34,920, surpasse la plus grande des valeurs de $2i\beta'''$ des marées quadratures solsticiales de la Table XI, qui est 22,596. En appliquant à ces valeurs le raisonnement que nous avons fait, dans ce qui précède, sur les valeurs de $2i\alpha$ et de $2i\beta$ relatives aux marées syzygies, on verra que cette disposition n'est point l'effet du hasard, et qu'elle indique d'une manière incontestable, l'influence des déclinaisons des astres sur ces valeurs, dans les marées quadratures comme dans les marées syzygies

8 Toutes ces valeurs de $2i\alpha$ et de $2i\beta$ sont autant de phénomènes très propres à vérifier la théorie du flux et du reflux de la mer fondée sur la loi de la pesanteur universelle Mais avant de les comparer à cette théorie, je vais les comparer aux valeurs semblables que j'ai déduites dans le quatrième Livre, des observations anciennes Ces observations sont relatives à vingt-quatre syzygies et à vingt-quatre quadratures, tandis que les observations modernes se rapportent à cent vingt-huit syzygies, et à cent vingt-huit quadratures. Il faut donc, pour comparer les résultats anciens aux modernes, diminuer ceux-ci dans le rapport de 3 à 16 On aura ainsi

Syzygies équinoxiales.

Observations modernes	Observations anciennes.
$48.\alpha = 153^{mc},711$	$150^{mc},235$
$48.\beta = 3,388$	$3,163.$

Syzygies solsticiales.

$48.\alpha' = 134,325$	$132,371$
$48.\beta' = 2,078$	$1,945.$

Quadratures équinoxiales.

$48.\alpha'' = 56,561$	$58,033$
$48.\beta'' = 7,744$	$7,495.$

Quadratures solsticiales.

$48.\alpha''' = 74,769$	$75,517$
$48.\beta''' = 3,394$	$3,410.$

On voit, par l'inspection de ce tableau, que les résultats des observations modernes s'accordent avec ceux des observations anciennes aussi bien qu'on peut l'attendre, vu les différences que peuvent y produire les différences des déclinaisons de la Lune aux deux époques

9 Comparons maintenant les résultats des observations, avec les formules du chapitre précédent. Dans les syzygies et dans les quadratures, que nous venons de considérer, on a, comme on vient de le voir,

$$2\iota\alpha = 819{,}7895, \quad 2\iota\alpha' = 716{,}4025,$$
$$2\iota\alpha'' = 301{,}5569, \quad 2\iota\alpha''' = 398{,}7696$$

On a trouvé ensuite

$$P = 127{,}24259, \quad Q = 108{,}46527,$$
$$P' = 126{,}86464, \quad Q' = 108{,}34089,$$
$$P_1 = 127{,}24138, \quad Q_1 = 108{,}46814,$$
$$P_1' = 126{,}77883, \quad Q_1' = 108{,}40258$$

En substituant ces valeurs de P, Q, P', etc, dans les expressions de $2\iota\alpha$, $2\iota\alpha'$, etc, du chapitre précédent, et comparant ces expressions à leurs valeurs données par les observations, on a formé les quatre équations suivantes

$$\begin{aligned} 819{,}7895 = {} & 127{,}24259 \cdot \frac{2AL}{r^3} + 126{,}86464 \cdot 1{,}02734 \cdot \frac{2A'L'}{r'^3} \\ & - 9{,}38866 \cdot \frac{(A-B)}{A} \cdot \frac{2AL}{r^3} \\ & - 9{,}26187\ 1{,}02734 \cdot \frac{(A'-B)}{A'} \cdot \frac{2A'L'}{r'^3}, \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 716{,}4025 = {} & 108{,}46527 \cdot \frac{2AL}{r^3} + 108{,}34089 \cdot 1{,}02734 \cdot \frac{2A'L'}{r'^3} \\ & + 9{,}38866 \frac{(A-B)}{A} \cdot \frac{2AL}{r^3} \\ & + 9{,}26187 \cdot 1{,}02734 \cdot \frac{(A'-B)}{A'} \cdot \frac{2A'L'}{r'^3}; \quad (2) \end{aligned}$$

$$301{,}5569 = 108{,}40258 . 0{,}97266 \frac{2A'L'}{\bar{r}'^3} - 127{,}24138 . \frac{2AL}{r^3}$$

$$+ \quad 9{,}38662 \frac{(A-B)}{A} . \frac{2AL}{r^3}$$

$$+ \quad 9{,}18812 . 0{,}97266 . \frac{(A'-B)}{A} . \frac{2A'L'}{\bar{r}'^3}, \qquad (3)$$

$$398{,}7696 = 126{,}77883 . 0{,}97266 . \frac{2A'L'}{\bar{r}'^3} - 108{,}46814 . \frac{2AL}{r^3}$$

$$- \quad 9{,}38662 \frac{(A-B)}{A} . \frac{2AL}{r^3}$$

$$- \quad 9{,}18812 . 0{,}97266 . \frac{(A'-B)}{A'} . \frac{2A'L'}{\bar{r}'^3}. \qquad (4)$$

Dans toutes ces équations, r et $\bar{r}'$ sont les moyennes distances du Soleil et de la Lune à la Terre.

Le système $+(1)+(2)$ des équations précédentes donne

$$1536{,}1920 = 235{,}70786 . \frac{2AL}{r^3} + 235{,}20551 . 1{,}02734 \frac{2A'L'}{\bar{r}'^3} \qquad (5)$$

Le système des équations $+(3)+(4)$ donne

$$700{,}3265 = 235{,}18141 . 0{,}97266 . \frac{2A'L'}{\bar{r}'^3} - 235{,}70952 . \frac{2AL}{r^3}. \qquad (6)$$

De ces deux équations, on tire

$$\frac{2A'L'}{\bar{r}'^3} = 4{,}75468, \qquad \frac{2AL}{r^3} = 1{,}64308.$$

Le système des équations $+(1)-(2)$ donne

$$103{,}3870 = 18{,}77732 . \frac{2AL}{r^3} + 18{,}52375 . 1{,}02734 . \frac{2A'L'}{\bar{r}'^3}$$

$$- 18{,}77732 . \frac{(A-B)}{A} . \frac{2AL}{r^3}$$

$$- 18{,}52375 . 1{,}02734 . \frac{(A'-B)}{A'} . \frac{2A'L'}{\bar{r}'^3}. \qquad (7)$$

Le système des équations $+(4)-(3)$ donne

$$97{,}2127 = 18{,}77324 . \frac{2AL}{r^3} + 18{,}37625 . 0{,}97266 . \frac{2A'L'}{r'^3}$$
$$- 18{,}77324 . \frac{(A-B)}{A} . \frac{2AL}{r^3}$$
$$- 18{,}37625 . 0{,}97266 \frac{(A'-B)}{A'} . \frac{2A'L'}{r'^3}. \qquad (8)$$

En substituant pour $\frac{2AL}{r^3}$ et $\frac{2A'L'}{r'^3}$, leurs valeurs précédentes, l'équation (7) donne

$$17{,}9481 = 30{,}8527 . \frac{A-B}{A} + 90{,}4824 . \frac{A'-B}{A'}. \qquad (9)$$

L'équation (8) donne

$$18{,}6159 = 30{,}8460 . \frac{(A-B)}{A} + 84{,}9826 . \frac{(A'-B)}{A'}. \qquad (10)$$

On a, comme on l'a vu dans le chapitre précédent,

$$A = (1 + mx) . B, \qquad A' = (1 + m'x) . B;$$

ce qui donne

$$\frac{A-B}{A} = \frac{mx}{1+mx}; \quad \frac{A'-B}{A'} = \frac{m'x}{1+m'x}.$$

On a de plus $\frac{m}{m'} = 0{,}0748$; on a donc, en ajoutant les équations (9) et (10),

$$36{,}5640 = 4{,}6151 . \frac{m'x}{1+0{,}0748 . m'x} + 175{,}4650 . \frac{mx'}{1+m'x}; \qquad (11)$$

d'où l'on tire

$$m'x = 0{,}25291;$$

ce qui donne

$$\frac{2B\ L'}{r'^3} = 3{,}79491;$$
$$\frac{2B\ L}{r^3} = 1{,}612572;$$

et par conséquent

$$\frac{\frac{L'}{r'^3}}{\frac{L}{r^3}} = 2,35333$$

Ce rapport est très important pour l'Astronomie. En l'appliquant aux formules du n° 35 du Livre V, et du n° 30 du Livre VI, on trouve en secondes sexagésimales 9″,4 pour le coefficient du principal terme de la nutation, et 6″,9 pour le coefficient de l'équation lunaire des Tables du Soleil. Il donne de plus la masse de la Lune égale à celle de la Terre divisée par 74,946.

On a considéré dans chaque syzygie, la hauteur de la pleine mer du soir au-dessus de la basse mer du matin, pendant six jours consécutifs, à partir du jour qui précède la syzygie; or, l'intervalle de la syzygie au *maximum* de la pleine mer étant d'un jour et demi, celui des marées extrêmes de ces six jours à ce *maximum* serait au moins de deux jours et demi, ce qui peut paraître trop considérable pour y appliquer la loi d'une variation de la haute mer, proportionnelle au carré de sa distance au *maximum*. Il était donc intéressant de voir ce que l'on obtiendrait, en se bornant à considérer quatre jours dans les syzygies, comme on l'a fait dans les quadratures. On a obtenu ainsi, relativement aux syzygies équinoxiales précédentes, la loi des valeurs de f, f', etc., représentée par

$$\begin{aligned} &819,1670 - 17,7520\,(t - 2,47092)^2, \\ &2i\alpha = 819,4424, \\ &2i\beta = 17,7520. \end{aligned}$$

Les six jours avaient donné, par ce qui précède,

$$\begin{aligned} &819,5070 - 18,06977\,(t - 2,46398)^2, \\ &2i\alpha = 819,7895, \\ &2i\beta = 18,0698, \end{aligned}$$

ce qui diffère très peu des quantités précédentes.

Pareillement, dans les syzygies solsticiales, quatre jours ont donné

$$716{,}3726 - 11{,}4155\,(t - 2{,}49194)^2$$
$$2i\alpha' = 716{,}7469,$$
$$2i\beta' = 11{,}4155;$$

et par ce qui précède, six jours avaient donné

$$716{,}2293 - 11{,}08515\,(t - 2{,}51976)^2,$$
$$2i\alpha' = 716{,}40250,$$
$$2i\beta' = 11{,}08515;$$

ce qui diffère peu des quantités précédentes. En substituant ces nouvelles valeurs de $2i\alpha$ dans les équations (1) et (2), on voit qu'il n'en peut résulter qu'une variation presque insensible, dans le rapport de $\frac{L'}{r'^3}$ à $\frac{L}{r^3}$; ce qui confirme la valeur que nous en avons donnée.

On voit encore, par l'inspection de l'équation (11), que cette valeur ne dépend que fort peu de la supposition que nous avons faite; savoir, que $A' - B$ étant $m'x$, $A - B$ sera mx; car en faisant même $A - B = 2mx$, ce qui revient à changer $m'x$ en $2m'x$ dans le premier terme du second membre de cette équation, la valeur de $m'x$ sera peu changée, ainsi que la valeur du rapport de $\frac{L'}{r'^3}$ à $\frac{L}{r^3}$.

Les valeurs de $2i\alpha$, $2i\alpha'$, $2i\alpha''$ et $2i\alpha'''$, déduites des observations, nous font connaître ces quatre choses, les actions des deux astres, et leurs accroissemens dus aux circonstances accessoires; elles suffisent pour déterminer les valeurs de $2i\beta$, $2i\beta'$, $2i\beta''$, $2i\beta'''$, au moyen des équations (M) et (N) du chapitre précédent, dans lesquelles on doit observer que $l' = l - (m' - m)\,t''$.

On ne doit avoir égard ici qu'à l'inégalité lunaire de la variation, ou $s = 2\,(m' - m)$ En prenant ensuite pour unité, comme nous l'avons fait, l'intervalle d'une pleine mer à la pleine mer correspondante du jour suivant, la partie de la formule (M), qui dépend de l' et de t'', donnera les valeurs de $2i\beta$, $2i\beta'$, etc., en y changeant t'' en $1' + R$, R étant le retard journalier de la marée, retard que donnent les Tables XIII, XIV, XV et XVI, en faisant $l' = \frac{2\pi R}{1'}$,

parce que l est le retard journalier de la marée réduit en arc, à raison de la circonférence entière pour un jour, enfin, en multipliant les résultats par 2ι. J'ai obtenu ainsi les valeurs suivantes :

Syzygies équinoxiales

Formule	Observation
$2\iota\beta = 18,82$.....	.....$18^m,07$

Syzygies solsticiales.

$2\iota\beta' = 12,41$.....	.....$11,09$

Quadratures équinoxiales

$2\iota\beta'' = 45,41$.....	.....$41,30$

Quadratures solsticiales

$2\iota\beta''' = 19,12$...	.....$18,03$

Si l'on considère toutes les causes d'erreur, soit des observations, soit des approximations des formules, soit enfin des hypothèses employées, causes que nous avons développées dans le premier chapitre, on verra dans le peu de différence des valeurs calculées aux valeurs observées, une grande confirmation de la loi de la pesanteur universelle.

10 Je vais présentement considérer l'influence des variations des distances de la Lune à la Terre sur les marées. On a choisi dans les observations syzygies équinoxiales ci-dessus employées, celles où le demi-diamètre de la Lune surpassait de $118''$ centésimales son demi-diamètre moyen apparent, on en a trouvé 34. On a choisi pareillement les observations syzygies où le demi-diamètre moyen surpassait de $118''$ le demi-diamètre apparent, elles sont au nombre de 24. Les époques de ces syzygies sont comprises dans la Table suivante

TABLE XIII.

ANNÉES.	APOGÉE.	PÉRIGÉE
1807	9 mars, 8 avril, 16 septemb	23 mars, 2 septemb, 1er oct.
1808	27 mars, 4 octobre	12 mars, 10 avril, 20 sept
1809	. . . . .	31 mars, 9 octobre.
1811	17 septembre	2 septembre, 2 octobre
1812	27 mars, 5 septemb, 5 octob.	13 mars, 11 avril, 20 sept.
1813	17 mars, 24 septembre	2 mars, 1er avril, 10 octob.
1815	18 septembre	3 septembre, 2 octobre
1816	28 mars, 6 septemb, 6 octob.	13 mars, 12 avril, 21 sept.
1817	17 mars, 25 septembre	3 mars, 1er avril, 11 sept, 10 octobre.
1818	. . . . .	22 mars
1820	29 février, 29 mars, 7 sept., 7 octobre.	14 mars, 22 septembre.
1821	18 mars, 26 septembre	4 mars, 2 avril, 11 sept., 11 octobre
1822	6 avril	23 mars, 30 septembre
	24 observations apogées	34 observations périgées

On a pris comme ci-dessus, dans chaque syzygie, les hauteurs des marées du soir, au-dessus des basses mers du matin, du jour qui précède la syzygie, du jour de la syzygie et des quatre jours qui la

suivent. En faisant une somme de ces hauteurs, on a obtenu les résultats suivans pour les 24 syzygies apogées :

$$f = 123{,}103; \quad f' = 131{,}148; \quad f'' = 133{,}739;$$
$$f''' = 132{,}486, \quad f^{\text{iv}} = 127{,}618, \quad f^{\text{v}} = 118{,}300.$$

Les trente-quatre syzygies périgées ont donné

$$f = 200{,}009, \quad f' = 227{,}162, \quad f'' = 242{,}877;$$
$$f''' = 244{,}178, \quad f^{\text{iv}} = 231{,}418; \quad f^{\text{v}} = 204{,}301.$$

Le nombre total de ces syzygies étant 58, pour les réduire au même nombre, on a multiplié par $\frac{29}{24}$ les valeurs de f, f', etc., relatives aux 24 syzygies apogées, et par $\frac{29}{34}$, les mêmes valeurs relatives aux 34 syzygies périgées, et l'on a trouvé par la méthode du n° 4,

$$161{,}83 - 2{,}5150\,(t - 2{,}25389)^2$$

pour la formule qui représente les valeurs de f, f', etc apogées, multipliées par $\frac{29}{24}$, et

$$209{,}05 - 5{,}867\,(t - 2{,}57390)^2$$

pour la formule qui représente ces valeurs périgées et multipliées par $\frac{29}{34}$

De là on a conclu, pour les observations apogées,

$$2i\alpha = 161{,}87; \quad 2i\beta = 2{,}515,$$

et pour les observations périgées,

$$2i\alpha = 209{,}14, \quad 2i\beta = 5{,}863.$$

On voit ainsi la grande influence des variations de la distance de la Lune à la Terre, sur les valeurs de $2i\alpha$, et de $2i\beta$ Dans les observations précédentes, l'excès des valeurs périgées sur les valeurs apogées a été 47,27 relativement à $2i\alpha$, et 3,352, relativement à $2i\beta$

La somme des deux valeurs de $2i\alpha$, et celle des deux valeurs de $2i\beta$,

répondent à 58 syzygies équinoxiales dans lesquelles la Lune serait à sa moyenne distance En multipliant donc ces sommes par $\frac{128}{58}$, on doit retrouver à fort peu près les valeurs de $2i\alpha$ et de $2i\beta$ trouvées dans le n° 4. Cette multiplication donne

$$2i\alpha = 818,7829; \qquad 2i\beta = 18,498,$$

ce qui diffère très peu des valeurs 819,7895 et 18,0698 données dans le n° 4

Pour comparer ces résultats, à la formule (M) du chapitre précédent, nous observerons que cette formule donne pour l'excès des deux valeurs de $2i\alpha$

$$\frac{4A'L'}{r'^3}.\cos(sT+\theta')\left[-3hP' + \frac{fsx}{1+m'x}\frac{(P'+Q')}{2} + \frac{3hm'x}{2(1+m'x)}(P'-Q')\right].$$

On doit observer ici que h et f ne sont pas relatifs à la seule équation du centre de la Lune, mais encore à l'inégalité de l'évection, et que l'on peut supposer à très peu près relativement à ces deux inégalités, $f = -2h$, et $s = m'$ On peut observer encore que

$$-6h.\cos(sT+\theta') = \frac{\bar{r}'^3}{r'^3} - \frac{\bar{r}'^3}{r''^3},$$

r' étant le rayon vecteur de la Lune dans les syzygies périgées précédentes, et r'' étant ce même rayon dans les syzygies apogées La fonction précedente prend ainsi cette forme

$$\frac{2A'L'}{F^3}\left(\frac{\bar{r}'^3}{r'^3}P' - \frac{\bar{r}'^3}{r''^3}P'\right)\left(1 + \frac{2}{3}\,\frac{m'x'}{1+m'x}.\frac{P'+Q'}{2P'} - \frac{m'x}{1+m'x}.\frac{P'-Q'}{2P'}\right)$$

Pour déterminer le facteur

$$\frac{\bar{r}'^3 P'}{r'^3} - \frac{\bar{r}'^3 P'}{r''^3},$$

on a fait dans chaque syzygie périgée, le produit du carré du cosinus de la déclinaison de la Lune au moment de la syzygie, par le cube du rapport de sa parallaxe au même moment, à sa parallaxe moyenne : on

a fait la somme de ces produits, et on l'a multipliée par $\frac{29}{34}$. On a fait une somme semblable pour les syzygies apogées, et on l'a multipliée par $\frac{29}{24}$ On a eu ainsi avec exactitude, la valeur numérique du facteur précédent, que l'on a trouvée égale à 9,7689 On a ensuite à fort peu près $\frac{m'x}{1+m'x} = \frac{1}{5}$, et l'on peut déterminer sans erreur sensible, les facteurs $\frac{P'+Q'}{2P'}$ et $\frac{(P'-Q')}{2P'}$, en faisant usage des valeurs de P′ et de Q′, relatives aux 128 marées syzygies des n°s 4 et 5 On a eu ainsi pour l'excès la valeur de $2\iota\alpha$ périgée sur sa valeur apogée, 51,52 L'observation a donné 47,27 la différence 4,25 doit-elle être attribuée aux erreurs soit des observations, soit des approximations, soit enfin des suppositions dont nous avons fait usage? C'est ce qu'un plus grand nombre d'observations, et des approximations analytiques portées plus loin, pourront décider

Quant à l'excès de la valeur de $2\iota\beta$ périgée sur la valeur de $2\iota\beta$ apogée, la formule (M) du chapitre II donne 3,3 pour cet excès, et l'observation donne 3,4 Ainsi l'observation et la théorie s'accordent à très peu près

CHAPITRE IV.

Comparaison de l'analyse avec les observations des heures et des intervalles des marées.

11 Pour déterminer les heures et les intervalles des marées, on a considéré dans les syzygies employées précédemment pour leurs hauteurs, les heures de la basse mer du matin et de la haute mer du soir du premier jour qui suit la syzygie, et leurs accroissemens au jour suivant, en doublant les résultats relatifs à la syzygie la plus voisine de l'équinoxe ou du solstice On a fait une somme des heures relatives à chaque année, et en la divisant par huit, nombre des syzygies employées, on a formé les deux tables suivantes Les heures observées ont été comptées en temps vrai Mais il est facile de s'assurer que l'équation du temps disparaît des heures suivantes conclues de l'ensemble des syzygies

TABLE XIV

Des heures et des intervalles des marées.

Syzygies équinoxiales

ANNÉES	HEURES du premier jour après la syzygie	ACCROISSEMENT de l'heure au second jour	PREMIER JOUR	ACCROISSEMENT
	Haute mer.		Basse mer	
1807	0j 67795	0j 026690	0j 41988	0j 027210
1808	0,68442	0,023784	0,42768	0,025521
1809	0,67894	0,026401	0,42287	0,027880
1810	0,68364	0,027776	0,42760	0,027558
1811	0,67835	0,026977	0,42292	0,026041
1812	0,68142	0,027511	0,42205	0,027430
1813	0,68880	0,027522	0,43213	0,027977
1814	0,68551	0,026470	0,42899	0,027167
1815	0,68671	0,026134	0,43003	0,026737
1816	0,68185	0,026481	0,42517	0,026917
1817	0,68368	0,026215	0,42760	0,026215
1818	0,68151	0,024397	0,42961	0,023172
1819	0,67838	0,023785	0,42231	0,023958
1820	0,68185	0,024652	0,42579	0,024907
1821	0,67282	0,023611	0,41711	0,024213
1822	0,67760	0,027685	0,42231	0,027338
Moyennes.	0,681464	0,026006	0,425259	0,026265

TABLE XV

Des heures et des intervalles des marées

Syzygies solsticiales

ANNÉES	HEURES du premier jour après la syzygie.	ACCROISSEMENT de l'heure au second jour	PREMIER JOUR.	ACCROISSEMENT
	Haute mer.		Basse mer.	
1807	0j 68842	0j 028598	0j 43169	0j 027812
1808	0,68706	0,027475	0,42951	0,026331
1809	0,68030	0,028253	0,42470	0,026863
1810	0,68923	0,027429	0,43177	0,027600
1811	0,67792	0,027164	0,42036	0,027908
1812	0,68447	0,029328	0,43144	0,028803
1813	0,68220	0,028388	0,42509	0,027432
1814	0,67830	0,028901	0,42153	0,028032
1815	0,67361	0,029514	0,41806	0,028913
1816	0,67882	0,027871	0,42197	0,028287
1817	0,68030	0,028546	0,42344	0,028819
1818	0,67977	0,027685	0,42282	0,027778
1819	0,68385	0,029167	0,42865	0,028564
1820	0,67613	0,028218	0,42431	0,028218
1821	0,67795	0,029422	0,42240	0,030996
1822	0,66623	0,029259	0,41094	0,030463
Moyennes	0,680285	0,028451	0,424292	0,028301

On a considéré pareillement dans les marées quadratures employées ci-dessus pour la détermination des hauteurs, les heures de la haute mer du matin et de la basse mer du soir du premier jour qui suit le jour de la quadrature, et leurs accroissemens au jour suivant, en dou-

blant les résultats relatifs à la quadrature la plus voisine de l'équinoxe ou du solstice On a fait une somme des heures relatives à chaque année, et en la divisant par le nombre des quadratures employées, on a formé les deux tables suivantes

TABLE XVI

Quadratures équinoxiales

ANNÉES	HEURES du premier jour après la quadrature	ACCROISSEMENT de l'heure au second jour	PREMIER JOUR	ACCROISSEMENT
	Haute mer		Basse mer	
1807	0j 38589	0j 061633	0j 64959	0j 063195
1808	0,37843	0,054561	0,65204	0,052210
1809	0,39531	0,052431	0,65417	0,057244
1810	0,40183	0,057372	0,66302	0,059676
1811	0,39215	0,054167	0,65646	0,059916
1812	0,38941	0,053043	0,65148	0,054769
1813	0,40442	0,052523	0,66657	0,053391
1814	0,39879	0,059294	0,66051	0,062928
1815	0,40720	0,057210	0,66676	0,059884
1816	0,40616	0,055994	0,66935	0,061464
1817	0,39583	0,062327	0,66016	0,062153
1818	0,38949	0,057465	0,65278	0,062847
1819	0,39975	0,060069	0,66163	0,060591
1820	0,38447	0,056158	0,64948	0,056690
1821	0,39462	0,060509	0,65312	0,061203
1822	0,40477	0,058681	0,66858	0,055903
Moyennes. .	0,395542	0,057090	0,658481	0,058566

TABLE XVII

Quadratures solsticiales

ANNÉES	HEURES du premier jour après la quadrature	ACCROISSEMENT de l'heure au second jour	PREMIER JOUR	ACCROISSEMENT.
	Haute mer		Basse mer	
1807	0j 40469	0j 050520	0j 66806	0j 046875
1808	0,39644	0,046922	0,66072	0,045961
1809	0,39470	0,045394	0,65373	0,047130
1810	0,40464	0,048703	0,66632	0,045833
1811	0,39254	0,047396	0,65577	0,045449
1812	0,40313	0,049827	0,66545	0,050356
1813	0,40704	0,047999	0,66884	0,048426
1814	0,41275	0,048702	0,67951	0,049132
1815	0,39296	0,045231	0,65386	0,045579
1816	0,41363	0,043214	0,67301	0,044525
1817	0,40816	0,046089	0,67058	0,045660
1818	0,40538	0,044352	0,66684	0,043656
1819	0,39157	0,045832	0,65095	0,047070
1820	0,39435	0,048019	0,65573	0,049306
1821	0,40893	0,047222	0,67397	0,046272
1822	0,40442	0,046436	0,66944	0,046008
Moyennes	0,402206	0,046991	0,664548	0,046702

L'effet des déclinaisons des astres sur les retards journaliers des marées est évident dans les seize années : le retard le plus grand des marées syzygies équinoxiales a été au-dessous de la moyenne des retards des marées syzygies solsticiales, et le plus petit retard des marées syzygies solsticiales a surpassé la moyenne des retards des marées syzygies équinoxiales. Dans les quadratures équinoxiales, le plus petit retard

journalier des marées quadratures équinoxiales a surpassé le plus grand retard des marées quadratures solsticiales.

En prenant une moyenne entre les retards journaliers des hautes et des basses mers, on a pour ces retards

Syzygies		Quadratures	
Equinoxes	$0^j,026136$	Equinoxes.	$0^j,057828$
Solstices	$0,028376$	Solstices	$0,046846$

Les observations anciennes m'ont donné dans le quatrième livre, les retards suivans

Syzygies		Quadratures	
Equinoxes	$0^j,025503$	Equinoxes	$0^j,057495$
Solstices	$0,028600$	Solstices	$0,046643$

Nous retrouvons donc ici, entre les observations anciennes et modernes, le même accord que nous avons trouvé dans le troisième chapitre, relativement aux hauteurs des marées et à leur variation

L'heure de la basse mer du matin du jour qui suit la syzygie équinoxiale a été $0^j,425259$. En lui ajoutant un quart de jour, plus un quart du retard journalier des marées syzygies équinoxiales, on doit avoir l'heure de la haute mer du soir, si la mer à Brest emploie autant de temps à monter qu'à descendre, on a ainsi pour cette heure, $0^j,681793$ L'observation donne $0^j,681464$ La différence est $22'',9$. Les syzygies solsticiales donnent $110'',8$ de différence

L'heure de la haute mer du matin du jour qui suit la quadrature équinoxiale est $0^j,395542$ En lui ajoutant un quart de jour plus un quart du retard journalier de la marée, on a $0^j,65999$ pour l'heure de la basse mer du soir L'observation donne $0^j,658481$, la différence est $151'',8$ Les quadratures solsticiales donnent $-6'',3$ pour cette différence Toutes ces différences me paraissent être dans les limites des erreurs des observations. Suivant les observations anciennes, le temps de la descente de la marée surpassait de 1600^m environ celui de l'ascension Cette différence peut tenir à la manière dont on évaluait les momens de la haute et de la basse mer On a prescrit dans les observations modernes, de prendre un milieu entre les deux instans où la mer revient à la même hauteur, un peu avant et un peu après son *maximum* ou son *minimum*

La moyenne des retards journaliers des marées est $0^j,0272561$ dans les syzygies, et $0^j,052337$ dans les quadratures Les observations anciennes m'ont donné dans le quatrième livre, pour les nombres correspondans, $0^j,027052$, et $0^j,052067$, ce qui s'accorde à fort peu près L'heure de la haute mer du matin du jour de la quadrature est égale à l'heure de la haute mer du matin du jour qui la suit, diminuée du retard journalier des marées quadratures, mais l'heure moyenne de cette dernière marée, est $0^j,398874$, l'heure de la haute mer du matin du jour de la quadrature est donc $0^j,346537$

Cette heure a précédé la quadrature dans les observations employées, de $0^j,7103$ En prenant donc un jour et demi, pour la distance du *minimum* des marées, à la quadrature, la distance de la marée du matin du jour de la quadrature à ce *minimum* sera $1^j,7103$, ce qui, à raison d'un accroissement de $0^j,052337$ pour $1^j,052337$, donne $0^j,085063$, qui, ajouté à l'heure $0^j,346537$, donne pour l'heure du *minimum* des hautes marées à Brest $0^j,431600$ c'est l'heure de la basse marée solaire On trouve par un procédé semblable, $0^j,441170$ pour l'heure du *minimum* de la basse mer dans les syzygies, et, par conséquent, pour l'heure de la basse mer solaire, conclue des observations syzygies, la différence $957''$ indique une anticipation des heures des marées quadratures, sur les heures des marées syzygies Les observations des heures des hautes mers syzygies et des basses mers quadratures, dont les *maxima* correspondent à la haute mer solaire, indiquent à peu près la même anticipation Les observations anciennes m'avaient donné cette anticipation égale à $850''$, dans le n° 39 du Livre IV Tient-elle, comme je le pensais alors, à de légers écarts du principe de la coexistence des oscillations très petites, ou des autres suppositions que nous avons employées? Ne peut-elle pas dépendre des erreurs des approximations? C'est ce que les observations ultérieures et de nouvelles recherches pourront faire connaître

Nous allons maintenant comparer les intervalles observés des marées, à la formule (N) du chapitre précédent Cette formule donne les résultats numériques suivans

	Retards calculés	Retards observés en temps moyen.
Syzygies équinoxiales....	$0^j,024506$	$0^j,25918$
Syzygies solsticiales.	$0^j,029047$	$0^j,28615$
Quadratures équinoxiales ..	$0^j,065320$	$0^j,05761$
Quadratures solsticiales....	$0^j,046187$	$0^j,04668$

La réduction des retards en temps moyen a été faite en observant que dans les équinoxes, le jour moyen surpasse le jour vrai, de 0',000218, et que dans les solstices, le jour vrai surpasse le jour moyen, de 0',000238

Le retard journalier des marées est augmenté quand la parallaxe lunaire augmente, et il est diminué quand elle diminue. Les heures observées des marées du premier et du second jour après la syzygie, ont donné dans les syzygies périgées considérées ci-dessus, 0',02899, et dans les syzygies apogées, 0',02227 La formule (N) du chapitre précédent donne 0',02878 et 0',01912

CHAPITRE V.

Des flux partiels dont la période est à peu près d'un jour.

12 Ces flux étant fort peu considérables à Brest, on peut négliger dans leur expression, les quantités très petites. Ils dépendent des sinus de $nt + \varpi$ et $nt + \varpi - 2\varphi$, dans l'expression des forces données dans le chapitre II. Si l'on néglige le cube de $\sin \varepsilon$, l'expression de l'action solaire relative à ces flux sera

$$\frac{3L}{2r^3} . \sin\theta . \cos\theta . \left\{ \begin{matrix} \sin \varepsilon . \sin (nt + \varpi) \\ - \sin \varepsilon . \sin (nt + \varpi - 2\varphi) \end{matrix} \right\}.$$

Elle produit deux flux partiels que nous pouvons exprimer par

$$H . \sin \varepsilon . \sin (nt + \varpi - F) - H_1 . \sin \varepsilon . \sin (nt + \varpi - 2mt - F_1),$$

H, F, H_1 et F_1 étant des constantes arbitraires. L'action lunaire produit pareillement deux flux partiels que nous pouvons exprimer par

$$H' . \sin \varepsilon' . \sin (nt + \varpi - F') - H'_1 . \sin \varepsilon . \sin (nt + \varpi - 2m't - F_1')$$

On doit observer que l'on a

$$H' = \frac{HL'}{L} . \frac{r^3}{r'^3}.$$

Au moment de la pleine mer syzygie du soir à Brest, on a par le chapitre II,

$$2nt + 2\varpi - 2mt - 2\lambda = 2i\pi + 2l,$$
$$2nt + 2\varpi - 2m't - 2\lambda' = 2i'\pi + 2l',$$

on a ensuite

$$t = T + y + t'',$$

y étant égal à $\frac{\lambda'-\lambda}{m'-m}$ Les flux partiels dont la période est à peu près d'un jour, seront ainsi

$$\begin{aligned}
&\mathrm{H}\sin\varepsilon.\sin(\lambda+m\mathrm{T}+my-\mathrm{F}+l+mt'')\\
&-\mathrm{H}_1\sin\varepsilon.\sin(\lambda-m\mathrm{T}-my-\mathrm{F}_1+l-mt'')\\
&+\mathrm{H}'\sin\varepsilon'\sin(\lambda+m\mathrm{T}+my-\mathrm{F}'+l+mt'')\\
&-\mathrm{H}_1'\sin\varepsilon'\sin[\lambda-(2m'-m)y-2(m'-m)\mathrm{T}-m\mathrm{T}-\mathrm{F}_1'-(2m'-m)t''+l]
\end{aligned}$$

Dans les syzygies solsticiales d'été, $2(m'-m)\mathrm{T}$ est nul, ou un multiple de la circonférence, et $m\mathrm{T}=\frac{\pi}{2}$, l'expression précédente se transforme par là dans celle que l'on obtient en y faisant T nul, en changeant le signe sin dans le signe cos., et en donnant le signe $+$ au second et au quatrième termes Si l'on développe cette expression ainsi transformée, dans une série ordonnée par rapport aux puissances de t'' et de l, et à leurs produits, la partie indépendante de ces quantités sera l'expression du flux dont la période est d'un jour, au moment du *maximum* de la marée dont la période est d'un demi-jour Donnons à cette expression, la forme

$$\mathrm{M}.\sin\lambda+\mathrm{N}.\cos\lambda.$$

On aura, à fort peu près, l'expression de ce flux au moment de la basse mer du matin, en changeant λ en $\lambda-\frac{\pi}{2}$, ce qui donne

$$-\mathrm{M}.\cos\lambda+\mathrm{N}.\sin\lambda,$$

et l'on aura à peu près l'expression du même flux, au moment de la haute mer du matin, en changeant λ en $\lambda-\pi$, ce qui donne

$$-\mathrm{M}.\sin\lambda-\mathrm{N}\cos\lambda$$

Dans les solstices d'hiver où $m'\mathrm{T}=3\pi$, toutes ces expressions changent de signe

Exprimons l'ensemble des flux partiels dont la période est à peu près d'un jour, par

$$\mathrm{R}.\cos(nt+\varpi-mt-\lambda_1)$$

comme on peut le faire pendant le jour du *maximum* de la marée semi-diurne λ_1 sera l'heure de ce flux, le soir Au moment de la

pleine marée du soir à Brest, au solstice d'été ; ce flux d'un jour, sera $R.\cos(\lambda - \lambda_1)$, en substituant pour $nt + \varpi$, sa valeur $\lambda + mt$. Au moment de la basse mer du matin, ce flux sera $R.\sin(\lambda - \lambda_1)$, et au moment de la pleine mer du matin, il sera $-R.\cos(\lambda - \lambda_1)$.

Pour comparer ces résultats aux observations, on a pris dans quarante-trois syzygies solsticiales d'été, l'excès de la haute mer du soir sur la haute mer du matin, du premier et du second jour après la syzygie, et l'on a obtenu $14^{mc},706$ pour la somme de ces excès dans les quatre-vingt-six jours d'observations On a pris semblablement, dans trente syzygies solsticiales d'hiver, l'excès de la haute mer du matin sur la haute mer du soir, du premier et du second jour après la syzygie, et l'on a obtenu $10^{ma},798$ pour la somme de ces excès dans les soixante jours d'observation En ajoutant cette somme à la précédente, et en la divisant par $60 + 86$, le quotient $0^m,1755$ sera la valeur de $2R.\cos(\lambda - \lambda_1)$ Le *maximum* de la marée semi-diurne tombant à très peu près à l'instant du minuit qui sépare le premier, du second jour après la syzygie ; la variation de cette marée est très petite, et devient presque insensible dans la somme des excès dont je viens de parler ; car la marée du soir du premier jour est plus rapprochée de l'instant du *maximum*, que la marée du soir du second jour ; mais aussi la marée du matin du premier jour est plus éloignée de cet instant, que celle du second jour ; en sorte que la variation de la marée semi-diurne augmente, dans le premier jour qui suit la syzygie, l'excès de la haute mer du soir sur la haute mer du matin, et le diminue dans le second jour. L'effet de cette variation est ainsi très petit dans la somme de ces excès il serait nul, si l'on considérait autant de solstices d'été que de solstices d'hiver, et j'ai reconnu que cet effet est insensible dans les observations précédentes où l'on a considéré 46 solstices d'été et 30 solstices d'hiver

J'ai trouvé dans le n° 28 du quatrième Livre, la valeur de $2R.\cos(\lambda - \lambda_{,})$, égale à $0^m,183$ J'avais considéré dans les observations anciennes des marées à Brest, dix-sept syzygies solsticiales d'été, qui, traitées comme les précédentes, m'avaient donné $6^m,131$ pour la somme des excès des marées du soir sur celles du matin, dans les trente-quatre jours d'observations Onze syzygies solsticiales d'hiver m'avaient donné $4^m,109$ pour la somme des excès des hautes mers du matin sur celles du soir, dans les vingt-deux jours d'observations. En ajoutant ces deux

sommes aux deux précédentes données par les observations nouvelles, on a $35^m,744$, qui, divisé par 202, somme des jours d'observations, donne $0^m,17694$ pour la valeur de $2R.\cos(\lambda - \lambda_1)$

Pour avoir la valeur de $2R.\sin(\lambda - \lambda_1)$, on a pris, dans 23 syzygies solsticiales d'été, les excès des basses mers du matin sur celles du soir, du premier et du second jour après les syzygies, et l'on a trouvé $5^m,394$ pour la somme de ces excès, qui, divisée par 46, nombre des jours d'observations, a donné $0^m,117$ pour la valeur de $2R.\sin(\lambda - \lambda_1)$ Mais ici la variation des basses mers semi-diurnes a un effet sensible et que je trouve à peu près égal à $0^m,009$, qu'il faut ajouter à la valeur précédente qui devient par là $0^m,126$

On peut obtenir encore cette valeur, de la manière suivante. Dans le n° 5, on a considéré l'ensemble des syzygies solsticiales d'hiver et d'été J'ai prié M. Bouvard de calculer séparément les syzygies solsticiales d'été et les syzygies solsticiales d'hiver il a trouvé pour les premières

$$f = 323,741, \quad f' = 344,697, \quad f'' = 354,807,$$
$$f''' = 354,301, \quad f^{\text{iv}} = 341,460, \quad f^{\text{v}} = 319,397,$$

et il en a conclu, pour l'expression générale des valeurs de f,

$$355^m,7746 - 5,4875\,(t - 2,41582)^2,$$

d'où il a conclu

$$2i\alpha' = 355^m,8503,$$
$$2i\beta' = 5,4875$$

Les syzygies solsticiales d'hiver lui ont donné

$$f = 321,640, \quad f' = 346,389, \quad f'' = 359,844,$$
$$f''' = 358,540, \quad f^{\text{iv}} = 349,517, \quad f^{\text{v}} = 329,496,$$

et pour l'expression de ces valeurs

$$360,6612 - 5,6029.(t - 2,62075)^2,$$

d'où il a conclu

$$2i\alpha' = 360,7488,$$
$$2i\beta' = 5,6029$$

La somme des excès des pleines mers du soir sur les basses mers du

matin, dans les 64 syzygies solsticiales d'été, et réduits à leur maximum, a été 355,7746 Dans les 64 syzygies solsticiales d'hiver, cette somme a été 360,6612, elle a donc surpassé la somme précédente, de 4,8866, qui, divisé par 64, donne pour la différence relative à chaque syzygie, 0,07635 Au solstice d'hiver, le Soleil est plus près de la Terre que dans sa moyenne distance, d'une quantité à fort peu près égale au soixantième de cette distance son action est donc augmentée de la quantité

$$\frac{2A\ L}{r^3}\ \frac{3}{60}\cdot\frac{Q}{128},$$

Q étant, comme dans le n° 3, la somme des carrés des cosinus de la déclinaison du Soleil dans les 128 syzygies d'été et d'hiver elle est diminuée de la même quantité dans les syzygies du solstice d'été la différence de ces deux actions est donc

$$\frac{1}{10}\cdot\frac{2A\ L}{r^3}\cdot\frac{Q}{128}$$

En substituant pour $\frac{2AL}{r^3}$ et Q leurs valeurs trouvées dans le n° 9 cette différence est 0,13924, mais elle est diminuée par le flux solaire diurne, de la quantité

$$2R\ \cos(\lambda-\lambda_1)-2R.\sin(\lambda-\lambda_1),$$

on a donc

$$0{,}13924-2R.\cos(\lambda-\lambda_1)+2R.\sin(\lambda-\lambda_1)=0{,}07635$$

En substituant pour $2R\ \cos(\lambda-\lambda_1)$ sa valeur 0,17694, on a

$$2R\ \sin(\lambda-\lambda_1)=0{,}11405,$$

ce qui diffère peu de la valeur 0,126, trouvée ci-dessus, et ce qui prouve l'influence de la variation des distances du Soleil à la Terre En prenant la moyenne de ces valeurs, on a

$$2R.\sin(\lambda-\lambda_1)=0{,}1203$$

Les valeurs de $2R.\cos.(\lambda-\lambda_1)$ et de $2R.\sin(\lambda-\lambda_1)$ donnent

$$\text{tang}(\lambda-\lambda_1)=\frac{12030}{17694},$$

d'où l'on tire l'angle $\lambda - \lambda_{,}$, qui, réduit en temps à raison de la circonférence entière pour un jour, devient $0^{j},095$, c'est le temps dont le flux d'un jour précède le moment des *maxima* des marées du soir d'un demi-jour, et comme ce moment est $0^{j},688$, l'heure correspondante de la pleine mer du flux partiel sera $0^{j},593$ La valeur de $2R$ est $0^{m},2134$ cette valeur n'est pas la vingtième partie de la hauteur de la marée semi-diurne, et qui, dans les 128 syzygies solsticiales, a donné $716^{m},402$, ou $5^{m},60$ par syzygie Ainsi, quoique les deux forces qui produisent ces deux flux soient presque égales entre elles, à Brest, l'effet des circonstances est beaucoup plus grand sur le flux semi-diurne que sur le flux diurne Pour mieux juger de ces effets, nous allons déterminer ces deux flux, en supposant avec Newton, la mer en équilibre à chaque instant sous l'astre qui l'attire Nous avons donné dans le n° 12 du quatrième Livre, les expressions de ces flux celle du flux diurne relatif à l'action du Soleil est

$$\frac{3L}{r^3 g\left(1-\frac{3}{5\rho}\right)} \sin\nu . \cos\nu . \sin\theta . \cos\theta . \cos(nt + \varpi - \psi).$$

L'expression correspondante du flux semi-diurne est

$$\frac{3L}{4r^3 g\left(1-\frac{3}{5\rho}\right)} . \cos^2\nu . \sin^2\theta . \cos(2nt + 2\varpi - 2\psi)$$

L'action de la Lune produit deux flux semblables, que l'on obtient en accentuant les lettres L, r, ν, ψ

On a par le n° 11 du Livre IV,

$$\frac{3L}{r^3 g} = 0^{mc},98528$$

Nous prendrons ensuite pour $\cos^2\nu$, la valeur de Q du n° 9, divisée par 128; on a de plus θ égal à fort peu près au complément de la latitude de Brest, ou, en degrés sexagésimaux, égal à $41° 36' 46''$ Nous supposerons encore la densité ρ de la Terre égale à 5, celle de la mer étant 1; enfin on a, par le n° 9,

$$\frac{L'}{r'^3} = 2,35333 \frac{L}{r^3},$$

et nous ferons $\nu' = \nu$, ce qui est exact à très peu près. Cela posé, les

doubles des coefficiens de $\cos(nt+\varpi-\psi)$ et de $\cos(2nt+2\varpi-2\psi)$, dans les expressions précédentes, ajoutés aux doubles des mêmes coefficiens relatifs à la Lune, seront respectivement dans les syzygies,

$$0^m,674, \quad 0^m,350.$$

Ces nombres sont les hauteurs des pleines mers syzygies des deux flux diurne et semi-diurne les hauteurs observées sont

$$0^m,2134, \quad 5^m,60$$

Ainsi, par l'effet de la rotation de la Terre et des circonstances accessoires, le flux diurne est réduit à peu près au tiers, tandis que le flux semi-diurne devient 16 fois plus grand Au reste, cette grande différence ne doit point surprendre, si l'on considère que, par le quatrième Livre, la rotation de la Terre détruit dans une mer partout également profonde, le flux diurne, et que, si la profondeur de la mer est $\frac{1}{720}$ du rayon terrestre, ou d'environ neuf mille mètres, la hauteur de la marée semi-diurne dans les syzygies est de onze mètres

Déterminons présentement l'effet du flux diurne sur les marées quadratures équinoxiales Par ce qui a été dit dans le chapitre II, sur les marées quadratures du matin, on a, pour ces marées,

$$nt+\varpi-\varphi=\lambda-\frac{\pi}{2}$$

Le flux diurne devient ainsi, au moment du *minimum* de la marée quadrature,

$$\begin{aligned}
&\mathrm{H}\,.\sin\varepsilon\,.\sin\left(\lambda-\frac{\pi}{2}-\mathrm{F}+m\mathrm{T}+my\right)\\
-\;&\mathrm{H}_1\,.\sin\varepsilon\,.\sin\left(\lambda-\frac{\pi}{2}-m\mathrm{T}-\mathrm{F}_1-my\right)\\
+\;&\mathrm{H}'_1\,.\sin\varepsilon'.\sin\left(\lambda-\frac{\pi}{2}-\mathrm{F}'+m\mathrm{T}+my\right)\\
-\;&\mathrm{H}'\,.\sin\varepsilon'.\sin\left[\lambda-\frac{\pi}{2}-m\mathrm{T}-2(m'\mathrm{T}-m\mathrm{T})-\mathrm{F}'-(2m'-m)\,y\right]
\end{aligned}$$

F_1 doit peu différer de F, à cause de la lenteur du mouvement du Soleil, comparé à celui de la Lune, les deux premiers termes de cette fonction se détruisent donc à fort peu près dans les équinoxes Dans les

quadratures des équinoxes d'automne, on a $m'T$ égal à ϖ, et $2m'T - nT$, égal à ϖ ou à 3ϖ, les deux derniers termes deviennent

$$H'.\sin\varepsilon'\cos(\lambda - E' + m) + H'_{,}\sin\varepsilon'\cos[\lambda - E'_{,} - (2m' - m)],$$

et il est facile de voir qu'ils sont les mêmes que dans les syzygies des solstices d'été. Donnons-leur cette forme

$$M'.\sin\lambda + N'.\cos\lambda$$

Dans les quadratures de l'équinoxe du printemps, cette quantité prend un signe contraire.

Dans les syzygies des solstices d'été, le flux diurne, au moment de la haute mer du soir, est, par ce qui précède,

$$M.\sin\lambda + N.\cos\lambda$$

Au moment de la haute mer du matin, il prend un signe contraire. L'excès de l'un sur l'autre, qui, par l'observation, est $0^m,1$ qui donne donc

$$2M.\sin\lambda + 2N.\cos\lambda = 0^m,1706$$

L'excès de la basse mer du matin sur celle du soir est

$$-2M.\cos\lambda + 2N.\sin\lambda,$$

cet excès est $0^m,1203$, ce qui donne

$$-2M.\cos\lambda + 2N.\sin\lambda = 0^m,1203$$

Cette équation ajoutée à la précédente, donne

$$2M.\cos(\sin\lambda - \cos\lambda) + 2N.(\sin\lambda + \cos\lambda) = 0^m,2909 \qquad (u)$$

Le flux diurne de la basse mer du soir qui suit la haute mer du matin dans une quadrature d'automne, est

$$M'.\cos\lambda - N'.\sin\lambda.$$

Ainsi ce flux étant, au moment de la haute mer,

$$M'.\sin\lambda + N'.\cos\lambda,$$

son excès sur sa valeur au moment de la basse mer suivante, sera

$$M'.(\sin\lambda - \cos\lambda) + N'.(\sin\lambda + \cos\lambda),$$

et il l'emporte sur la même différence dans une quadrature du printemps, de la quantité

$$2M'.(\sin\lambda - \cos\lambda) + 2N'\ (\sin\lambda + \cos\lambda)$$

En comparant cette quantité au premier membre de l'équation (a), on voit qu'elle doit être positive, et si l'on supposait les rapports de M et N à M' et N', égaux à celui de la somme des actions lunaire et solaire à l'action lunaire, rapport qui, par le chapitre III, est celui de 3,35 à 2,35, ce qui ne peut être regardé que comme un simple aperçu, les hautes mers, dans les quadratures d'automne, surpasseraient celles du printemps, de $0^m,21$ Mais cette évaluation indique seulement la supériorité des marées quadratures d'automne sur les marées semblables du printemps c'est en effet ce que l'observation confirme M. Bouvard a calculé séparément les hauteurs des marées quadratures du printemps et celles des marées quadratures d'automne, dont il avait considéré l'ensemble, et il a trouvé relativement aux premières,

$$f = 189,282,\ f' = 149,468,\ f'' = 154,658,\ f''' = 200,791,$$

d'où il a conclu par les procédés du chapitre III, la formule

$$146,4858 + 21,4867.(t - 1,4076)^2,$$

ce qui lui a donné

$$2i\alpha'' = 146,1503,\quad 2i\beta'' = 21,4867$$

Les mêmes procédés, appliqués aux marées quadratures d'automne, lui ont donné

$$f = 204,797,\ f' = 162,546,\ f'' = 158,369,\ f''' = 195,376$$

D'où il a conclu la formule

$$155,3712 + 19,8145.(t - 1,5818)^2,$$

et

$$2i\alpha'' = 155,0616,\quad 2i\beta'' = 19,8145$$

La différence des deux valeurs de $2i\alpha''$ est $8^m,9113$, cette différence divisée par 64, nombre des quadratures de l'équinoxe d'automne, donne 0,140, à fort peu près, pour la supériorité d'une marée quadrature d'automne sur celle du printemps

CHAPITRE VI

Des flux partiels qui dépendent de la quatrième puissance inverse de la distance de la Lune à la Terre.

On sait par la théorie des probabilités, que le grand nombre des observations peut suppléer leur précision, pour reconnaître des inégalités beaucoup moindres que le crème dont elles sont susceptibles. J'ai donc pensé que les flux dépendant de la différence de l'action de la Lune dans les nouvelles Lunes, à son action dans les pleines Lunes, et de son action dans les quadratures boréales, à son action dans les quadratures australes, pouvaient devenir sensibles dans l'ensemble des nombreuses observations des marées que M. Bouvard a décrites. Ces flux sont produits par les termes de l'expression de l'action lunaire qui sont divisés par la quatrième puissance de la distance de la Lune à la Terre. Les termes divisés par le cube de cette distance, les seuls que l'on ait considérés jusqu'ici, ne donnent aucune différence entre les flux lunaires des nouvelles Lunes et les flux lunaires des pleines Lunes. Les termes divisés par la quatrième puissance de la distance lunaire, sont, par le n° 26 du troisième Livre,

$$\frac{5}{2}\cdot\frac{L'}{r'^4}\left\{\begin{array}{l}[\cos\theta.\sin\varepsilon'+\sin\theta.\cos\varepsilon'.\cos(nt+\varpi-\psi')]^3\\ -\frac{3}{5}.[\cos\theta.\sin\varepsilon'+\sin\theta.\cos\varepsilon'.\cos(nt+\varpi-\psi')]\end{array}\right\}. \quad (P)$$

On peut, dans le développement de cette fonction, négliger les termes qui dépendent de l'angle $nt+\varpi-\psi'$; parce qu'il résulte du chapitre précédent, que les flux partiels relatifs à cet angle, sont très petits dans le port de Brest et deviennent insensibles, lorsqu'ils sont divisés par la distance r' de la Lune à la Terre. Nous allons d'abord considérer le terme dépendant de l'angle $3nt+3\varpi-3\psi'$; ce

terme est

$$\frac{5}{8}\,\frac{L'}{T'}.\sin^2\theta.\cos^3\nu'.\cos[3nt+3\varpi-3\psi-3(\psi'-\psi)]$$

En substituant pour $\sin\nu'$, $\cos\nu'$, $\sin\psi'$ et $\cos\psi'$, leurs valeurs données dans le chapitre II, on voit que ce terme produit un flux partiel de la forme

$$G.\cos[3nt+3\varpi-3\varphi-3(\varphi'-\varphi)-3Q],$$

G et Q étant des constantes que l'observation seule peut déterminer. Les autres flux partiels dépendans de l'angle $3nt+3\varpi-3\varphi$, sont multipliés par le carré du sinus de l'inclinaison ε' de l'orbite lunaire à l'équateur, ils sont peu considérables, et produisent la différence entre les observations équinoxiales et les observations solsticiales. On y aurait égard en considérant l'inégalité

$$G\cos[3nt+3\varpi-3\varphi-3(\varphi'-\varphi)-3Q]$$

comme représentant l'inégalité relative aux équinoxes, et en la multipliant par $\cos^3\nu'$, pour la rapporter aux solstices, ce qui diminuerait d'un cinquième à peu près la valeur de G dans les solstices, mais peut-être, cette correction n'est pas suffisante. Dans les nouvelles Lunes équinoxiales, $\varphi'-\varphi$ est nul. De plus, au moment de la haute mer du soir, $nt+\varpi-\varphi$, ou l'angle horaire du Soleil est λ, l'inégalité précédente devient ainsi

$$G.\cos(3\lambda-3Q),$$

c'est la quantité que ce flux partiel ajoute à la hauteur de la pleine mer du soir, à Brest. Pour avoir sa valeur dans la basse mer du matin qui la précède, il faut changer λ en $\lambda-\frac{\pi}{2}$, ce qui donne

$$-G.\sin(3\lambda-3Q),$$

ce flux ajoute donc à l'excès de la haute mer du soir à Brest, dans les nouvelles Lunes, sur la basse mer qui précède, la quantité

$$G.\cos(3\lambda-3Q)+G.\sin(3\lambda-3Q).$$

On verra de la même manière, que dans les pleines Lunes où $\varphi' - \varphi$ est égal à π, ce flux ajoute à cet excès, une quantité contraire

$$-G.\cos(3\lambda - 3Q) - G.\sin(3\lambda - 3Q);$$

ce flux doit donc, s'il est sensible, se manifester dans la différence d'un grand nombre de ces excès, dans les nouvelles Lunes et dans les pleines Lunes

Ce même flux doit se manifester encore dans les observations des marées quadratures Dans ces observations, on a déterminé l'excès de la hauteur de la pleine mer du matin sur la basse mer du soir, l'inégalité précédente devient, au moment de la pleine mer du matin,

$$G \cos\left[3\left(\lambda - \frac{\pi}{2}\right) - 3Q - 3(\varphi' - \varphi)\right],$$

et au moment de la basse mer du soir, elle devient

$$G.\cos[3\lambda - 3Q - 3(\varphi' - \varphi)]$$

Dans le premier quartier, $\varphi' - \varphi$ est égal à $\frac{\pi}{2}$, l'excès de la haute mer du matin sur la basse mer du soir est donc

$$-G.\cos(3\lambda - 3Q) + G.\sin(3\lambda - 3Q)$$

Cet excès prend un signe contraire dans le second quartier où

$$\varphi' - \varphi = \frac{3}{2}\pi.$$

Dans les quadratures solsticiales, la Lune est près de l'équateur; dans les quadratures équinoxiales, elle est vers son *maximum* de déclinaison La différence entre les marées quadratures du premier quartier et celles du second quartier, doit donc être plus petite dans les équinoxes que dans les solstices

L'excès d'une marée d'une nouvelle Lune, sur celle d'une pleine Lune, est

$$2G.\sin(3\lambda - 3Q) + 2G.\cos(3\lambda - 3Q),$$

nommons E cet excès L'excès d'une marée du premier quartier sur une marée du second quartier est

$$2G \sin(3\lambda - 3Q) - 2G.\cos(3\lambda - 3Q);$$

nommons E′ cet excès on aura

$$\tang(3\lambda - 3Q) = \frac{E + E'}{E - E'},$$

$$G = \frac{E}{2\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1 + \left(\frac{E'}{E}\right)^2}.$$

Pour comparer ces résultats aux observations, M Bouvard a fait la somme des hauteurs des pleines mers du soir, au-dessus des basses mers du matin du jour de la syzygie et des trois jours suivans, dans les soixante-quatre nouvelles Lunes équinoxiales qu'il avait considérées, et il a trouvé cette somme égale à 1583,594. Le même calcul, relatif aux 64 pleines Lunes équinoxiales, lui a donné pour cette somme 1583,594 + 21,410 Les pleines mers des Lunes solsticiales lui ont donné les sommes

$$1400{,}016, \qquad 1400{,}16 + 10{,}175.$$

Ainsi les marées des pleines Lunes ont excédé les marées des nouvelles Lunes, tant dans les équinoxes que dans les solstices, et conformément à la théorie, cet excès a été plus grand dans les équinoxes que dans les solstices

Les hauteurs des pleines mers quadratures du matin, au-dessus des basses mers du soir du jour de la quadrature et des trois jours suivans, ont donné, relativement aux quadratures équinoxiales du premier et du second quartier de la Lune, les sommes

$$710{,}850, \qquad 710{,}850 - 5{,}605,$$

et relativement aux quadratures solstiales, les sommes

$$853{,}595, \qquad 853{,}595 - 20{,}542$$

Conformément à la théorie, la différence est plus grande dans les quadratures solsticiales que dans les quadratures équinoxiales, mais une partie de cet excès est dû aux erreurs des observations L'ensemble des différences dans les nouvelles et pleines Lunes équinoxiales et solsticiales est 128.E, et l'ensemble des différences, dans les quadratures équinoxiales et solsticiales est 128.E′, on a donc

$$128.E = -21{,}016 - 10{,}175,$$
$$128.E' = 5{,}605 + 20{,}542;$$

d'où l'on tire, en degrés centésimaux,

$$3\lambda - 3Q = 5^{\circ},59,$$
$$G = -0^{m},11681.$$

Un aussi petit flux exige un plus grand nombre d'observations pour être déterminé avec exactitude; mais son existence est indiquée par les observations précédentes, avec une grande probabilité.

Considérons maintenant les termes de la fonction (p) dépendant de l'angle $2nt + 2\varpi - 3\psi'$; ces termes résultant du développement de la quantité

$$\frac{15}{2} \cdot \frac{L'}{r'^4} \cdot \cos\theta' \cdot \sin\varepsilon' \sin^2\theta \cdot \cos^2\varepsilon' \cdot \cos^2 \cdot (nt + \varpi - \psi')$$

ils correspondent aux termes de l'expression de l'action lunaire, divisée par le cube de la distance r' de la Lune, et qui, par le second chapitre, sont le développement de la quantité

$$\frac{3}{2} \cdot \frac{L'}{r'^3} \cdot \sin^2\theta \cdot \cos^2\varepsilon' \cdot \cos^2 \cdot (nt + \varpi - \psi')$$

Si l'on suit l'analyse du chapitre cité, et si l'on observe que $\sin\varepsilon$ est égal à $\sin\varepsilon' \cdot \sin\varphi'$, φ' étant la longitude de la Lune, comptée de l'intersection de son orbite avec l'équateur; on voit qu'il en résulte dans la hauteur de la marée à Brest, soit dans les syzygies solsticiales, soit dans les quadratures équinoxiales, une quantité égale à $\pm F$, le signe supérieur se rapportant à la déclinaison boréale de la Lune, et le signe inférieur à sa déclinaison australe. L'observation peut seule déterminer la constante F. Si les flux partiels avaient, relativement à la latitude $\frac{\pi}{2} - \theta$ du port, le même rapport que les forces, la valeur de F serait à la partie de la hauteur de la mer, due à l'action de la Lune, à peu près dans le rapport de $\frac{15}{2r'} \cdot \cos\theta \cdot \sin\varepsilon'$ à $\frac{3}{2}$. Mais nous avons remarqué dans le premier chapitre, que chaque flux partiel étant la résultante de tous les flux semblables qui émanent de chaque point de la surface de la mer, et qui reçoivent un nombre presqu'infini de modifications avant que de parvenir dans le port de Brest, la résultante n'a point avec la latitude de Brest, le même rapport que les forces productrices de ce flux; elle peut même avoir un signe con-

traire à celui que ces forces indiquent, en sorte que l'observation peut seule le faire connaître. Pour cela, M Bouvard a séparé, dans le calcul des syzygies solsticiales, les marées où la déclinaison de la Lune était australe, des marées où la déclinaison de la Lune était boréale, et il a fait sur ces marées ainsi séparées, le même calcul qu'il avait fait sur leur ensemble, et dont nous avons donné le résultat dans le troisième chapitre; il a fait le même calcul relativement aux quadratures équinoxiales, et il a formé la Table suivante

TABLE XVIII.

Marées syzygies solsticiales. Lune australe

$f = 326,701$, $f' = 348,393$, $f'' = 362,051$,
$f''' = 361,672$, $f^{\text{IV}} = 350,733$, $f^{\text{V}} = 329,636$

$$362,8222 - 5,5778\,(t - 2,5621)^2$$

$$362,9096 = 2\iota\alpha',$$
$$5,5778 = 2\iota\beta'.$$

Marées syzygies solsticiales. Lune boréale.

$f = 318,782$, $f' = 342,724$, $f'' = 352,605$,
$f''' = 350,299$; $f^{\text{IV}} = 340,006$, $f^{\text{V}} = 319,253$

$$353,1223 - 5,4316\,(t - 2,4784)^2$$

$$353,2072 = 2\iota\alpha',$$
$$5,4316 = 2\iota\beta'.$$

Marées quadratures équinoxiales. Lune australe

$f = 199,704$, $f' = 160,878$, $f'' = 161,350$, f''' $201,089$

$$156,2010 + 19,6412\,(t - 1,4882)^2$$

$$155,3925 = 2\iota\alpha'',$$
$$19,6412 = 2\iota\beta''$$

Marées quadratures équinoxiales Lune boréale

$f = 194,418$, $f' = 151,304$, $f'' = 151,616$, $f''' = 195,106$.

$$146,0466 + 21,6510\,(t - 1,4945)^2$$

$$145,7077 = 2\iota\alpha'',$$
$$21,6510 = 2\iota\beta''$$

On voit d'abord, par cette Table, que l'action de la Lune australe sur la mer l'emporte sur l'action de la Lune boréale. La valeur de 2F est donnée, soit par la différence des valeurs de $2\iota\alpha'$, relatives aux marées syzygies solsticiales, soit par la différence des valeurs de $2\iota\alpha''$, relatives aux marées quadratures. La première de ces différences donne

$$128.F = -9,7024,$$

parce qu'il y a 128 syzygies solsticiales.

La seconde de ces différences donne

$$128.F = -9,6848$$

L'accord de ces valeurs de 128 F ne permet pas de douter que l'action lunaire australe sur l'Océan, l'emporte sur l'action lunaire boréale.

CHAPITRE VII.

Du flux et reflux de l'atmosphère.

Les observations dont j'ai fait usage, correspondant à toutes les saisons; les flux lunaires partiels qui dépendent des déclinaisons de la Lune et de sa parallaxe disparaissent dans l'ensemble de ces observations. Le flux lunaire atmosphérique peut alors s'exprimer comme celui de la mer, par la formule

$$R.\cos[2nt + 2\varpi - 2mt - 2(m't - mt) - 2\lambda'],$$

R et λ' étant des constantes indéterminées, mt est le moyen mouvement du Soleil pendant le temps t, $m't$ est celui de la Lune, nt est la rotation de la Terre, ϖ est la longitude du lieu; tous ces angles sont comptés de l'équinoxe du printemps; $nt + \varpi - mt$ est l'angle horaire du Soleil, que nous ferons partir de midi. Cet angle réduit en temps, à raison de la circonférence entière pour un jour, sera le temps compté depuis midi, λ' sera ainsi, l'heure du *maximum* du flux atmosphérique du soir. R dépend de l'action de la Lune sur l'atmosphère, soit directe, soit transmise par la mer.

Si l'on suppose que la syzygie arrive à midi, ce que l'on peut admettre ici sans erreur sensible, comme le résultat moyen des heures de toutes les syzygies considérées, la formule précédente donne $R\cos 2\lambda'$ pour la hauteur du flux au midi du jour de la syzygie. En désignant par q le mouvement synodique de la Lune dans un jour, la hauteur du flux à neuf heures du matin du jour de la syzygie sera

$$-R.\sin\left(2\lambda' - \frac{q}{4}\right),$$

à trois heures du soir, elle sera

$$+R.\sin\left(2\lambda' + \frac{q}{4}\right)$$

Soient donc A, A′, A″, les hauteurs observées du baromètre, le jour de la syzygie, à neuf heures du matin, à midi, à trois heures du soir, on aura

$$C - R.\sin\left(2\lambda' - \frac{q}{4}\right) = A,$$

$$C' + R.\cos 2\lambda' = A',$$

$$C'' + R.\sin\left(2\lambda' + \frac{q}{4}\right) = A'',$$

C, C′, C″ étant les hauteurs du baromètre, qui auraient lieu sans l'action de la Lune. Ces équations subsistent également pour le jour de la quadrature, pourvu que l'on y change R en —R, et A, A′, A″, dans B, B′, B″, ces trois dernières lettres exprimant respectivement les hauteurs du baromètre, observées, le jour de la quadrature, à neuf heures du matin, à midi, et à trois heures du soir.

Ces six équations donnent les deux suivantes,

$$4R.\cos\frac{q}{4}\sin 2\lambda' = A'' - A + B - B'',$$

$$4R\left(1 - \sin\frac{q}{4}\right).\cos 2\lambda' = 2A' - (A + A'') - 2B + (B + B'')$$

Ces deux équations sont indépendantes des hauteurs absolues du baromètre; elles n'emploient que les différences A — A′, A — A″, A′ — A″ du jour de la syzygie, et les différences correspondantes du jour de la quadrature.

Le jour $i^{ème}$ après chaque syzygie, et après chaque quadrature, donne les deux équations suivantes

$$4R.\cos\frac{q}{4}.\sin(2\lambda' + 2iq) = A''_i - A_i + B_i - B''_i,$$

$$4R\left(1 - \sin\frac{q}{4}\right).\cos(2\lambda' + 2iq)_i = 2A'_i - (A_i + A''_i) - 2B'_i + (B_i + B''_i),$$

A_i, A'_i, etc., B_i, B'_i, etc., sont les valeurs de A, A′, etc., B, B′, etc.,

relatives à ce $i^{ème}$ jour : i est négatif pour les jours qui précèdent la syzygie ou la quadrature.

On peut conclure des observations de chaque jour, les valeurs de R et de λ'. Mais il y a des jours plus propres à déterminer l'une de ces inconnues. La méthode que j'ai désignée sous le nom de *méthode la plus avantageuse*, combine toutes les équations de manière à donner les valeurs les plus probables des inconnues. Les deux équations du jour $i^{ème}$ donnent en faisant

$$4R.\sin 2\lambda' = x, \quad 4R.\cos 2\lambda' = y,$$

les suivantes,

$$x.\cos\frac{q}{4}.\cos 2iq + y.\cos\frac{q}{4}.\sin 2iq = A''_i - A_i + B_i - B''_i,$$

$$y.\left(1 - \sin\frac{q}{4}\right).\cos 2iq - x.\left(1 - \sin\frac{q}{4}\right).\sin 2iq$$
$$= 2A'_i - (A_i + A''_i) - 2B'_i + (B_i + B''_i).$$

$\sin.\frac{q}{4}$ est une quantité très petite et à fort peu près égale à $\frac{1}{19}$. Si l'on néglige son carré et si l'on nomme F_i, la quantité

$$2A'_i - (A_i + A''_i) - 2B'_i + (B_i + B''_i)$$

augmentée de sa dix-neuvième partie, si l'on nomme pareillement E_i la quantité

$$A''_i - A_i + B_i - B''_i,$$

les deux équations précédentes deviendront

$$x.\cos 2iq + y.\sin 2iq = E_i,$$
$$y.\cos 2iq - x.\sin 2iq = F_i$$

En faisant i successivement égal à -1, 0, $+1$, $+2$, on aura huit équations qui, résolues par le procédé de la méthode la plus avantageuse, détermineront x et y. Mais cette méthode exige que l'on connaisse la loi des écarts des hauteurs du baromètre, de leur hauteur moyenne, dus aux causes irrégulières, pour les diverses heures du jour; ce que nous ignorons. Dans cet état d'incertitude, nous supposerons cette loi, la même pour les heures diverses; l'inexactitude de cette suppo-

sition n'ayant que peu d'influence sur les résultats cherchés. Alors, pour former les deux équations finales qui doivent donner x et y, il faut, suivant le procédé que j'ai donné dans le troisième supplément à ma Théorie analytique des Probabilités, multiplier chacune des quatre équations relatives à la lettre E, par trois, et par son coefficient de x, il faut multiplier chacune des équations relatives à la lettre F par son coefficient de y, enfin, il faut ajouter tous ces produits, ce qui donne

$$x.(8+\Sigma.\cos 4iq)+y.\Sigma\sin 4iq=3\Sigma.E_i\cos 2iq-\Sigma.F_i.\sin 2iq,$$

le signe Σ exprimant la somme de toutes les quantités qu'il affecte, et que l'on obtient en faisant successivement $i=-1$, $i=0$, $i=1$, $i=2$. En opérant de la même manière sur le coefficient de y, on aura la seconde équation finale

$$y.(8-\Sigma.\cos 4iq)+x.\Sigma.\sin 4iq=3\Sigma.E_i.\sin 2iq+\Sigma.F_i\cos 2iq.$$

Toutes les syzygies et toutes les quadratures depuis le 1er octobre 1815, jusqu'au 1er octobre 1823, ont donné, en réduisant la colonne de mercure du baromètre à zéro de température,

$A_{-1}=755^m,925$,	$A'_{-1}=755,712$,	$A''_{-1}=755,175$
$B_{-1}=756,315$,	$B'_{-1}=756,034$,	$B''_{-1}=755,549$
$A=756,195$,	$A'=755,788$,	$A''=755,270$
$B=756,072$,	$B'=755,692$,	$B''=755,041$
$A_1=755,704$,	$A'_1=755,416$,	$A''_1=755,010$.
$B_1=755,296$,	$B'_1=755,015$,	$B''_1=754,386$.
$A_2=755,631$,	$A'_2=755,407$,	$A''_2=754,955$.
$B_2=755,575$,	$B'_2=755,322$,	$B''_2=754,891$

De là on conclut

$E_{-1}=+0^m,016$, $E_0=+0,105$, $E_1=+0,216$; $E_2=+0,008$,
$F_{-1}=+0,126$, $F_0=+0,168$; $F_1=-0,242$, $F_2=+0,053$.

On a ainsi les deux équations finales

$$10,18716.x+0,99136.y=1,076815,$$
$$4,51927.y+0,99136.x=0,027033.$$

D'où l'on tire

$$x = 0{,}10743, \quad y = -0{,}017591$$

L'étendue 2R du flux lunaire est égal à $\frac{1}{2} \cdot \sqrt{x^2 + y^2}$, elle est donc $0{,}^{mm}05443$

On a $$\tang 2\lambda = \frac{x}{y},$$

ce qui donne en degrés sexagésimaux

$$\lambda = 49^\circ 39'.$$

Cette valeur réduite en temps, donne pour l'heure sexagésimale du plus haut flux lunaire du jour de la syzygie, $3^h\ 18'\ 36''$ du soir

2 Déterminons maintenant la probabilité avec laquelle les observations précédentes indiquent un flux lunaire atmosphérique Il résulte de ce que j'ai fait voir dans le n° 20 du second Livre de ma Théorie analytique des Probabilités, que si l'on prend un très grand nombre n de valeurs de la variation diurne du baromètre, que l'on divise leur nombre par n pour avoir la valeur moyenne, que l'on nomme e la somme des carrés des différences de cette valeur moyenne à chacune de ces valeurs, si l'on nomme ensuite u l'erreur moyenne d'un nombre considérable s de valeurs de la variation diurne, la probabilité de u sera proportionnelle à

$$c^{-\frac{n}{2e} su^2},$$

c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité Le nombre n des observations diurnes comprises dans les observations précédentes, est 1584, et l'on a trouvé, relativement à ces observations, la valeur moyenne de la variation diurne égale à $0^{mm},8045$, et e égal à $5572^{mm},93$, ce qui donne

$$\frac{n}{2e} = 0{,}142116,$$

le millimètre étant pris pour l'unité La probabilité de u est ainsi proportionnelle à

$$c^{-0{,}142116\, su^2}$$

En supposant que s exprime le nombre des variations diurnes obser-

vées vers les syzygies, on a $s = 792$, et la probabilité de l'erreur moyenne u sera proportionnelle à

$$c^{-112,55\, u^2},$$

s'il n'y a point de cause constante qui influe sur ces variations. La probabilité de l'erreur moyenne u' des 792 observations vers les quadratures sera pareillement proportionnelle à

$$c^{-112,55\, u'^2}.$$

Soit z l'excès de u' sur u, la probabilité des erreurs simultanées u et u' sera proportionnelle à

$$c^{-112,55\, [(u+z)^2 + u^2]},$$

la probabilité de z sera donc proportionnelle à l'intégrale

$$\int du . c^{-112,55\, [(u+z)^2 + u^2]};$$

l'intégrale étant prise depuis u égal à l'infini négatif, jusqu'à u égal à l'infini positif. En donnant à l'intégrale précédente, cette forme

$$c^{-112,55\, \frac{z^2}{2}} \int du . c^{-112,55\, 2\left(u + \frac{z}{2}\right)^2},$$

on voit que la probabilité de z est proportionnelle à

$$c^{-\frac{112,55}{2} z^2}.$$

Les observations précédentes donnent pour z

$$\frac{1}{4} . \left\{ \begin{array}{l} B_{-1} - B''_{-1} + B - B'' + B_1 - B''_1 + B_2 - B''_2 \\ + A''_{-1} - A_{-1} + A'' - A + A''_1 - A_1 + A''_2 - A_2 \end{array} \right\},$$

d'où l'on tire

$$z = 0,0865.$$

La probabilité que les seules anomalies du hasard donneront une valeur de z plus petite est donc

$$\frac{\int dz . c^{-\frac{112,55}{2} . z^2}}{\int dz . c^{-\frac{112,55}{2} . z^2}};$$

l'intégrale du numérateur étant prise depuis $z = -\infty$ jusqu'à $z = 0{,}0865$, et celle du dénominateur étant prise depuis $z = -\infty$ jusqu'à $z = \infty$. Si l'on fait

$$t = z \cdot \sqrt{\frac{112{,}55}{2}},$$

cette fraction devient

$$1 - \frac{\int dt \cdot c^{-t^2}}{\sqrt{\pi}},$$

l'intégrale du numérateur étant prise depuis $t = 0{,}0865 \cdot \sqrt{\frac{112{,}55}{2}}$ jusqu'à t infini, et π étant le rapport de la circonférence au diamètre. Ainsi la probabilité que la valeur observée de z n'atteindrait pas 0,0865, par les seules chances du hasard, est 0,843; il y a donc quelque invraisemblance à leur attribuer cette valeur; mais cette invraisemblance est si petite que, pour affirmer quelque chose à cet égard, il faut multiplier considérablement les observations. Neuf fois plus d'observations donneraient

$$t = 0{,}0865 \cdot \sqrt{\frac{112{,}55}{2} \cdot 9}$$

Si la valeur de z restait égale à 0,0865, la probabilité que cette valeur ne serait pas l'effet du hasard, serait à fort peu près, $\frac{327}{338}$, cette valeur indiquerait donc alors, avec beaucoup de vraisemblance, le flux lunaire atmosphérique.

REMARQUES

Sur la page 102 du premier volume de la Mécanique céleste.

J'ai dit à la fin de cette page, que je ferais voir dans la théorie du flux et du reflux de la mer, que la valeur de $\delta V'$ est à très peu près la même pour toutes les molécules situées sur le même rayon terrestre. J'ai omis de le faire en exposant cette théorie. Pour réparer cette omission, je vais considérer la partie de $\delta V'$ relative à l'attraction de la couche aqueuse. Cette partie est donnée par l'expression de $\Delta . V$ de la page 37 du second volume. Si l'on fait varier θ et ϖ dans l'intérieur, des mêmes quantités αu et αv qu'à la surface; ce qui revient à considérer les molécules situées primitivement sur le même rayon, comme restant constamment sur un même rayon; alors $\delta V'$ ne varie de l'intérieur à la surface, qu'à raison de la variation αy du mouvement de la molécule dans le sens vertical, variation d'un ordre inférieur à celui de la variation αu de son mouvement horizontal dans le sens du méridien. Or, il résulte de l'expression de $\Delta . V$, que la variation αy de r, a pour facteur une quantité de l'ordre de la profondeur de la mer, on peut donc négliger la variation qui en résulte dans $\delta V'$, et supposer $\delta V'$ le même à l'intérieur qu'à la surface, ce qui rend l'équation (M) commune à tous ces points. Comme cette équation donne pour tous les points situés sur le même rayon, les mêmes valeurs de αu et de αv, on voit que la supposition des points restant sur le même rayon pendant la durée du mouvement, satisfait aux conditions de ce mouvement, car il est facile d'appliquer à la force attractive des astres, ce que nous venons de dire relativement à l'attraction de la couche aqueuse.

LIVRE XIV.

DES MOUVEMENS DES CORPS CÉLESTES AUTOUR DE LEUR CENTRE DE GRAVITÉ.

CHAPITRE Ier.

De la Précession des équinoxes.

Notice historique des travaux des Astronomes et des Géomètres sur cet objet.

1 La plus ancienne observation de la position sidérale des solstices ou des équinoxes, remonte au commencement du XIIe siècle avant notre ère. Tcheou-Kong qui gouvernait alors la Chine pendant la minorité de son neveu, fixa la position du solstice d'hiver à deux degrés chinois de *nu*, constellation chinoise qui commençait par ε du Verseau Cette détermination que l'on peut rapporter à l'an 1100 avant notre ère, ne diffère pas de 92 minutes centésimales du résultat des formules du sixième Livre; différence qui paraîtra bien petite, si l'on considère l'imperfection des moyens dont on pouvait alors faire usage, pour obtenir un élément aussi délicat La même tradition qui nous a transmis ce précieux résultat, nous a pareillement transmis l'observation des ombres du gnomon, aux solstices d'hiver et d'été, faite par le même prince. L'accord de l'obliquité de l'écliptique qu'elle donne pour cette époque, avec les formules du sixième Livre, ne permet pas de révoquer en doute cette observation regardée comme incontestable par le missionnaire Gaubil, l'homme le plus versé dans l'Astronomie chinoise qu'il avait approfondie pendant un long séjour à la Chine. Dans le Ve siècle avant notre ère, les astronomes chinois placèrent le solstice d'hiver au commencement de la constellation chinoise *nieou*, dont la

première étoile était β du Capricorne. Il est fort vraisemblable, dit le savant et judicieux Gaubil, que ces astronomes, en comparant cette position du solstice d'hiver, avec celle que Tcheou-Kong lui avait assignée, et qui leur était bien connue, remarquèrent le mouvement rétrograde des solstices, par rapport aux étoiles, mais rien dans l'astronomie des Égyptiens, des Chaldéens et des Grecs, n'indique que ces peuples aient eu connaissance des observations chinoises. Il faut descendre de huit siècles depuis Tcheou-Kong, pour avoir des observations de leurs astronomes sur la position sidérale des équinoxes. Aristille et Tymocharis, premiers observateurs de l'école d'Alexandrie, déterminèrent la position de plusieurs étoiles par rapport à l'équinoxe du printemps, et ce fut en comparant leurs observations aux siennes, qu'Hypparque reconnut le changement de la position équinoxiale des étoiles, changement que les Égyptiens et les Chaldéens paraissent avoir ignoré. Les périodes que les Chaldéens assignaient aux mouvemens sidéraux du Soleil, de la Lune, de ses nœuds et de son périgée, périodes que Geminus et Ptolémée nous ont transmises, supposent une année sidérale de $365^{j}\frac{1}{4}$, la même que l'année tropique admise généralement par les anciens astronomes, ils ne supposaient donc pas, dans les étoiles, un mouvement par rapport aux équinoxes. Ptolémée qui pouvait mieux que nous, connaître ce que l'on avait avant lui, pensé sur cet objet, dit expressément qu'Hypparque soupçonna le premier ce mouvement, et qu'il y fut conduit uniquement par la comparaison de ses observations avec celles d'Aristille et de Tymocharis. Hypparque reconnut que depuis le temps de ces astronomes, les étoiles s'étaient avancées en longitude comptée de l'équinoxe du printemps, d'un degré sexagésimal par siècle, sans changer de latitude au-dessus de l'écliptique, ce qu'il expliqua en faisant mouvoir la sphère des étoiles, autour des pôles de l'écliptique. Ptolémée confirma par ses propres observations, la découverte d'Hypparque; mais ayant conclu de ses observations défectueuses des équinoxes, la même durée de l'année tropique qu'Hypparque avait donnée, il dut retrouver, et il retrouva en effet, le même mouvement des étoiles en longitude. Les astronomes arabes rectifièrent ce mouvement; ils remarquèrent l'inexactitude des équinoxes de Ptolémée. En comparant ceux qu'ils observèrent, avec les équinoxes d'Hypparque, ils donnèrent une durée de l'année tropique, plus exacte que celle qui fut depuis

déterminée par Copernic, et ils en conclurent le vrai mouvement des étoiles en longitude.

Copernic ayant substitué les mouvemens réels de la Terre, aux mouvemens apparens des astres, expliqua la précession des équinoxes par un mouvement des pôles de la Terre, autour des pôles de l'écliptique, ce qui, maintenant, est généralement admis, mais il ne s'occupa point de la cause de ce mouvement, se bornant à démêler dans les mouvemens apparens des astres, ce qui est dû aux mouvemens réels de la Terre. Képler porté par une imagination active, à la recherche des causes, essaya de découvrir celle de la précession des équinoxes après diverses tentatives, il avoua l'inutilité de ses efforts.

Il était réservé à Newton, de nous faire connaître la cause de ce phénomène, en la rattachant à sa découverte de la pesanteur universelle dont il est l'un des plus curieux résultats, et l'une des plus fortes preuves. Après avoir reconnu par sa théorie, l'aplatissement de la Terre et la cause du mouvement des nœuds de l'orbite lunaire, Newton considérant le renflement graduel du sphéroïde terrestre, des pôles à l'équateur, comme le système d'un nombre infini de satellites, vit bientôt que l'attraction solaire devait faire rétrograder les nœuds des orbites qu'ils décrivent, comme elle fait rétrograder les nœuds de la Lune, et que l'ensemble de ces mouvemens devait produire un mouvement rétrograde dans l'intersection de l'équateur de la Terre avec l'écliptique. Voici comment il détermine ce mouvement.

Ce grand géomètre supposant la Terre homogène, la conçoit formée 1°. d'une sphère intérieure dont le diamètre est l'axe des pôles, 2°. de l'excès du sphéroïde terrestre sur cette sphère. Il imagine d'abord cet excès réuni autour de l'équateur, sous la forme d'un anneau détaché du globe, en conservant toujours son mouvement de rotation. Il trouve qu'alors ses nœuds auraient sur l'écliptique, un mouvement rétrograde qui serait au mouvement rétrograde des nœuds de l'orbe lunaire, comme le jour sidéral est à la durée d'une révolution sidérale de la Lune; résultat exact et que l'on peut facilement déduire de l'expression différentielle de la précession des équinoxes, donnée dans le n° 4 du cinquième Livre, en y supposant, comme Newton l'a fait d'abord, l'inclinaison de l'écliptique sur l'équateur, très petite. Newton remarque ensuite que l'anneau, par son adhérence à l'équateur du globe terrestre, doit communiquer à la masse entière de ce globe, une très grande partie

du mouvement rétrograde de ses nœuds, qui par là se trouve extrêmement affaibli Mais de quelle manière cette communication doit-elle se faire? quel est le mouvement rétrograde qu'elle produit dans l'intersection de l'équateur et de l'écliptique? C'est dans la solution de ces deux questions, que consiste la principale difficulté du problème.

Il était naturel que Newton fît usage pour cet objet, de la règle suivante qu'il a donnée dans le scholie qui termine l'exposition de la troisième loi du mouvement ou de l'égalité de l'action à la réaction, dans l'ouvrage des Principes

« Si l'on estime l'action de l'agent, par sa force multipliée par sa » vitesse, et que l'on estime pareillement la réaction du corps résistant, » par les vitesses de chacune de ses parties, multipliées respectivement » par les forces qu'elles ont pour résister en vertu de leur cohésion, de » leur attrition, de leur poids et de leur accélération, l'action et la » réaction se trouveront égales dans les effets de toutes les machines. »

Pour appliquer cette règle à la question présente, il faut observer que la force imprimée à l'anneau par l'action solaire, est égale à la masse de l'anneau, multipliée par son mouvement de précession. Ainsi l'action de l'agent sur le corps résistant ou sur le globe terrestre, est ici le produit de cette masse par son mouvement de précession, diminué de la précession qui lui reste et qui lui est commune avec le globe, et par sa vitesse qui est celle de rotation de la Terre à l'équateur Chaque molécule du globe reçoit une force égale à son accélération multipliée par sa masse; et en vertu de la cohésion des molécules, cette accélération est la précession terrestre multipliée par la distance de la molécule à l'axe des pôles, la moitié de cet axe étant prise pour unité. La vitesse de la molécule est la vitesse de rotation à l'équateur, multipliée par cette distance, la réaction du corps résistant est donc égale à la somme des produits de chaque molécule, par le carré de sa distance à l'axe, par la précession terrestre, et par la vitesse de rotation à l'équateur. Newton eût pu facilement déterminer cette somme en égalant ensuite l'action de l'agent, à la réaction du corps résistant, il aurait trouvé la précession terrestre égale à la précession primordiale de l'anneau, multipliée par le rapport de la masse de l'anneau à celle de la Terre, et par le facteur $\frac{5}{4}$. Au lieu de ce vrai facteur, Newton déduit de considérations inexactes, le facteur $\frac{3}{34}$ du carré de la demi-circonférence dont le rayon est l'unité. En supposant, comme Newton l'a fait d'abord, l'excès du sphéroïde

terrestre sur la sphère dont le diamètre est l'axe des pôles, réuni sous la forme d'un anneau à l'équateur, on obtient une précession plus grande que la véritable; car l'action du Soleil sur les molécules de cet excès, pour faire rétrograder les équinoxes, est plus petite et a moins d'énergie que dans cette hypothèse, il faut donc diminuer la précession qui en résulte Newton, dans la première édition de son ouvrage des Principes, la réduisait au quart; depuis, il ne l'a réduite qu'aux deux cinquièmes; ce qui est exact Il la multiplie ensuite par le cosinus de l'inclinaison de l'écliptique à l'équateur, pour tenir compte de cette inclinaison, ce qui est encore exact. Ainsi la solution newtonienne du problème de la précession des équinoxes, n'est en défaut que par le facteur erronné dont je viens de parler, facteur qui réduit la précession au-dessous de la moitié de sa vraie valeur. Il est vraisemblable que ce grand géomètre eût rectifié cette erreur capitale, mais bien excusable dans le premier inventeur, si, moins livré à des occupations d'un tout autre genre, il eût donné une attention plus particulière aux découvertes des géomètres du continent, telles que le principe par lequel Jacques Bernoulli a déterminé les oscillations des pendules composés, et le principe des vitesses virtuelles, publié sans démonstration par Jean Bernoulli, principes dont le premier a une grande analogie avec la règle énoncée ci-dessus, et dont le second est une généralisation de cette règle Mais alors la correction de son erreur lui eût fait éprouver quelque difficulté à concilier avec l'observation, son résultat de la précession des équinoxes, qui par là devenait beaucoup trop grand. Pour avoir la précession totale, il faut ajouter la précession solaire à la précession lunaire, et pour obtenir celle-ci, Newton multiplie la première, par le rapport de l'action lunaire sur ce phénomène, à l'action solaire. Ce rapport est le même que le rapport de ces actions sur les marées. Newton, dans la première édition de ses Principes, le trouvait par les observations des marées, égal à $6\frac{1}{3}$. Il l'a réduit ensuite à 4,4815. L'incertitude des observations dont il a fait usage, lui permettait de le diminuer encore, et l'on a vu dans le treizième Livre, que des observations très nombreuses des marées, faites chaque jour à Brest, pendant seize années consécutives, et discutées avec un soin particulier, donnent ce rapport égal à $2\frac{1}{3}$, ce qui rapproche considérablement, de l'observation, la formule newtonienne de la précession, corrigée de son erreur. Newton eût pu remarquer encore, que l'hypothèse

de l'homogénéité de la Terre, est peu vraisemblable, et qu'il est naturel de penser que les couches du sphéroïde terrestre croissent en densité, à mesure qu'elles se rapprochent du centre C'est ce qu'il supposait dans la première édition de ses Principes, mais il croyait que cette supposition rendait la Terre plus aplatie, et par conséquent, augmentait la précession des équinoxes, ce qui est entièrement contraire aux résultats de l'analyse qui a fait voir qu'en rectifiant toutes ces erreurs, la théorie de Newton devenait parfaitement conforme à l'observation.

Newton a remarqué l'inégalité de la nutation, produite par l'action du Soleil, et dont la période est de six mois. Mais il se contente d'observer qu'elle est très petite Il n'a point considéré les inégalités de la précession et de la nutation, dépendantes du mouvement des nœuds de l'orbe lunaire Dans la production de ces inégalités, l'action lunaire déjà insensible dans les inégalités de ce genre, qui sont indépendantes de l'inclinaison de cet orbe, est multipliée par cette petite inclinaison, et il fallait une analyse délicate et très épineuse pour reconnaître que les expressions de ces inégalités acquièrent par les intégrations, un très petit diviseur qui les rend sensibles. Ainsi la théorie qui, perfectionnée, a sur beaucoup de points, devancé l'observation, a été sur ce point, devancée par elle. Bradley dut à une longue suite d'observations, la découverte de la nutation de l'axe terrestre, découverte l'une des plus remarquables et des plus importantes de l'astronomie, en ce qu'elle affecte toutes les observations des astres. Ce grand astronome ayant reconnu par la précision de ses observations, l'aberration des étoiles et sa cause, s'aperçut bientôt qu'elle ne suffisait pas pour représenter les observations de plusieurs années, et que ces observations indiquaient une inégalité qu'il suivit pendant une période de dix-huit ans, après laquelle les étoiles lui parurent revenir à leur première position. Cette période la même que celle du mouvement des nœuds de la Lune, lui fit penser que l'axe de la Terre avait un mouvement périodique dépendant de la longitude de ces nœuds Machin lui proposa l'hypothèse du pôle vrai de la Terre décrivant uniformément autour du pôle moyen, pendant une période du mouvement des nœuds lunaires, un petit cercle, de manière que le pôle vrai fût le plus près de l'écliptique, lorsque le nœud ascendant de l'écliptique coïncide avec l'équinoxe du printemps. Bradley reconnut que par là, ses observations étaient à fort peu près représentées; mais qu'elles le seraient un peu

mieux encore, si l'on substituait au cercle, une ellipse peu aplatie Mechin n'a point fait connaître la théorie qui l'a conduit à son hypothèse, et qui, si elle eût été juste, lui aurait donné l'ellipticité de la courbe décrite par le pôle vrai de la Terre, et soupçonnée par Bradley. Il aurait vu que le grand axe de cette ellipse toujours tangent à la sphère céleste, passe constamment par le pôle moyen de la Terre et par celui de l'écliptique. Mais la découverte de ces résultats, était alors au-dessus des moyens de l'Analyse et de la Mécanique il fallait en inventer de nouveaux pour y arriver. L'honneur de cette invention était réservé à d'Alembert. Un an et demi après la publication de l'écrit dans lequel Bradley présenta sa découverte, d'Alembert fit paraître son Traité de la précession des équinoxes, ouvrage aussi remarquable dans l'histoire de la Mécanique céleste et de la Dynamique, que l'écrit de Bradley dans les annales de l'Astronomie

D'Alembert détermine d'abord les résultantes des attractions du Soleil et de la Lune sur toutes les molécules du sphéroide terrestre qu'il suppose être un solide de révolution; résultantes auxquelles il applique en sens contraire, la résultante de ces attractions sur le centre de la Terre, que l'on doit ici considérer comme immobile Pour avoir la vraie situation de la Terre autour de ce point, d'Alembert choisit pour coordonnées, l'inclinaison de l'axe du sphéroide, au plan de l'écliptique, l'angle que l'intersection de ces deux plans ou la ligne des équinoxes forme avec une droite fixe, menée sur l'écliptique par le centre de la Terre; enfin l'arc compris entre un point déterminé de l'équateur terrestre, et le point où cet équateur coupe l'écliptique à l'équinoxe du printemps. Les variations de ces coordonnées pendant un instant, donnent la vitesse correspondante de chaque molécule du sphéroide. D'Alembert, en appliquant ici son principe général de Dynamique, décompose cette vitesse en deux, l'une qui subsiste dans l'instant suivant, et l'autre qui est détruite, et qui ne peut l'être que par les résultantes des attractions du Soleil et de la Lune En déterminant ensuite les résultantes de ces vitesses détruites, et en les supposant en équilibre avec les résultantes des attractions des deux astres; il parvient au moyen des conditions de l'équilibre d'un nombre quelconque de forces, conditions qu'il a le premier établies, à trois équations différentielles du second ordre, entre les trois coordonnées. L'une de ces équations est facile à intégrer . elle donne la vitesse de rotation du

sphéroïde par rapport à l'équinoxe D'Alembert n'intègre point les deux autres équations il se contente de faire voir que la nutation du pôle terrestre observée par Bradley en est une conséquence nécessaire, et il détermine le rapport des deux axes de la petite ellipse décrite par le pôle vrai de la Terre, et la loi du mouvement de ce pôle sur cette ellipse, résultats précieux qui sont généralement adoptés dans les tables astronomiques. En comparant aux observations, les expressions analytiques de la nutation et de la précession, d'Alembert en conclut le rapport de l'action de la Lune à celle du Soleil, mais il observe qu'une très petite différence dans la valeur de la nutation, changerait sensiblement ce rapport, et celui de la masse de la Lune à la masse de la Terre, que l'on conclut de ce rapport.

D'Alembert détermine ensuite les rapports de la précession et de la nutation avec la figure de la Terre, et les lois de la densité et de l'ellipticité de ses couches, depuis son centre jusqu'à sa surface il en conclut que l'ellipticité $\frac{1}{174}$, qui résulte de la comparaison des degrés mesurés en Laponie en 1736, et à l'équateur, ne peut satisfaire à ces rapports. Ce grand géomètre croit cependant qu'il est possible de concilier avec ces mesures, la théorie de l'attraction, en considérant que la Terre est recouverte en grande partie par la mer dont les molécules cédant à l'action des astres, ne doivent point, suivant lui, contribuer aux mouvemens de l'axe terrestre, en sorte qu'il ne faut employer dans le calcul de ces mouvemens, que l'ellipticité du sphéroïde recouvert par l'océan, ellipticité qui peut être supposée moindre que celle de la surface de la mer Mais ayant soumis à une analyse exacte, les oscillations d'un fluide qui recouvrirait le sphéroïde terrestre, et la pression qu'il exerce sur la surface du sphéroïde, j'ai fait voir que ce fluide transmet à l'axe terrestre, les mêmes mouvemens, que s'il formait une masse solide avec la Terre M. Plana, par d'ingénieuses et savantes recherches sur les oscillations des fluides qui recouvrent les planètes, vient de confirmer ce résultat important, auquel j'avais donné dans le cinquième Livre, la plus grande généralité, en établissant par le principe de la conservation des aires, que l'action des astres sur la mer, quelle que soit la manière dont elle recouvre le sphéroïde terrestre, produit sur la nutation et la précession, les mêmes effets, que si la mer venait à se consolider. La difficulté que la théorie de l'attraction présente sur cet objet, subsiste

donc si l'ellipticité de la Terre est $\frac{1}{174}$. Cet aplatissement ne peut encore se concilier dans cette théorie, avec les observations du pendule de l'équateur aux pôles, qui donnent un aplatissement au-dessous de $\frac{1}{230}$. Mais une vérification du degré de Laponie, faite par M. Swanberg astronome suédois, a montré que la mesure de ce degré à laquelle on avait accordé trop de confiance, est fautive. La nouvelle mesure de M. Swanberg comparée aux degrés mesurés en France, dans l'Inde et à l'équateur, donne un aplatissement au-dessous de $\frac{1}{300}$, et par là, concilie avec la théorie de l'attraction, les phénomènes de la précession et de la nutation, et les observations du pendule. L'erreur de d'Alembert que nous venons de signaler, n'est pas le seul exemple que l'histoire des sciences nous offre de savans célèbres induits en erreur par trop de confiance dans des mesures fautives. Ce fut par la mesure inexacte de la hauteur du baromètre, faite par le père Feuillée au sommet du pic de Ténériffe, que Daniel Bernoulli fut conduit à l'étrange hypothèse de l'accroissement de la chaleur à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère au-dessus de la surface de la Terre. Il importe donc au géomètre de ne s'appuyer que sur des observations très exactes et vérifiées avec un soin particulier.

D'Alembert applique sa solution du problème de la précession des équinoxes aux deux cas que Newton avait considérés, celui où la Terre serait réduite à l'enveloppe qui recouvre une sphère dont le diamètre serait l'axe des pôles, et le cas où les molécules de cette enveloppe seraient réunies sous la forme d'un anneau, à l'équateur. Il examine le cas où la Terre n'aurait point de mouvement de rotation. Je tiens de ce grand géomètre, qu'il avait d'abord pensé que la Terre étant supposée un solide de révolution, sa rotation ne devait avoir aucune influence sur les phénomènes de la précession et de la nutation; parce que tous les méridiens étant semblables et se présentant successivement de la même manière au Soleil et à la Lune, l'action de ces astres sur l'axe terrestre est la même, soit que la Terre tourne sur elle-même, soit qu'elle ne tourne pas. C'était, en effet, conformément à cette idée, qu'il avait précédemment considéré les oscillations de l'atmosphère, dans sa pièce sur la cause des vents. Il parvint ainsi, sur la précession et sur la nutation, à des résultats contraires aux observations. Mais avant que de rien prononcer sur un objet de cette importance, il voulut revoir avec le plus grand soin ses calculs,

et soumettre à un nouvel examen, les principes qui leur servaient de base, et spécialement celui de la non influence de la rotation de la Terre sur les mouvemens de l'axe terrestre. Ayant donc traité cette question en considérant le mouvement de rotation, il parvint à des résultats fort différens de ceux qu'il avait d'abord obtenus, et ces nouveaux résultats se trouvèrent parfaitement conformes aux observations de la précession et de la nutation.

D'Alembert détermine la position de l'axe instantané de rotation, et la vitesse de rotation. N'ayant point intégré les équations différentielles qu'il avait trouvées, il n'a point considéré les inégalités du mouvement de l'axe terrestre, qui dépendent de sa position et de son mouvement primitifs, inégalités que j'ai déterminées dans le n° 4 du cinquième Livre. Les observations les plus précises n'ayant point fait reconnaître ces inégalités, il est naturel de penser que si elles ont eu lieu primitivement, les fluides qui recouvrent le sphéroïde terrestre les ont à la longue anéanties par leur frottement et leurs chocs multipliés contre sa surface. On conçoit en effet, que ces causes diminuent sans cesse la force vive du système de ces fluides et du sphéroïde; mais elles n'altèrent point la somme des aires que toutes les molécules de ce système décrivent sur le plan du *maximum* des aires. La diminution de la force vive doit donc avoir une limite qu'elle finit par atteindre; ce qui ne peut arriver que dans le cas où ces fluides sont en repos sur la surface du sphéroïde, l'axe de rotation de la Terre étant immobile autour de son centre. J'ai prouvé dans l'onzième Livre, qu'un tel axe est toujours possible, quelle que soit la manière dont l'océan recouvre le sphéroïde terrestre. Il devient, lorsque l'équilibre est établi, perpendiculaire au plan du *maximum* des aires, et la rotation de la Terre autour de cet axe, doit être telle que la somme des aires décrites par chaque molécule de la Terre, soit la même qu'à l'origine. Ainsi cette somme et le plan du *maximum* des aires, qui restent toujours l'un et l'autre les mêmes qu'à l'origine, s'il n'y a point d'action étrangère, déterminent la position de l'axe de rotation de la Terre et sa vitesse de rotation, lorsqu'elle parvient à l'état d'équilibre.

D'Alembert a étendu dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1754, sa solution du problème de la précession des équinoxes, au cas où l'équateur et les parallèles terrestres seraient elliptiques, ce qui donne la solution générale de ce problème, lorsque dans

l'action du Soleil et de la Lune, on ne porte l'approximation que jusqu'aux termes divisés par le cube de leurs distances à la Terre. Enfin il a déterminé par la même analyse, le mouvement d'un corps solide animé par des forces quelconques, autour de son centre de gravité.

Euler a traité depuis les mêmes sujets, avec beaucoup d'élégance, soit dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, soit dans son Traité de la Mécanique des Corps durs Son premier Mémoire sur la précession des équinoxes, parut dans le volume des Mémoires de cette Académie pour l'année 1749. Il n'y fait aucune mention du traité de d'Alembert; mais dans le volume suivant, il reconnut expressément, qu'il n'avait composé son Mémoire, qu'après la lecture de l'ouvrage du géomètre français La méthode d'Euler est identique avec une seconde solution du problème de la précession des équinoxes, que d'Alembert avait donnée dans son ouvrage, solution moins rigoureuse que la première, mais qui conduit fort simplement aux mêmes résultats

C'est à Euler que l'on est redevable des équations générales du mouvement d'un corps solide animé par des forces quelconques, que j'ai développées dans le chapitre VII du premier Livre La découverte des trois axes principaux de rotation, due à Ségner, apporte d'utiles simplifications dans un sujet aussi compliqué; et les équations auxquelles Euler est parvenu, me paraissent être les plus simples qu'il soit possible d'obtenir

Plusieurs géomètres ont essayé de traiter synthétiquement le problème de la précession des équinoxes; mais leurs solutions inexactes, du moins pour la plupart, sont autant d'exemples de la supériorité de l'analyse sur la synthèse.

Les recherches de d'Alembert et d'Euler laissaient encore à considérer plusieurs points importans que j'ai discutés dans le cinquième Livre L'un de ces points est l'influence de la fluidité de la mer, de ses courans et de ceux de l'atmosphère, sur les mouvemens de l'axe terrestre: j'ai reconnu, comme je l'ai dit précédemment, que cette influence est la même que si ces fluides formaient une masse solide adhérente au sphéroïde terrestre.

Un second point est l'influence de l'aplatissement de la Terre, sur l'obliquité de l'écliptique et sur la longueur de l'année Si le Soleil et la Lune agissaient seuls sur la Terre, l'inclinaison moyenne de l'équateur à l'écliptique serait constante. Mais l'action des planètes

change continuellement la position de l'orbe terrestre, et il en résulte dans son obliquité sur l'équateur, une diminution confirmée par toutes les observations anciennes et modernes La même cause donne aux équinoxes, un mouvement annuel direct d'environ un dixième de seconde centésimale Ainsi la précession annuelle produite par l'action du Soleil et de la Lune est diminuée de cette quantité, par l'action des planètes Ces effets de l'action des planètes sont indépendans de l'aplatissement du sphéroide terrestre Mais l'action du Soleil et de la Lune sur ce sphéroide doit les modifier et en changer les lois.

Rapportons à un plan fixe, la position de l'orbite de la Terre et le mouvement de son axe de rotation Il est clair que l'action du Soleil supposé mu constamment sur cette orbite, produira dans cet axe en vertu des variations de l'écliptique, un mouvement d'oscillation analogue à la nutation, avec cette différence, que la période de ces variations étant incomparablement plus longue que celle des variations du plan de l'orbe lunaire, l'étendue de l'oscillation correspondante dans l'axe de la Terre, est beaucoup plus grande que celle de la nutation L'action de la Lune produit dans ce même axe, une oscillation semblable; parce que l'inclinaison moyenne de son orbe sur l'écliptique vraie, est constante Le déplacement de l'écliptique, en se combinant avec l'action du Soleil et de la Lune sur la Terre, produit donc dans son obliquité sur l'équateur, une variation très différente de ce qu'elle serait en vertu de ce seul déplacement L'étendue entière de cette variation due à ce déplacement, se trouve par là réduite environ au quart de sa valeur

La variation du mouvement des équinoxes, produite par les mêmes causes, change la longueur de l'année tropique dans les différens siècles Cette durée diminue quand ce mouvement augmente, ce qui a lieu présentement, et l'année actuelle est plus courte d'environ 13″ centésimales, qu'au temps d'Hypparque Mais cette variation dans la longueur de l'année a des limites qui sont encore restreintes par l'action du Soleil et de la Lune sur le sphéroide terrestre L'étendue de ces limites serait d'environ 500″, par le déplacement seul de l'écliptique. elle est réduite à 120″ par cette action.

J'ai recherché avec tout le soin qu'exige l'importance de l'objet dans l'Astronomie, si les inégalités séculaires des mouvemens de la Terre et de la Lune, pouvaient déplacer sensiblement l'axe de rota-

tion, sur la surface du sphéroïde terrestre, et altérer le mouvement de rotation J'ai reconnu que ces effets seront toujours insensibles. M. Poisson a confirmé depuis, ce résultat important, par une savante analyse insérée dans le tome VIII du Journal de l'École Polytechnique Il restait à discuter une cause de variation du mouvement diurne de rotation, que les expériences faites sur la température des mines profondes, m'a paru indiquer. Ces expériences donnent un accroissement de température, à mesure que l'on s'enfonce au-dessous de la surface de la Terre. Il est naturel d'en conclure que la Terre a une chaleur intérieure, croissante de la surface au centre, et qui diminue sans cesse, par les pertes qu'elle éprouve à cette surface. En vertu de cette diminution, les parties de la Terre se resserrent, et comme cette cause n'altère point l'aire décrite par le rayon vecteur de chaque molécule du sphéroïde terrestre projetée sur le plan de l'équateur, le mouvement de rotation doit par là s'accélérer On a vu dans l'onzième Livre, que l'effet de cette cause est jusqu'à présent, insensible, en sorte que l'on peut regarder comme constante, la durée du jour, que les astronomes ont prise pour étalon du temps

Enfin un troisième point de discussion, est la nutation de l'orbe lunaire, correspondante à la nutation de l'équateur terrestre Il résulte du n° 10 du second Livre, que, vu la grande distance du Soleil à la Terre et à la Lune, le centre de gravité du système de ces deux derniers corps, est à très peu près attiré par le Soleil, comme si toutes les molécules de ce système étaient réunies à ce centre. De là il suit que la somme des aires décrites autour de ce point, par le rayon vecteur de chaque molécule projetée sur le plan mené par le même point parallèlement à l'écliptique, est toujours le même en temps égal, quelle que soit la manière dont ces molécules agissent et réagissent les unes sur les autres Or, en vertu de la nutation de l'axe terrestre, la somme des aires décrites par les molécules du sphéroïde terrestre, autour du centre de gravité du système de la Terre et de la Lune, est assujettie à une inégalité semblable à la nutation, l'aire décrite par le rayon vecteur de la Lune, doit donc être assujettie à une inégalité contraire, ce qui ne peut avoir lieu qu'autant que l'expression de la latitude de la Lune, contient une inégalité proportionnelle au sinus de la longitude moyenne de la Lune, et dont le coefficient dépend, comme celui de la nutation, de l'aplatissement de la

Terre Je retrouve ainsi l'inégalité à laquelle je suis parvenu dans le second chapitre du Livre VII, par la considération directe de l'action du sphéroïde terrestre sur la Lune

J'avais négligé dans le cinquième Livre, la petite nutation dépendante du double de la longitude du nœud lunaire, parce qu'elle me paraissait devoir être insensible Mais comme on peut facilement la comprendre dans les tables de la précession et de la nutation, j'en donne ici l'expression qui confirme ce que j'avais dit à son égard

Quelques astronomes ont pensé qu'il serait avantageux dans le calcul de ces phénomènes, d'employer la longitude vraie de la Lune, au lieu de sa longitude moyenne Mais il est aisé de voir par l'expression différentielle de la nutation, réduite en sinus et cosinus du temps, que la différence entre la longitude vraie du nœud de la Lune et sa longitude moyenne serait insensible dans l'intégrale, parce qu'elle n'acquiert point par l'intégration pour diviseur, le très petit coefficient du temps dans la valeur de la longitude du nœud, en employant donc la longitude vraie du nœud, au lieu de sa longitude moyenne, on s'exposerait à une erreur qui pourrait devenir sensible.

Enfin, pour ne rien négliger sur un objet de cette importance dans l'Astronomie, j'ai considéré les termes dépendans des variations séculaires des mouvemens de la Lune, et ceux qui dépendent de la quatrième puissance de sa parallaxe et de celle du Soleil, et j'ai trouvé qu'ils sont insensibles

Formules générales du mouvement de l'équateur terrestre.

2 Les expressions différentielles de ce mouvement, que j'ai données dans le n° 4 du Livre V, me paraissent être les plus simples auxquelles on puisse parvenir Mais on peut leur donner la forme suivante qui présente quelques résultats utiles que nous allons exposer.

Soient x', y', z' les coordonnées d'une molécule dm de la Terre, rapportées au centre de gravité de cette planète, et à un plan fixe Désignons par x'', y'', z'', les coordonnées de la même molécule, rapportées au même centre et au premier, au second, et au troisième axe principal de la Terre que nous supposerons être à très peu près son axe de rotation. Nommons θ le complément de l'angle que ce troisième axe forme sur le plan fixe; et ψ le complément de l'angle que la pro-

jection de cet axe sur ce plan forme avec l'axe de x', ψ sera l'angle que ce dernier axe fait avec la ligne d'intersection du plan fixe, et du plan formé par le premier et le second axe principal Désignons encore par φ l'angle que cette ligne d'intersection fait avec le second axe principal Cela posé, on aura par le n° 26 du premier Livre,

$$\begin{aligned} x' &= x''(\cos\theta.\sin\psi.\sin\varphi + \cos\psi.\cos\varphi) \\ &\quad + y''(\cos\theta.\sin\psi.\cos\varphi - \cos\psi.\sin\varphi) + z''.\sin\theta.\sin\psi, \\ y' &= x''(\cos\theta.\cos\psi.\sin\varphi - \sin\psi.\cos\varphi) \\ &\quad + y''(\cos\theta.\cos\psi.\cos\varphi + \sin\psi.\sin\varphi) + z''.\sin\theta.\cos\psi. \\ z' &= z''.\cos\theta - y''.\sin\theta.\cos\varphi - x''.\sin\theta.\sin\varphi \end{aligned}$$

Soit

$$\int(y''^2 + z''^2)\,dm = \mathrm{A}, \quad \int(x''^2 + z''^2)\,dm = \mathrm{B}; \quad \int(y''^2 + x''^2)\,dm = \mathrm{C},$$

on aura, par les propriétés des axes principaux,

$$\int x''y''dm = 0, \quad \int x''z''dm = 0; \quad \int y''z''dm = 0;$$

toutes ces intégrales étant étendues à la masse entière de la Terre On aura, par la nature du centre de gravité,

$$\begin{aligned} &\int x'.\,dm = 0, \quad \int y'.\,dm = 0, \quad \int z'.\,dm = 0, \\ &\int x''.\,dm = 0, \quad \int y''.\,dm = 0, \quad \int z''.\,dm = 0. \end{aligned}$$

Considérons l'action d'un astre L sur la molécule dm Soient x, y, z les coordonnées de cet astre, rapportées au centre de la Terre, et aux axes des x', des y' et des z'. Faisons

$$r_1 = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2},$$

et

$$\frac{\mathrm{L}}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}} = \mathrm{V},$$

dt étant l'élément du temps, supposons

$$\begin{aligned} \frac{d\mathrm{N}}{dt} &= \int dm\left[x'\left(\frac{d\mathrm{V}}{dy'}\right) - y'\left(\frac{d\mathrm{V}}{dx'}\right)\right], \\ \frac{d\mathrm{N}'}{dt} &= \int dm\left[x'\left(\frac{d\mathrm{V}}{dz'}\right) - z'\left(\frac{d\mathrm{V}}{dx'}\right)\right], \\ \frac{d\mathrm{N}''}{dt} &= \int dm\left[y'\left(\frac{d\mathrm{V}}{dz'}\right) - z'\left(\frac{d\mathrm{V}}{dy'}\right)\right]; \end{aligned}$$

V est fonction de x, y, z, x', y', z' En y substituant pour x', y', z' leurs valeurs précédentes, V devient fonction de neuf quantités $x, y, z, x'', y'', z'', \varphi, \psi$ et θ, parmi lesquelles x'', y'', z'' sont invariables pour la même molécule On a donc

$$\left(\frac{dV}{dx'}\right) dx' + \left(\frac{dV}{dy'}\right) dy' + \left(\frac{dV}{dz'}\right) dz'$$
$$= \left(\frac{dV}{d\varphi}\right) d\varphi + \left(\frac{dV}{d\psi}\right) d\psi + \left(\frac{dV}{d\theta}\right) d\theta,$$

en ne faisant varier que φ, ψ et θ, dans les valeurs précédentes de x', y', z' Si l'on différencie ces valeurs, et qu'après les différentiations on fasse pour plus de simplicité, ψ nul, on aura

$$dx' = d\varphi(z'.\sin\theta - y'.\cos\theta) + y'.d\psi;$$
$$dy' = x'.\cos\theta.d\varphi - x'd\psi + z'd\theta,$$
$$dz' = -x'.d\varphi.\sin\theta - y'd\theta.$$

Substituant ces valeurs dans l'équation précédente aux différences partielles, on aura en comparant séparément les coefficiens de $d\varphi$, $d\psi$ et $d\theta$, les trois équations suivantes

$$\left(\frac{dV}{d\varphi}\right) = \cos\theta\left[x'\left(\frac{dV}{dy'}\right) - y'\left(\frac{dV}{dx'}\right)\right]$$
$$+ \sin\theta\left[z'\left(\frac{dV}{dx'}\right) - x'\left(\frac{dV}{dz'}\right)\right],$$
$$\left(\frac{dV}{d\psi}\right) = y'\left(\frac{dV}{dx'}\right) - x'\left(\frac{dV}{dy'}\right),$$
$$\left(\frac{dV}{d\theta}\right) = z'\left(\frac{dV}{dy'}\right) - y'\left(\frac{dV}{dz'}\right),$$

d'où l'on tire

$$z'\left(\frac{dV}{dx'}\right) - x'\left(\frac{dV}{dz'}\right) = \frac{\left(\frac{dV}{d\varphi}\right) + \cos\theta\left(\frac{dV}{d\psi}\right)}{\sin\theta}.$$

Maintenant, les variables φ, ψ et θ étant les mêmes pour toutes les molécules dm, il est clair que si l'on fait

$$V' = \int V dm = L.\int \frac{dm}{\sqrt{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2}},$$

on aura

$$\int dm\left[x'\left(\frac{dV}{dy'}\right)-y'\left(\frac{dV}{dx'}\right)\right]=-\left(\frac{dV'}{d\psi}\right),$$

$$\int dm\left[x'\left(\frac{dV}{dz'}\right)-z'\left(\frac{dV}{dx'}\right)\right]=\frac{-\left(\frac{dV'}{d\varphi}\right)-\cos\theta\left(\frac{dV'}{d\psi}\right)}{\sin\theta},$$

$$\int dm\left[y'\left(\frac{dV'}{dz'}\right)-z'\left(\frac{dV}{dy'}\right)\right]=-\left(\frac{dV'}{d\theta}\right)$$

Les seconds membres de ces équations sont les valeurs de $\frac{dN}{dt}$, $\frac{dN'}{dt}$, $\frac{dN''}{dt}$ présentées sous une autre forme.

Soient

$$\frac{p}{\sqrt{p^2+q^2+r^2}},\quad \frac{q}{\sqrt{p^2+q^2+r^2}},\quad \frac{r}{\sqrt{p^2+q^2+r^2}},$$

les cosinus des angles que l'axe instantané de rotation de la Terre fait avec le troisième axe, le second et le premier de ses axes principaux, soit encore $dt.\sqrt{p^2+q^2+r^2}$, la vitesse angulaire de rotation autour de cet axe instantané, on aura par les n°s 26 et 28 du premier Livre, les équations

$$Cdp+(B-A)qrdt=-dN.\cos\theta-dN'.\sin\theta,$$
$$Adq+(C-B)prdt=-(dN.\sin\theta+dN'.\cos\theta)\sin\varphi+dN''.\cos\varphi,$$
$$Bdr+(A-C)pqdt=-(dN.\sin\theta+dN'.\cos\theta)\cos\varphi-dN''.\sin\varphi.$$

Substituant pour $\frac{dN}{dt}$, $\frac{dN'}{dt}$, $\frac{dN''}{dt}$, leurs valeurs précédentes, on aura

$$\left.\begin{aligned}
&C.\frac{dp}{dt}+(B-A)qr=\left(\frac{dV'}{d\varphi}\right),\\
&A.\frac{dq}{dt}+(C-B)pr=\frac{\sin\varphi}{\sin\theta}\left[\left(\frac{dV'}{d\psi}\right)+\cos\theta\left(\frac{dV'}{d\varphi}\right)\right]-\left(\frac{dV'}{d\theta}\right)\cos\varphi,\\
&B.\frac{dr}{dt}-(C-A)pq=\frac{\cos\varphi}{\sin\theta}\left[\left(\frac{dV'}{d\psi}\right)+\cos\theta\left(\frac{dV'}{d\varphi}\right)\right]+\left(\frac{dV'}{d\theta}\right)\sin\varphi
\end{aligned}\right\}\text{(F)}$$

C'est sous cette forme générale, que M Poisson a présenté les équations (G) du n° 4 du cinquième Livre

Si l'on développe V', ou

$$L.\int\frac{dm}{\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z-z')^2}},$$

dans une série ordonnée suivant les puissances négatives de la distance r_1 de l'astre L au centre de la Terre; on aura, en ne portant l'approximation que jusqu'aux termes de l'ordre $\frac{1}{r_1^3}$,

$$V' = \frac{LT}{r_1} - \frac{L}{2}\int\frac{dm(x'^2 + y'^2 + z'^2)}{r_1^3} + \frac{3L}{2}\int\frac{dm(xx' + yy' + zz')^2}{r_1^5},$$

T étant la masse entière de la Terre. En substituant pour x', y', z' leur valeurs précédentes, on trouvera

$$V' = \frac{LT}{r_1} + \frac{3L}{4r_1^5}(B - A)\left\{\begin{array}{l}[X^2 - (Y.\cos\theta - Z.\sin\theta)^2]\cos 2\varphi \\ + 2X(Y.\cos\theta - Z.\sin\theta)\sin 2\varphi\end{array}\right\}$$
$$+ \frac{3L}{4r_1^5}(2C - A - B)[X^2 + (Y.\cos\theta - Z.\sin\theta)^2 - \tfrac{2}{3}r_1^2],$$

X, Y, Z étant les coordonnées x, y, z de l'astre L rapportées par la supposition de ψ nul, à l'équinoxe du printemps, et aux deux axes perpendiculaires à la ligne des équinoxes, l'écliptique fixe d'une époque donnée étant prise pour le plan fixe.

Quoique cette expression ne renferme point explicitement l'angle ψ, elle le renferme implicitement, parce que les coordonnées X et Y en dépendent. Si l'on nomme R la projection du rayon r_1 sur l'écliptique, et v l'angle que cette projection fait avec l'axe fixe d'où l'on compte les angles, on aura

$$X = R.\cos(v + \psi), \quad Y = R.\sin(v + \psi),$$

d'où l'on tire

$$\left(\frac{dX}{d\psi}\right) = -Y, \quad \left(\frac{dY}{d\psi}\right) = X,$$

par conséquent

$$\left(\frac{dV'}{d\psi}\right) = X\left(\frac{dV'}{dY}\right) - Y\left(\frac{dV'}{dX}\right)$$

Les équations (F) donneront ainsi

$$Cdp + (B - A)qrdt = \frac{3Ldt}{2r_1^3}(B - A)\left\{\begin{array}{l}[(Y\cos\theta - Z.\sin\theta)^2 - X^2]\sin 2\varphi \\ + 2X(Y\cos\theta - Z.\sin\theta)\cos 2\varphi,\end{array}\right.$$

$$A\,dq+(C-B)\,prdt=\frac{3Ldt}{r_1^5}(C-B)\begin{cases}(Y.\cos\theta-Z\sin\theta)(Y.\sin\theta+Z.\cos\theta)\cos\varphi\\-X(Y.\sin\theta+Z.\cos\theta)\sin\varphi,\end{cases}$$

$$B\,dr+(A-C)\,pqdt=\frac{3Ldt}{r_1^5}(A-C)\begin{cases}X(Y.\sin\theta+Z.\cos\theta)\cos\varphi\\+(Y\cos\theta-Z.\sin\theta)(Y\sin\theta+Z\cos\theta)\sin\varphi.\end{cases}$$

Ces équations sont identiquement les équations (G) du n° 4 du cinquième Livre. Elles donnent en les intégrant, les valeurs de φ, ψ et θ, au moyen des équations suivantes données dans le n° 26 du Ier Livre

$$d\varphi-d\psi\cos\theta=pdt,$$
$$d\psi.\sin\theta.\sin\varphi-d\theta.\cos\varphi=qdt,$$
$$d\psi.\sin\theta.\cos\varphi+d\theta.\sin\varphi=rdt.$$

On peut substituer $\frac{d\varphi}{dt}$, au lieu de p, dans les termes $(C-B)\,pr$ et $-(C-A)\,pq$, des équations (F), car la différence $\frac{d\varphi}{dt}-p$ étant égale à $\frac{d\psi}{dt}.\cos\theta$, et les valeurs de q et de r, étant de l'ordre de $\frac{d\psi}{dt}$ et $\frac{d\theta}{dt}$, on ne fait que négliger des termes de l'ordre des carrés et des produits des différentielles $d\psi$ et $d\theta$, et qui de plus ont les facteurs très petits $C-A$, et $C-B$. Cela posé, si l'on multiplie la seconde des équations (F) par $\cos\varphi$, et qu'on retranche le produit de la troisième de ces équations, multipliée par $\sin\varphi$, on formera la suivante,

$$\left(\frac{A+B}{2}\right)d\left(\frac{r\sin\varphi-q.\cos\varphi}{dt}\right)$$
$$-\left(\frac{A-B}{2}\right)d\left(\frac{q.\cos\varphi+r.\sin\varphi}{dt}\right)$$
$$-C.\frac{d\varphi}{dt}(r.\cos\varphi+q.\sin\varphi)=\left(\frac{dV'}{d\theta}\right)$$

On a

$$r.\sin\varphi-q.\cos\varphi=\frac{d\theta}{dt};$$

$$r.\cos\varphi+q.\sin\varphi=\frac{d\psi}{dt}.\sin\theta;$$

$$r.\sin\varphi+q.\cos\varphi=\frac{d\psi}{dt}.\sin\theta.\sin 2\varphi-\frac{d\theta}{dt}.\cos 2\varphi,$$

p serait égal à une constante n, si la Terre était un solide de révolution, et dans le cas général, la valeur de p est une constante n plus le produit de $A - B$, et de la force perturbatrice, par $\sin 2\varphi$ et $\cos 2\varphi$, en négligeant donc ce produit, et celui des différentielles $d\psi$ et $d\vartheta$, on pourra supposer $\frac{d\varphi}{dt} = n$, dans l'équation précédente qui devient

$$\frac{A+B}{2} \cdot \frac{dd\theta}{dt^2} - Cn \cdot \frac{d\psi}{dt} \cdot \sin\theta$$
$$- \left(\frac{A-B}{2}\right) d\left(\frac{d\psi}{dt} \cdot \sin\theta \cdot \sin 2\varphi - \frac{d\theta}{dt} \cdot \cos 2\varphi\right) = \left(\frac{dV'}{d\theta}\right).$$

Si le sphéroïde était de révolution, le terme qui a pour facteur $A - B$ disparaîtrait dans tous les cas il est insensible, parce que vu la rapidité du mouvement de rotation, les termes dépendans de $\sin 2\varphi$ et de $\cos 2\varphi$, déjà insensibles par eux-mêmes, acquièrent encore par les intégrations, le grand diviseur $2n$ L'équation précédente devient ainsi

$$\left(\frac{A+B}{2}\right) \cdot \frac{dd\theta}{dt^2} - Cn \cdot \frac{d\psi}{dt} \cdot \sin\theta = \left(\frac{dV'}{d\vartheta}\right) \qquad (i)$$

On trouvera de la même manière, en multipliant la seconde des équations (F) par $\sin\varphi$ et en l'ajoutant à la troisième multipliée par $\cos\varphi$,

$$\left.\begin{aligned}\left(\frac{A+B}{2}\right) d\,\frac{\left(\frac{d\psi}{dt} \cdot \sin\theta\right)}{dt} - \left(\frac{A-B}{2}\right) d\,\frac{\left(\frac{d\psi}{dt} \cdot \sin\theta \cdot \cos 2\varphi + \frac{d\theta}{dt} \sin 2\varphi\right)}{dt} \\ + Cn \cdot \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{\sin\theta}\left[\left(\frac{dV'}{d\psi}\right) + \cos\theta\left(\frac{dV'}{d\varphi}\right)\right]\end{aligned}\right\}$$

Si l'on néglige, comme nous venons de le faire, les termes multipliés par $A - B$, et par $\frac{d\psi}{dt} \cdot \cos 2\varphi$, ou par $\frac{d\theta}{dt} \cdot \sin 2\varphi$, si l'on observe de plus que la rapidité du mouvement de la Terre, permet de négliger les termes dépendans de $\sin\varphi$, et de $\cos\varphi$ et par conséquent $\left(\frac{dV'}{d\varphi}\right)$, l'équation précédente donnera

$$\left(\frac{A+B}{2}\right) \cdot d\,\frac{\left(\frac{d\psi}{dt} \cdot \sin\theta\right)}{dt} + Cn\left(\frac{d\vartheta}{dt}\right) = \frac{1}{\sin\theta}\left(\frac{dV'}{d\psi}\right), \qquad (i')$$

Si l'on n'a égard dans les équations (ι) et (ι'), qu'aux termes de θ et ψ qui dépendent de l'action des astres, et si l'on considère que le mouvement des astres est fort lent par rapport au mouvement rapide de rotation de la Terre, on pourra négliger dans ces équations les secondes différentielles de θ et de ψ ainsi que les produits de leurs premières différences; et alors on a

$$\frac{d\psi}{dt} = -\frac{\left(\frac{dV'}{d\theta}\right)}{Cn \sin\theta},$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{\left(\frac{dV'}{d\psi}\right)}{Cn \cdot \sin\theta}.$$

Si dans l'expression de V' donnée ci-dessus, on néglige les termes multipliés par $\sin 2\varphi$, et par $\cos 2\varphi$, et si l'on suppose

$$P = \frac{3L}{r_1^5} \cdot (Y.\cos\theta - Z\sin\theta)(Y.\sin\theta + Z.\cos\theta),$$

$$P' = \frac{3L}{r_1^5} . X\,(Y.\sin\theta + Z\cos\theta);$$

on aura

$$\frac{d\psi}{dt}.\sin\theta = \frac{(2C - A - B)}{2nC} . P,$$

$$\frac{d\theta}{dt} = -\frac{(2C - A - B)}{2nC} . P'$$

Ces équations sont identiquement celles que j'ai données dans les n°s 5 et 6 du cinquième Livre. Elles sont les plus simples auxquelles on puisse parvenir.

Si l'on multiplie la première des équations (F) par p, la seconde par q, et la troisième par r; qu'ensuite on les ajoute, et que dans le second membre de l'équation résultante, on substitue pour p, q, et r, leurs valeurs; on aura

$$C.pdp + A.qdq + B.rdr = \left(\frac{dV'}{d\varphi}\right)d\varphi + \left(\frac{dV'}{d\psi}\right)d\psi + \left(\frac{dV'}{d\theta}\right)d\theta;$$

ce qui donne en intégrant

$$C.p^2 + A.q^2 + Br^2 = \text{constante} + 2d.\int V'dt;$$

la caractéristique différentielle d se rapportant aux seules variations

du mouvement du sphéroïde Ainsi en désignant par V'' la fonction $V' - \frac{LT}{r_1}$, on aura

$$C.p^2 + A.q^2 + B.r^2 = \text{constante} + 2d.\int V''dt$$

Quelque loin que l'on porte l'approximation de la valeur de $\int V''dt$, tout ce qui dépend de la précession ψ des équinoxes, de l'inclinaison θ de l'axe terrestre à l'écliptique, et de l'angle $nt + \varepsilon$, nt étant le mouvement de rotation de la Terre, ne peut avoir été introduit que par ces quantités; puisque les coordonnées des astres ne les renferment point. On aura donc $d.\int V''dt$, en faisant tout varier dans cette intégrale, à l'exception des angles introduits par les inégalités du mouvement des astres. Ce qui donne

$$d.\int V''dt = V'' - \int \left(\frac{dV''}{dt}\right)^1 dt,$$

la différence partielle $\left(\frac{dV''}{dt}\right)^1$, étant uniquement relative à la variation du mouvement des astres. L'équation précédente devient ainsi,

$$p^2 + q^2 + r^2 - \left(\frac{2C - A - B}{2C}\right)(q^2 + r^2) + \left(\frac{A - B}{2C}\right)(q^2 - r^2)$$
$$= n^2 + \frac{2V''}{C} - \frac{2}{C} \cdot \int \left(\frac{dV''}{dt}\right)^1 dt.$$

On a par ce qui précède

$$q^2 + r^2 = \left(\frac{d\psi}{dt}\right)^2 \sin^2\theta + \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2,$$

$$q^2 - r^2 = \left[\left(\frac{d\theta}{dt}\right) - \left(\frac{d\psi}{dt}\right)^2 \sin^2\theta\right] \cos 2\varphi$$
$$- 2\left(\frac{d\theta}{dt}\right) \cdot \frac{d\psi}{dt} \cdot \sin\theta \cdot \sin 2\varphi;$$

ces termes sont du second ordre, en considérant comme des quantités du premier ordre, celles qui sont de l'ordre l, lt étant la précession des équinoxes. En ne conservant donc que les quantités du premier ordre, qui sont multipliées par le sinus ou le cosinus d'un angle croissant avec une grande lenteur, ou dans lequel le coefficient du temps soit de l'ordre l; on voit que $q^2 + r^2$ et $q^2 - r^2$, ne renferment point de

termes semblables Ainsi en n'ayant égard qu'à des quantités de ce genre, on peut supposer

$$p^2 + q^2 + r^2 = n^2 + \frac{2V''}{C} - \frac{2}{C} \cdot \int \left(\frac{dV''}{dt}\right)^2 . dt$$

Maintenant ne considérons dans V'', que la partie qui est indépendante de $\sin 2\varphi$ et de $\cos 2\varphi$ Cette partie est, par ce qui précède,

$$\frac{3L}{4r_1^5} . (2C - A - B) \left[X^2 + (Y . \cos\theta - Z . \sin\theta)^2 - \frac{2}{3} . r_1^2\right]$$

Dans le cas d'un sphéroide de révolution, dans lequel $A = B$, on a vu dans le n° 8 du cinquième Livre, et il résulte de la valeur donnée ci-dessus de dp, que p devient une constante, et qu'ainsi $p^2 + q^2 + r^2$ ne contient point de quantités du premier ordre, multipliées par le sinus d'un angle croissant avec une très grande lenteur Mais la supposition de $A = B$ ne détruit point les quantités de ce genre, qui pourraient exister dans le cas d'un sphéroide quelconque; puisque cette supposition ne fait que changer $2C - A - B$, en $2(C - A)$ Il n'existe donc point de quantités semblables dans le cas d'un sphéroide quelconque, à moins que dans une seconde approximation, elles ne soient introduites dans la fonction

$$\frac{2V''}{C} - \frac{2}{C} \cdot \int \left(\frac{dV''}{dt}\right)^2 dt,$$

par les valeurs de $\delta\varphi$, $\delta\theta$ et $\delta\psi$, dépendantes des sinus et cosinus de 2φ Mais ces valeurs ayant acquis par les intégrations, de grands diviseurs de l'ordre $4n^2$, comme il est facile de le conclure des équations différentielles données ci-dessus; ayant de plus le facteur $A - B$ qui est insensible jusqu'ici pour la Terre, et acquérant encore ce facteur dans les termes indépendans de φ, qu'ils produisent dans la fonction précédente, nous nous dispenserons d'y avoir égard. D'ailleurs il résulte de l'analyse citée de M Poisson, que ces valeurs ne produisent dans cette fonction, aucun terme du premier ordre multiplié par le sinus ou cosinus d'un angle croissant avec une extrême lenteur. Les inégalités de l'intégrale

$$\int dt . \sqrt{p^2 + q^2 + r^2}$$

ou de la rotation de la Terre sont donc insensibles.

Le sinus de l'angle formé par l'axe instantané de rotation et par l'axe principal étant $\frac{\sqrt{q^2+r^2}}{\sqrt{p^2+q^2+r^2}}$,

il sera

$$\frac{1}{n}\cdot\sqrt{\left(\frac{d\psi}{dt}\cdot\sin\theta\right)^2+\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2},$$

et l'on voit par les expressions précédentes de $\frac{d\psi}{dt}\cdot\sin\theta$ et de $\frac{d\theta}{dt}$, qu'il sera toujours insensible. Ces deux résultats sont très importans, en ce qu'ils assurent l'uniformité de la rotation de la Terre, et la stabilité des latitudes terrestres.

Je n'ai point eu égard dans le cinquième Livre, à l'inégalité dépendante du double de la longitude du nœud de l'orbite lunaire, par la raison qu'elle est très petite relativement à la nutation. Cependant, vu la précision des observations modernes, et parce qu'il est facile de la comprendre dans une même table avec la nutation, je vais ici la déterminer.

Pour cela, je rapporterai les coordonnées X, Y, Z au plan de l'écliptique vraie, en faisant abstraction des variations séculaires de cette écliptique, ce que l'on peut faire ici. En désignant par v' la longitude de la Lune, comptée de l'equinoxe du printemps; et par Λ la longitude de son nœud ascendant, on aura,

$$X = r'_1\sqrt{1-\gamma^2\cdot\sin^2(v'-\Lambda)}\cos v',$$
$$Y = r'_1\cdot\sqrt{1-\gamma^2\sin^2(v'-\Lambda)}\sin v',$$
$$Z = r'_1\cdot\gamma\sin(v'-\Lambda),$$

r'_1 étant la distance de la Lune à la Terre, γ étant l'inclinaison de l'orbe lunaire à l'écliptique, inclinaison dont nous négligeons les puissances supérieures au carré. On aura à très peu près,

$$XY = \frac{r'_1}{2}\left[1-\tfrac{1}{2}\gamma^2+\tfrac{1}{2}\gamma^2\cdot\cos(2v'-2A)\right]\sin 2v'$$

En substituant au lieu de v', sa valeur approchée

$$m't-\tfrac{1}{4}\gamma^2\cdot\sin(2v'-2A),$$

on trouvera que XY contient le terme

$$\frac{r_1^2}{4} \cdot \sin 2\Lambda,$$

l'expression de P′ contient donc le terme

$$\frac{3L'}{4 \cdot r'^3_1} \cdot \sin\theta \cdot \gamma^2 \sin 2\Lambda.$$

Le terme

$$\frac{3L'}{r'^5_1} \cdot XZ \cdot \cos\theta$$

de la même expression, contient le terme

$$-\frac{3L'}{2r'^3_1} \cdot \cos\theta \, \gamma \cdot \sin\Lambda,$$

les deux inégalités dépendantes de $\cos\Lambda$ et de $\cos 2\Lambda$, dans l'expression de θ, ont donc des coefficiens qui sont dans le rapport de

$$-\frac{1}{2}\gamma \cos\theta, \quad \text{à} \quad \frac{1}{8}\gamma^2 \cdot \sin\theta,$$

ou dans le rapport de l'unité à $-\frac{1}{4}\gamma \cdot \tang\theta$ On trouve pareillement que le terme

$$\frac{3L'}{r'^5_1} \cdot Y^2 \cdot \sin\theta \cdot \cos\theta$$

de l'expression de P, produit le terme

$$-\frac{3L'}{8r'^3_1} \cdot \sin 2\theta \cdot \gamma^2 \cdot \cos 2\Lambda;$$

et que le terme

$$\frac{3L'}{r'^5_1} \cdot YZ(\cos^2\theta - \sin^2\theta)$$

produit le terme

$$\frac{3L'}{2r'^3_1} \cdot \cos 2\theta \cdot \gamma \cdot \cos\Lambda$$

Les inégalités de la précession, dépendantes de $\sin\Lambda$ et de $\sin 2\Lambda$, ont donc leurs coefficiens dans le rapport de l'unité à $-\frac{1}{4}\gamma \cdot \tang 2\theta$

De la Nutation de l'orbe lunaire, correspondante à la Nutation de l'équateur terrestre

Le centre de gravité du système formé de la Lune et de la Terre est attiré par le Soleil, à très peu près comme si toutes les molécules de ce système étaient réunies à ce centre, ce qui par le n° 10 du Livre II, résulte de la proximité de la Lune à la Terre, relativement à sa distance au Soleil. De là il suit que la somme des aires tracées à chaque instant par le rayon vecteur de chaque molécule projetée sur l'écliptique autour de leur centre commun de gravité, est constante. Soient donc X, Y, Z les coordonnées du centre de gravité de la Terre, rapportées au centre de gravité du système, et au plan de l'écliptique, soient x', y', z', celles d'une molécule dm de la Terre, et x, y, z, celles du centre de la Lune, rapportées toutes au centre de gravité de la Terre. On aura

$$\left.\begin{array}{l}\int dm\left[(X-x')\left(\frac{dY-dy'}{dt}\right)-(Y-y')\left(\frac{dX-dx'}{dt}\right)\right]\\ +L\left[(x-X)\left(\frac{dy-dY}{dt}\right)-(y-Y)\left(\frac{dx-dX}{dt}\right)\right]=\text{const.}\end{array}\right\},\quad (1)$$

L étant la masse de la Lune. Mais on a par la nature du centre de gravité,

$$\int x'dm = 0, \qquad \int y'dm = 0, \qquad \int z'dm = 0$$

Soit T la masse de la Terre, on aura

$$T = \int dm.$$

On a de plus par la propriété du centre de gravité,

$$L(x-X) = TX,$$

ce qui donne

$$X = \frac{Lx}{T+L}.$$

On aura pareillement

$$Y = \frac{Ly}{T+L},$$

l'équation (1) deviendra donc

$$\int dm\left(\frac{x'dy'-y'dx'}{dt}\right)+\frac{TL}{T+L}\left(\frac{xdy-ydx}{dt}\right)=\text{constante}$$

La première des équations (C) du n° 26 du premier Livre donne

$$Aq.\sin\theta.\sin\varphi+Br.\sin\theta.\cos\varphi-Cp\cos\theta=-\int dm\left(\frac{x'dy'-y'dx'}{dt}\right),\ (l)$$

et l'on a en vertu des expressions de p, q et r du n° précédent,

$$A.\sin\theta\,(q.\sin\varphi+r.\cos\varphi)+(B-A)\sin\theta.r.\cos\varphi$$

$$=A.\frac{d\psi}{dt}.\sin^2\theta+\frac{(B-A)}{2}\frac{d\psi}{dt}\sin^2\theta+\frac{(B-A)}{2}\left\{\begin{array}{l}\frac{d\psi}{dt}\sin^2\theta.\cos 2\varphi\\ +\frac{d\theta}{dt}.\sin\theta.\sin 2\varphi.\end{array}\right\}$$

L'équation précédente (l) deviendra en négligeant les termes multipliés par le sinus et le cosinus de 2φ, ce qui par le n° précédent, réduit p à la constante n,

$$nC.\cos\theta-\frac{(A+B)}{2}\frac{d\psi}{dt}\sin^2\theta+\frac{TL}{T+L}\left(\frac{xdy-ydx}{dt}\right)=\text{constante}\quad(2)$$

L'aire tracée dans l'instant dt, par le rayon vecteur de la Lune, est $xdy-ydx$ En désignant par a le demi-grand axe de l'orbe lunaire, par e son excentricité et par γ l'inclinaison de cet orbe à l'écliptique; on a, en regardant cet orbe, comme une ellipse variable,

$$xdy-ydx=a^2m'dt.\cos\gamma.\sqrt{1-e^2},$$

$m't$ étant le moyen mouvement de la Lune La partie de V' qui produit la nutation de l'équateur terrestre, est par le n° précédent,

$$-\frac{3L}{4r^3}(2C-A-B)\gamma.\sin\theta.\cos\theta.\cos\Lambda,$$

Λ étant la longitude du nœud de l'orbe lunaire J'ai donné dans le n° 1, du Supplément au Traité de Mécanique céleste, les expressions différentielles des élémens d'une ellipse variable, par une force perturbatrice R Cette force est augmentée par la considération de l'aplatissement de la Terre, de

la fonction $-V'$, comme il est facile de le voir par le n° cité. Il résulte encore des expressions différentielles du demi grand-axe, et de l'excentricité e, que la partie de V' dont je viens de parler, ne produit aucun terme sensible, dans ces expressions, en sorte que l'on peut supposer relativement à cette partie, a et e constans. L'équation (2) donne donc, en y substituant pour $\frac{xdy-ydx}{dt}$, sa valeur précédente, en désignant par $\delta\theta$ et $\delta\gamma$, les nutations de l'équateur terrestre et de l'orbe lunaire, et en observant que $\frac{d\psi}{dt}$ peut être négligé relativement à $\delta\theta$ qui par l'intégration, a acquis pour diviseur, le très petit coefficient du temps, dans l'expression du mouvement des nœuds de l'orbe lunaire, enfin en négligeant le carré e^2,

$$nC.\delta\theta.\sin\theta = -\frac{TL}{T+L}.a^2.m^1.\delta\gamma.\sin\gamma$$

Telle est la relation fort simple qui existe entre les nutations de l'équateur terrestre et de l'orbe lunaire.

On a par le n° 5 du Livre V,

$$nC.\delta\theta.\sin\theta = \frac{3m^2}{4}.\frac{\lambda}{f'}\frac{c'}{}(2C-A-B)\sin\theta.\cos\theta.\cos(f't+\mathcal{C}),$$

c' étant l'inclinaison de l'orbe lunaire, que nous désignons ici par γ, et $-f't-\mathcal{C}$ étant la longitude de son nœud ascendant. On a

$$m\lambda = \frac{L}{a^3},\ \frac{T+L}{a^3} = m'^2,$$

on aura donc en comparant les deux expressions précédentes de $\delta\theta$, et désignant $f't$ par $(g-1)m't$,

$$\delta\gamma = -\frac{3}{4a^2}\frac{(2C-A-B)}{(g-1)T}\sin\theta.\cos\theta.\cos[(g-1)m't+\mathcal{C}]$$

On a par le n° 2 du Livre V

$$2C-A-B = \tfrac{4}{3}.T(\alpha h - \tfrac{1}{2}\alpha\varphi)D^2,$$

αh étant l'ellipticité du sphéroide terrestre, $\alpha\varphi$ le rapport de la force centrifuge à la pesanteur à l'équateur, et D étant le rayon moyen du sphéroide terrestre, on a donc

$$\delta\gamma = -(\alpha h - \tfrac{1}{2}\alpha\varphi)\frac{D^2}{a^2}.\frac{\sin\theta\cos\theta}{g-1}.\cos[(g-1)m't+\mathcal{C}]$$

Soient

$$H \,.\, \sin\,(\iota t + k) + H' \,.\, \sin\,(\iota' t + k') + \text{etc}\ ,$$

les inégalités de la latitude de la Lune, dépendantes de l'aplatissement de la Terre; les angles $\iota t + k$, $\iota' t + k'$, étant rapportés comme la longitude Λ du nœud ascendant de l'orbite lunaire, à l'équinoxe du printemps La latitude lunaire étant

$$\gamma \,.\, \sin\,(m't - \Lambda)\ ,$$

sa variation relative aux variations de ses éléments, sera

$$\delta\gamma \,.\, \sin\,(m't - \Lambda) - \gamma\delta\Lambda \,.\, \cos\,(m't - \Lambda)\,;$$

ou

$$\sin m't\,(\delta\gamma \,.\, \cos\Lambda - \gamma\delta\Lambda \,.\, \sin\Lambda)$$
$$- \cos m't\,(\delta\gamma \,.\, \sin\Lambda + \gamma\delta\Lambda \,.\, \cos\Lambda)$$

En l'égalant à la fonction

$$H \,.\, \sin\,(\iota t + k) + H' \,.\, \sin\,(\iota t + k') + \text{etc.},$$

mise sous cette forme

$$\sin m't\,\{H \,.\, \cos[(\iota - m')\,t + k] + H' \,.\, \cos[(\iota' - m')t] + k'\} + \text{etc}\ ,$$
$$+ \cos m't\,\{H \,.\, \sin[(\iota - m')\,t + k] + H \,.\, \cos[(\iota' - m')t] + k'\} + \text{etc}\ ,$$

on aura

$$\delta\gamma \,.\, \cos\Lambda - \gamma\delta\Lambda \,.\, \sin\Lambda = H \,.\, \cos[(i - m')t + k] + H' \cos[(\iota' - m)t + k'] + \text{etc.},$$
$$\delta\gamma \,.\, \sin\Lambda + \gamma\delta\Lambda \,.\, \cos\Lambda = -H \sin[(\iota - m')t + k] - H' \sin[(\iota' - m)t + k'] - \text{etc.}$$

Si l'on multiplie la première de ces équations par $\cos\Lambda$, et qu'on l'ajoute à la seconde multipliée par $\sin\Lambda$, on aura

$$\delta\gamma = H \,.\, \cos[\Lambda + (i - m')\,t + k] + H' \,.\, \cos[\Lambda + (\iota' - m')t + k'] + \text{etc.}$$

En comparant cette valeur de $\delta\gamma$, à la précédente, on aura

$$(i - m')t + k = 0\,,$$

$$H = -\alpha\,(h - \tfrac{1}{2}\varphi)\,\frac{D^2}{a^2} \,.\, \frac{\sin\theta\ \cos\theta}{g - 1}\,;$$

$$H' = 0;\ \text{etc.}$$

Les inégalités lunaires en latitude, dues à l'aplatissement de la Terre, se réduisent ainsi à la suivante

$$-(\alpha h - \tfrac{1}{2}\alpha\varphi) \cdot \frac{D^2}{a^2} \cdot \frac{\sin\theta \cos\theta}{g - 1} \cdot \sin m't;$$

ce qui est conforme à ce que j'ai trouvé dans le chapitre II du Livre VII

Des inégalités de la Précession et de la Nutation de l'équateur terrestre, dépendantes de la quatrième puissance des parallaxes du Soleil et de la Lune.

4 Si l'on nomme v la déclinaison d'un astre L, υ sa longitude à l'équinoxe du printemps, ψ la distance de cet équinoxe à une ligne fixe sur l'écliptique, V′ la somme des produits de la masse L de l'astre par chaque molécule dm de la Terre, divisée par la distance de cette molécule au centre de L, enfin si l'on nomme T la masse de la Terre, et r la distance de son centre, à celui de L, on aura par le n° 35 du troisième Livre

$$V' = \frac{TL}{r} + \frac{(\frac{1}{2}\alpha\varphi - \alpha h)}{r^3} \cdot TL\left(\sin^2 v - \tfrac{1}{3}\right)$$
$$+ \frac{\alpha q}{r^4} \cdot TL\left(\sin^3 v - \tfrac{3}{5} \cdot \sin v\right) + \text{etc.};$$

en supposant que le rayon terrestre soit

$$1 - \alpha h(\mu^2 - \tfrac{1}{3}) + \alpha q\,(\mu^3 - \tfrac{3}{5}\mu) + \text{etc.},$$

μ étant le sinus de la latitude terrestre. Le terme

$$\frac{\alpha q\ TL}{r^4}\left(\sin^3 v - \tfrac{3}{5} \cdot \sin v\right)$$

est le terme que la considération de la quatrième puissance de la parallaxe de L ajoute à l'expression de V′ donnée ci-dessus. Pour en déterminer la valeur, nous observerons que s étant la latitude de L; γ l'inclinaison de son orbite, et A la longitude de son nœud ascendant, on a

$$\sin v = \cos\theta \cdot \sin s + \sin\theta \cdot \sin\upsilon \cdot \cos s;$$
$$\operatorname{tang} s = \operatorname{tang}\gamma \cdot \sin(\upsilon - A).$$

Ces équations donnent

$$\left(\frac{d\ \sin v}{d\psi}\right) = \sin\theta\,.\,\cos v\,.\,\cos s,$$

$$\left(\frac{d\ \sin v}{d\theta}\right) = \cos\theta\,.\,\sin v\,.\,\cos s - \sin\theta\,.\,\sin s$$

En effet, si F est formé d'angles rapportés à l'équinoxe mobile du printemps, et que i soit le nombre de ces angles pris positivement, et i' le nombre des angles pris négativement, on a généralement

$$\left(\frac{d\ \sin F}{d\psi}\right) = (i - i')\cos F,$$

car A étant un des angles de F, en lui donnant cette forme

$$A - \psi + \psi,$$

il est clair que par la variation de ψ, l'angle $A - \psi$ reste invariable.

De là il est facile de conclure que le terme précédent dépendant de $\frac{1}{r^4}$, ajoute à la valeur de $\frac{d\theta}{dt}$, donnée ci-dessus, la quantité

$$\frac{3\alpha q\ \mathrm{TL}\ \cos v\ \cos s}{n\mathrm{C}\ r^4}\left(\sin^2 v - \tfrac{1}{5}\right),$$

en négligeant le carré de γ, cette fonction devient

$$\frac{3\alpha q\ \mathrm{TL}}{n\mathrm{C}\ r^4}\,.\,\cos v\left\{\begin{array}{l}\tfrac{1}{2}.\sin^2\theta - \tfrac{1}{5} - \tfrac{1}{2}.\sin^2\theta.\cos 2v\\ -\tfrac{1}{2}\gamma\ \sin\theta.\cos\theta\left[\sin(2v - \Lambda) - \sin\Lambda\right]\end{array}\right\}$$

On voit d'abord que cette fonction ne contient point le sinus ou le cosinus de la longitude Λ du nœud, les seuls qui, affectés de γ, puissent devenir sensibles par l'intégration qui leur fait acquérir un très petit diviseur. Ainsi le coefficient de la nutation ne reçoit aucune augmentation des termes dépendans de la quatrième puissance de la parallaxe lunaire, ce qui a également lieu pour la précession. La seule influence que puisse avoir cette puissance, dépend de l'excentricité e de l'orbe lunaire. En effet, r étant à peu près

$$r_{\prime}\left[1 - e\,.\,\cos(u - \varpi)\right],$$

la fonction précédente donnera le terme

$$\frac{3\alpha q\ \mathrm{TL}}{4n\mathrm{C}\,.\,r_1^3}\,.\,\frac{1}{r_1}\,.\,e\,.\,\cos\varpi\left(\sin^2\theta - \tfrac{4}{5}\right)$$

En nommant ιt le mouvement du périgée lunaire, il en résultera dans la valeur de θ, le terme

$$\frac{3\alpha q\ \mathrm{TL}}{4n\mathrm{C}\ r_1^3}\ \frac{1}{r_1}\ \frac{e\ \sin\varpi}{\iota}.$$

Le terme de V′ dépendant de $\frac{1}{r_1^2}$, produit dans la valeur de θ, le terme

$$\left(\alpha h - \tfrac{1}{2}\alpha\varphi\right)\frac{\mathrm{TL}}{4\mathrm{C}\,r_1^3}\,.\,\cos\theta\,.\,\frac{\gamma\ \cos A}{f'},$$

$f't$ étant le mouvement rétrograde du nœud. Ainsi en nommant b le coefficient de $\cos A$, ou de la nutation, le coefficient de $\sin\varpi$ sera

$$b\,.\,\frac{3}{4}\,.\,\frac{e}{\gamma}\,.\,\frac{f'}{\iota}\,.\,\frac{1}{r_1}\,\frac{\left(\sin\theta - \frac{4}{5}\right)}{\cos\theta}\,\frac{\alpha q}{\alpha h - \frac{1}{2}\alpha\varphi}, \quad (\mu)$$

coefficient insensible, car ι' est à peu près égal à $2f'$, $\frac{e}{\gamma}$ est environ $\frac{3}{5}$, et $\frac{1}{r_1}$ environ $\frac{1}{60}$, et les expériences du pendule prouvent que αq doit être beaucoup plus petit que $\alpha h - \frac{1}{2}\alpha\varphi$, comme on peut le voir dans le Livre XI.

Relativement au Soleil, l'expression de $e.\sin\varpi$ est, par le chapitre VII du second Livre, composée de termes de la forme $c.\sin\iota t + \varepsilon$. Lagrange a donné dans les Mémoires de l'Académie de Berlin, pour l'année 1782, les valeurs numériques de c et de ιt, d'après des suppositions sur les masses des planètes, qui ne sont pas, sans doute, exactes, mais que l'on peut regarder comme suffisamment approchées pour notre objet, il en résulte que la plus grande des valeurs de c est au-dessous de $\frac{1}{10}$ et que les valeurs annuelles de ιt, diffèrent peu de $\pm 50''$ sexagésimales En adoptant pour ιt cette valeur, en faisant

e égal à $\frac{1}{10}$, observant ensuite que $\frac{1}{r_1}$ est environ $\frac{1}{24000}$ et que la formule (μ) doit être divisée par le rapport de l'action de la Lune à celle du Soleil, rapport égal à 2,3 à fort peu près; on trouve que la formule (u) est au-dessous d'une demi-seconde sexagésimale multipliée par

$$\frac{\alpha q}{\alpha h - \frac{1}{2}\alpha\varphi^2}$$

De là il suit que ce genre d'inégalités sera toujours insensible.

CHAPITRE II.

De la Libration de la Lune.

Notice historique des travaux des Astronomes et des Géomètres sur cet objet.

4 Les Anciens avaient reconnu que la Lune nous présente toujours la même face, dans son mouvement autour de la Terre, mais loin de s'en étonner, ils regardaient ce phénomène, comme naturel à tout corps qui circule autour d'un centre. Cette erreur, ou plutôt cette illusion, força Copernic, pour maintenir le parallélisme de l'axe terrestre, à donner à cet axe un mouvement annuel contraire au mouvement de la Terre dans son orbite, et assujetti aux mêmes inégalités, ce qui compliquait beaucoup son système. Képler remarqua le premier, que le parallélisme de l'axe de rotation d'un globe doit conserver toujours de lui-même, une situation parallèle dans les divers mouvemens du centre de ce globe Par cette remarque, le système de Copernic est devenu plus simple, ce qui lui est arrivé constamment par les progrès successifs de l'observation, de l'analyse et de la Dynamique, progrès qui l'ont enfin élevé au plus haut degré de simplicité et de certitude. En étendant la remarque de Képler à la Lune, le phénomène suivant lequel cet astre nous présente toujours le même hémisphère, et qui semblait si naturel, devenait très difficile à expliquer. Il fallait admettre une égalité rigoureuse entre la durée de la rotation de la Lune et la durée de sa révolution autour de la Terre, égalité dont il était impossible alors d'entrevoir la cause

Galilée reconnut par des considérations tirées de l'Optique, que l'hémisphère visible de la Lune varie sans cesse par le changement

de sa parallaxe de hauteur et de sa latitude, et il s'en assura par l'observation.

Riccioli reconnut la libration en longitude, qu'il expliqua ainsi qu'Hévélius, par la supposition que la Lune présente toujours la même face au centre de son orbite; ce qui ne donne que la moitié de cette libration, si l'on considère l'orbite comme une ellipse; mais ce qui la donne tout entière, si l'on considère avec Riccioli, cette orbite comme un cercle excentrique Newton, dans une lettre écrite à Mercator en 1675, donna une explication semblable, en faisant mouvoir uniformément la Lune autour de son axe de rotation, pendant qu'elle se meut inégalement autour de la Terre, mais il supposait l'axe de rotation perpendiculaire à l'écliptique Enfin, Dominique Cassini reconnut par l'observation, que cet axe est incliné à l'écliptique; et que ses nœuds coincident toujours avec les nœuds de l'orbite lunaire, en sorte que les pôles de cette orbite, de l'écliptique et de l'équateur lunaire, sont constamment sur un même cercle de latitude, le pôle de l'écliptique étant entre les deux autres. Cassini, par cette découverte l'une des plus importantes qu'il ait faites, et qu'il publia en 1693 dans son Traité de l'origine et des progrès de l'Astronomie, compléta la théorie astronomique de la libration de la Lune.

En 1748, Tobie Mayer confirma la théorie de Cassini, par une suite nombreuse d'observations dont il calcula les résultats, suivant un procédé fort ingénieux; seulement il trouva l'inclinaison de l'équateur lunaire à l'écliptique, moindre que Cassini, mais il assure que des observations faites du temps de ce grand astronome, donnent l'inclinaison qu'il trouva en 1748.

Lalande, en 1764, parvint au moyen de nouvelles observations, aux résultats de Mayer. MM. Bouvard et Arago voulurent bien à ma prière, entreprendre en 1806, une nouvelle suite d'observations qui fut continuée par MM Bouvard et Nicollet, et qui par le nombre et la précision des observations, surpasse les précédentes et confirme l'invariabilité de l'inclinaison de l'équateur lunaire à l'écliptique, et la coincidence constante de ses nœuds avec ceux de l'orbe lunaire.

Newton parle de la libration de la Lune, dans les propositions XVII et XXXVIII du troisième Livre de son ouvrage des Principes. Dans la proposition XVII de la première édition, antérieurement à la publication du Traité de Cassini, il attribue la libration en latitude,

à l'inclinaison de l'axe de rotation de la Lune au plan de son orbite dans la troisième édition, il l'attribue à la latitude de la Lune, et à l'inclinaison de son axe sur l'écliptique, inclinaison que le Traité de Cassini avait fait connaître

C'est dans la proposition XXXVIII du troisième Livre, que Newton parle de la cause physique de la libration de la Lune Il détermine d'abord la figure de la Lune qu'il considère comme un ellipsoïde de révolution homogène et fluide. Il trouve que son grand axe doit être dirigé vers la Terre, et qu'il surpasse d'environ soixante mètres, le diamètre de son équateur Ce grand géomètre n'a point eu égard à la force centrifuge due au mouvement de rotation de la Lune, sans doute parce qu'il la jugeait insensible relativement aux forces résultantes de l'attraction terrestre Mais elle est du même ordre, et elle change la figure de la Lune supposée fluide et homogène, dans une ellipsoïde qui n'est pas de révolution, et dont l'axe de rotation est le plus petit axe L'axe moyen et le grand axe, sont dans le plan de l'équateur, et le plus grand axe est dirigé vers la Terre l'excès du plus grand sur le plus petit axe, est quadruple de l'excès de l'axe moyen sur le plus petit axe, et environ $\frac{1}{27640}$ de ce petit axe «C'est ce qui fait, dit Newton, que la » Lune présente toujours le même côté à la Terre, car elle ne peut être » en repos dans une autre position, mais elle doit retourner sans cesse » à celle-là, en oscillant » Cela suppose que le moyen mouvement de rotation de la Lune est rigoureusement égal à son moyen mouvement de révolution Il y a une invraisemblance infinie à supposer que cette égalité rigoureuse a eu lieu à l'origine; en sorte que l'on peut regarder comme certain qu'il y a eu primitivement une très petite différence entre ces mouvemens, et que l'attraction de la Terre a établi et maintient constamment entre eux une rigoureuse égalité Newton n'a point considéré cet effet de l'attraction terrestre, qu'il aurait pu cependant reconnaître par un de ces concepts au moyen desquels il a souvent suppléé à l'état d'imperfection où était de son temps l'analyse de l'infini, pour arriver à des résultats que cette analyse perfectionnée a confirmés et généralisés. Concevons que l'on transporte à chaque instant le mouvement du centre de gravité de la Lune, à toutes ses parties et à la Terre, ce centre sera immobile, et la Terre tournera autour de lui, avec une vitesse angulaire que nous supposerons uniforme Donnons

au sphéroïde lunaire, un mouvement moyen angulaire de rotation égal à cette vitesse. Si son grand axe eût été à l'origine, sur le rayon mobile qui joint les centres de la Lune et de la Terre, et qu'au premier instant il l'eût exactement suivi, il ne s'en serait jamais écarté. Mais s'il y avait eu au premier instant, une très petite différence entre les vitesses angulaires du rayon vecteur et de l'axe du sphéroïde, ces deux lignes se seraient successivement écartées l'une de l'autre, mais à cause de l'extrême petitesse que nous supposons à cette différence, l'attraction terrestre tendant sans cesse à ramener l'axe sur le rayon, aurait fini par la diminuer. On voit *à priori* et un calcul fort simple prouve, que l'axe doit alors osciller sans cesse de part et d'autre du rayon vecteur dans des limites d'autant plus rapprochées, que la différence primitive des vitesses de l'axe et du rayon aura été plus petite. La vitesse angulaire de rotation du grand axe ou de la Lune variera donc sans cesse ; sa valeur moyenne sera la vitesse moyenne angulaire de révolution de la Lune, dont elle a pu différer primitivement d'une quantité arbitraire, mais extrêmement petite, ce qui fait disparaître l'invraisemblance infinie d'une égalité rigoureuse à l'origine.

D'Alembert appliqua ses formules de la précession des équinoxes, à la libration de la Lune. Mais ce grand géomètre qui avait si bien senti l'influence de la rapidité du mouvement de rotation de la Terre sur les mouvemens de nutation et de précession de son équateur, ne fit pas attention aux changemens que la lenteur du mouvement de rotation de la Lune, et surtout la circonstance de l'égalité de ce mouvement à celui de révolution, doivent produire dans les mouvemens de précession et de nutation, ce qui le conduisit à des résultats inexacts.

L'Académie des Sciences ayant proposé pour le sujet du prix de Mathématiques qu'elle devait décerner en 1764, la théorie de la libration de la Lune, Lagrange remporta ce prix. Sa pièce est remarquable par une profonde analyse, et surtout par l'union du principe de Dynamique de d'Alembert avec le principe des vitesses virtuelles de Jean Bernoulli ; ce qui réduit de la manière la plus générale et la plus simple, la recherche des mouvemens d'un système de corps, à l'intégration des équations différentielles : alors l'objet de la Mécanique est rempli, et l'Analyse doit achever la solution des problèmes. C'est ce que Lagrange a fait voir en détail dans sa Mécanique analytique. Ce

grand géomètre, dans sa pièce, détermine d'abord la libration de la Lune en longitude. Il prouve que dans le cas où il y aurait eu à l'origine une très petite différence entre les mouvemens de rotation et de révolution de la Lune, l'attraction terrestre a suffi pour établir entre ces mouvemens une égalité rigoureuse. Cette différence primitive a fait naître un mouvement d'oscillation du grand axe du sphéroïde lunaire, dirigé vers la Terre, de part et d'autre du rayon vecteur de la Lune. Lagrange détermine les lois de ce mouvement, ainsi que les petites inégalités du mouvement de rotation, correspondantes aux inégalités du mouvement de révolution. Passant ensuite à la libration de la Lune en latitude, il donne les équations différentielles de l'inclinaison de l'équateur lunaire et du mouvement de ses nœuds. Mais ayant négligé en les intégrant, comme on le peut relativement à l'équateur terrestre, les différences secondes, ce qui, par ce qui précède, simplifie considérablement l'intégration de ces équations, il ne put expliquer le phénomène singulier de la coïncidence des nœuds de l'équateur et de l'orbite lunaire : seulement, il trouva que cette coïncidence existe dans un cas particulier qui fait entrevoir sa possibilité dans le cas général. Mais les inégalités arbitraires introduites par l'intégration complète des équations aux différences secondes, peuvent seules expliquer comment, dans le cas infiniment vraisemblable d'une très petite différence initiale entre les positions des nœuds de l'orbite et de l'équateur lunaire, l'attraction terrestre établit et maintient la coïncidence de leurs nœuds moyens. Lagrange, dans les Mémoires de l'Académie de Berlin pour l'année 1780, reprit la théorie de la libration de la Lune, au moyen d'une très belle analyse. Il expliqua de la manière la plus heureuse la coïncidence des nœuds moyens de l'équateur et de l'orbite lunaire, et il détermina la loi des oscillations du nœud vrai de l'équateur lunaire, autour de son nœud moyen.

Il restait, pour compléter la théorie de la Lune, à déterminer l'influence des grandes inégalités séculaires des mouvemens de la Lune, sur les phénomènes de sa libration : c'est ce que j'ai fait dans le chapitre II du cinquième Livre. Les inégalités séculaires de son mouvement de révolution s'élevant à plusieurs circonférences, devraient à la longue, présenter à la Terre toutes les parties de sa surface. Mais je démontre que l'attraction de la Terre sur le sphéroïde lunaire donne au mouvement de rotation de ce sphéroïde, les inégalités

séculaires de son mouvement de révolution, et rend invisible à jamais, l'hémisphère opposé à celui qu'elle nous présente. Je fais voir encore que cette même attraction maintient les mêmes inclinaisons moyennes de l'équateur et de l'orbite lunaire sur l'écliptique vraie et la coïncidence de leurs nœuds, au milieu des mouvemens séculaires de cette écliptique. Ce résultat est analogue à celui que l'attraction du Soleil et de la Lune sur le sphéroïde terrestre produit, en réduisant au quart environ, les variations séculaires de l'obliquité de l'écliptique et de la longueur de l'année, qui auraient lieu par l'action des planètes, si la Terre était sphérique, et qui deviendraient insensibles, si le mouvement des équinoxes était aussi rapide que celui des nœuds de l'orbite lunaire.

En discutant avec un soin particulier les inégalités de la libration en latitude, M. Poisson a reconnu une petite inégalité qui dépend de la différence en longitude, du nœud et du périgée lunaire. Un nouvel examen de la théorie de la libration, m'a fait voir ensuite que rien de sensible n'avait été omis, en sorte que cette théorie ne laisse maintenant à désirer qu'une longue suite d'observations au moyen desquelles on puisse déterminer avec précision, les quantités inconnues que cette théorie renferme, et surtout les rapports des momens d'inertie des trois axes principaux du sphéroïde lunaire C'est dans cette vue, que j'avais invité les astronomes de l'Observatoire royal, à vouloir bien entreprendre cette suite d'observations, et à la comparer aux formules de la théorie. M Nicollet a exécuté ce travail important en y employant 174 observations faites par lui et par MM Bouvard et Arago. L'inclinaison de l'équateur lunaire à l'écliptique qu'il trouve en degrés sexagésimaux de $1^\circ 28' 45''$, et qui ne diffère que de $15''$ de celle que Mayer avait trouvée, est une donnée précieuse en ce qu'elle détermine avec beaucoup d'exactitude, les rapports des momens d'inertie du plus grand et du plus petit axe du sphéroïde lunaire La plus sensible des inégalités de la libration, est l'inégalité de la libration en longitude, dépendante du sinus de l'anomalie moyenne du Soleil. M. Nicollet trouve en secondes sexagésimales, $4' 48'',7$ pour le coefficient de cette inégalité qui donne le rapport des momens d'inertie du plus grand axe et de l'axe moyen du sphéroïde lunaire. Mais pour que l'on puisse compter sur ce rapport, il faut un nombre plus grand encore d'observations

Remarques sur la théorie de la libration de la Lune

5 Les formules que j'ai données dans le chapitre II du cinquième Livre, me paraissent laisser peu de chose à désirer Il y a quelques fautes d'impression, dont je donnerai l'*errata* à la fin de ces remarques

L'expression de la libration en latitude, renferme une petite inégalité qui pouvant devenir sensible dans des observations exactes, mérite d'être considérée. Pour la déterminer, nous transporterons à la Lune, les expressions de dp, dq et dr du n° 2; et nous observerons que l'inclinaison de l'équateur lunaire à l'écliptique, étant très petite, nous pouvons négliger son carré et son produit par le carré de l'inclinaison de l'orbite lunaire Cela posé, on aura par le n° 2,

$$A dq + (C - B) \,.\, prdt = \frac{3L\,dt}{r'^3_1}(C - B)\sin(v - \varphi)\,[\theta \,.\, \sin v + \gamma \,.\, \sin v],$$

$$B dr + (A - C) \,.\, pqdt = \frac{3L\,dt}{r'^3_1}(A - C)\cos(v - \varphi)\,[\theta \,.\, \sin v + \gamma \,.\, \sin v]$$

L est ici la Terre, v est sa longitude vue de la Lune et rapportée au nœud de l'orbite lunaire, en sorte que $\gamma \,.\, \sin v$ est sa latitude vue pareillement de la Lune. Soit

$$\theta \,.\, \sin\varphi = s, \qquad \theta \,.\, \cos\varphi = s'$$

On aura par le n° 2,

$$p = \frac{d\varphi}{dt} - \frac{d\psi}{dt},$$

$$q = -\frac{ds'}{dt} - spdt,$$

$$r = \frac{ds}{dt} - s'pdt.$$

Les équations différentielles précédentes relatives à dq et dr, deviendront, en y substituant m pour p, et en négligeant les différentielles $s\frac{dp}{dt}$ et $s'\frac{dp}{dt}$, ce que l'on peut faire ici,

$$-\frac{dds'}{dt^2} - \frac{(A + B - C)}{A} \,.\, m\frac{ds}{dt} - \frac{(C - B)}{A} \,.\, m^2 s'$$

$$= \frac{3L}{r'^3_1} \,.\, \frac{(C - B)}{A} \,.\, \sin(v - \varphi)\,[s' \,.\, \sin(v - \varphi) + s \,.\, \cos(v - \varphi) + \gamma \,.\, \sin v],$$

$$\frac{dds}{dt^2} - \frac{(A+B-C)}{B} \cdot m\frac{ds'}{dt} + \frac{m^2(C-A)}{B} \cdot s$$
$$= \frac{3L}{r_1^3} \cdot \frac{(A-C)}{B} \cdot \cos(v-\varphi)[s' \cdot \sin(v-\varphi) + s \cdot \cos(v-\varphi) + \gamma \cdot \sin v].$$

$v-\varphi$ est, comme on le voit dans le chapitre II du cinquième Livre, un très petit angle, en sorte qu'on peut le supposer nul, et faire son cosinus égal à l'unité

$\sin(v-\varphi)$ contient à fort peu près, par le chapitre II du cinquième Livre, le terme $2e \cdot \sin(mt-\varpi)$, e étant l'excentricité de l'orbe lunaire; ϖ étant la longitude de son périgée; les angles mt et ϖ étant comptés du nœud ascendant de l'orbite lunaire Le second membre de la première des deux équations précédentes contient donc le terme

$$3m^2 \cdot \frac{(C-B)}{A}(\gamma+\theta)\, 2e \cdot \sin(mt-\varpi)\sin mt;$$

et par conséquent celui-ci,

$$3m^2 \cdot \frac{(C-B)}{A}(\gamma+\theta)\, e \cdot \cos\varpi.$$

On trouvera de la même manière, que le second membre de la deuxième des mêmes équations, contient le terme

$$3m^2 \cdot \frac{(A-C)}{B}(\theta+\gamma)\, 3e \cdot \cos(mt-\varpi)\sin mt + 2e \cdot \sin(mt-\varpi)\cos mt,$$

et par conséquent celui-ci,

$$\frac{3m^2(A-C)}{2B}(\theta+\gamma)\, e \cdot \sin\varpi;$$

ces deux équations deviennent ainsi, en ne considérant dans leurs seconds membres, que ces termes,

$$-\frac{dds'}{dt^2} - \frac{(A+B-C)}{A} \cdot m\frac{ds}{dt} - \frac{(C-B)}{A} \cdot m^2 s'$$
$$= 3m^2 \cdot \frac{(C-B)}{A}(\gamma+\theta)\, e \cdot \cos\varpi,$$

$$\frac{dds}{dt^2} - \frac{(A+B-C)}{A} \cdot m\frac{ds'}{dt} + \frac{m^2(C-A)}{B} \cdot s$$
$$= -3m^2 \cdot \frac{(C-A)}{2B}(\theta+\gamma)\, e \cdot \sin\varpi;$$

ϖ étant rapporté au nœud ascendant de l'orbite lunaire La longitude du périgée de la Terre vue de la Lune est la longitude du périgée de la Lune vue de la Terre, moins la demi-circonférence de l'orbite lunaire, Si l'on suppose $it + L$, la longitude de ce dernier périgée, rapportée à un point fixe, et $O - g't$ la longitude du nœud rapportée au même point, on aura

$$\varpi = (i + g')t + L - O - \text{la demi-circonférence},$$

alors $m \cdot \frac{(C - A)}{B}$ et $m \cdot \frac{(C - B)}{A}$ étant fort petits par rapport à $m.(i + g')$, on aura à fort peu près

$$s = 3m^2 \cdot \frac{(C - B)}{A} \cdot \frac{(\gamma + \theta)e}{i + g'} \cdot \sin[(i + g')t + L - O],$$

$$s' = 3m^2 \cdot \frac{(C - A)}{2B} \cdot \frac{(\gamma + \theta)e}{i + g'} \cdot \cos[(i + g')t + L - O]$$

θ étant par le chapitre II du cinquième Livre, égal à

$$-\frac{3m(A - C)\gamma}{3m(A - C) + 2Ag'};$$

on aura par ce même chapitre, pour les expressions complètes s et de s',

$$s = \frac{3m(C - A)}{2Ag' - 3m(C - A)} \cdot \gamma \cdot \sin(mt + g't - O)$$
$$+ 3m^2 \cdot \frac{(C - B)}{A} \cdot \frac{(\gamma + \theta)e}{i + g'} \cdot \sin[(i + g')t + L - O],$$

$$s' = \frac{3m(C - A)}{2Ag' - 3m(C - A)} \cdot \gamma \cdot \cos(mt + g't - O)$$
$$+ 3m^2 \cdot \frac{(C - A)}{2B} \cdot \frac{(\gamma + \theta)e}{i + g'} \cdot \cos[(i + g')t + L - O]$$

M. Nicollet a trouvé par la comparaison de 174 observations de la libration de la Lune, en longitude, et d'un même nombre d'observations de la libration en latitude, l'inclinaison θ de l'équateur lunaire à l'écliptique, en degrés sexagésimaux, égale à $1°28'45''$; ce qui ne dif-

fère que de 15″ du résultat de Mayer, et il en a conclu

$$\frac{C-A}{C} = 0{,}00059701$$

il a trouvé par les mêmes observations, l'équation de la libration en longitude dépendante de l'anomalie du Soleil, égale à

$$4'49'',7 \quad \sin(\text{anomalie moyenne du Soleil}),$$

et il en a conclu

$$\frac{B-A}{C} = 0{,}000563916.$$

Mais cette valeur de $\frac{B-A}{C}$, n'est pas aussi sûre que celle de $\frac{C-A}{C}$, à cause de la petitesse de l'équation de la libration en longitude Un nombre plus grand encore d'observations déterminera plus exactement cette valeur, et alors la théorie physique de la libration de la Lune sera complète.

Errata du chapitre II du Livre V, Tome II.

Page 357, ligne 3 en remontant,
358, 4, 10 et 18,
361, 10 et 19,
} *changez* le signe des termes multipliés par $\sin \Pi$.

365, lignes 7 et 8 en remontant, *changez* $gt + 6$ en $mt - gt - 6$

Ibid., ligne 4 en remontant, *changez* $\sin(lt + 1)$ dans $\cos(lt + 1)$

CHAPITRE III.

Des anneaux de Saturne.

Notice historique des travaux des Astronomes et des Géomètres sur cet objet.

Galilée observa le premier l'anneau de Saturne. Il le vit dans ses faibles lunettes, sous la forme de deux corps lumineux contigus à deux parties opposées de la surface de la planète Quelquefois, Saturne lui parut rond comme les autres planètes Ces apparences singulières furent ensuite observées par d'autres astronomes Enfin, Huygens les ayant suivies au moyen d'excellens objectifs qu'il avait construits lui-même, en découvrit les lois et la cause Il fit voir que Saturne est environné d'un anneau large et d'une très mince épaisseur, suspendu autour de lui à une petite distance, et incliné à son orbite d'un douzième environ de la circonférence, ce qui lui donne une forme apparente elliptique. Cet anneau disparaît toutes les fois que le Soleil ou la Terre traversent son plan, il ne nous transmet alors de lumière, que par ses bords trop minces pour être aperçus L'accord de cette théorie avec toutes les disparitions et toutes les réapparitions de l'anneau observées depuis Huygens, ne laisse aucun doute sur sa réalité Jacques Cassini reconnut la division de l'anneau en deux anneaux distincts Short crut en apercevoir un plus grand nombre Mais Herschel, avec ses puissans télescopes qui lui ont toujours fait voir les bords éclairés de l'anneau lorsqu'il avait disparu pour les autres observateurs, n'y a vu, comme Cassini, que deux anneaux situés dans un même plan, séparés par un très petit intervalle, et dont l'extérieur a moins de largeur et une lumière moins vive que l'intérieur Dans le mois de juin de 1790, il présenta à la Société royale de Londres, une série d'observations, d'où il conclut la durée de la rotation de l'anneau intérieur de Saturne,

d'environ dix heures et demie sexagésimales. Il avait présenté à la Société royale, en novembre 1789, une suite d'observations qui lui donnaient la durée de la rotation de Saturne, presque égale à celle de l'anneau, et plus petite seulement de seize secondes sexagésimales. Ces deux résultats ont été publiés dans le volume des Transactions Philosophiques pour l'année 1790, et qui parut en 1791

Maintenant, par quel mécanisme les anneaux de Saturne se maintiennent-ils suspendus autour de la planète? S'ils l'étaient par la seule force de cohésion, leurs diverses parties se détacheraient à la longue, les unes des autres, et finiraient par se précipiter sur Saturne, ou par former autant de satellites, et comme cela n'est point arrivé, il est naturel d'en conclure que leur suspension repose principalement sur les loix de l'équilibre des fluides. C'est ainsi que Maupertuis les a considérés dans l'explication ingénieuse de ce phénomène, qu'il a donnée dans son Discours sur la figure des astres. Il conçoit chaque molécule d'un anneau fluide, sollicitée vers le centre de la planète et vers un point intérieur de la *figure génératrice* de l'anneau je nomme ainsi la section de l'anneau par un plan mené perpendiculairement à son plan, et passant par le centre de Saturne En combinant ces deux tendances de la molécule, avec la force centrifuge due à une rotation de l'anneau dans son plan, autour du centre de Saturne, il détermine la figure que l'anneau doit prendre pour l'équilibre de toutes ses parties Mais dans la nature, chaque molécule de l'anneau ne tend point uniquement vers deux points, elle a un nombre infini de tendances vers les autres molécules de l'anneau et vers la planète C'est en combinant toutes ces tendances avec la force centrifuge, qu'il faut déterminer la figure d'équilibre de la section génératrice de l'anneau Tel est le problème que je me suis proposé dans un Mémoire inséré dans le volume des Mémoires de l'Académie des Sciences de 1787, qui parut au mois de février 1789 J'ai prouvé dans ce Mémoire et ensuite dans le troisième Livre, qu'un anneau fluide peut se maintenir en équilibre autour de Saturne, en vertu de l'attraction mutuelle de ses molécules combinée avec un mouvement de rotation, si la figure génératrice de l'anneau est une ellipse aplatie dont le grand axe est dirigé vers le centre de Saturne. La durée de la rotation doit être alors la même que celle de la révolution d'un satellite dont la distance au centre de Saturne serait celle du centre de la figure génératrice, au même point j'en avais conclu que

cette durée était d'environ $\frac{5}{12}$ de jour, avant qu'Herschel l'eût reconnue par l'observation.

J'ai remarqué ensuite que si l'anneau était parfaitement semblable dans toutes ses parties, les centres de la planète et de l'anneau se repousseraient mutuellement, pour peu qu'ils cessassent de coïncider, ce qui devrait nécessairement arriver par les attractions étrangères. Le centre de l'anneau décrirait donc alors une courbe convexe vers le centre de la planète, et l'anneau finirait par atteindre la surface de la planète à laquelle il se réunirait. Il est donc nécessaire pour la stabilité de son équilibre, que ses figures génératrices soient dissemblables et que son centre de gravité ne coïncide point avec son centre de figure. Dans ce cas, l'équilibre de la masse fluide ne sera point sensiblement troublé, si les changemens des ellipses génératrices ne deviennent sensibles qu'à des distances respectives beaucoup plus grandes que les grands axes de ces ellipses.

Les deux anneaux de Saturne placés à des distances différentes de la planète, doivent par l'action du Soleil, avoir des mouvemens différens de précession, qui, si rien ne s'y opposait, changeraient continuellement la position respective de leurs plans, ces plans ne coïncideraient donc sensiblement que pendant de courts intervalles. Il est contre toute vraisemblance, de supposer que les anneaux de Saturne ont été découverts dans un de ces intervalles, il est donc très probable qu'il existe une cause qui maintient ces anneaux à peu près dans un même plan, quoique l'action du Soleil tende sans cesse à les en écarter. J'ai annoncé comme un résultat de la théorie de la pesanteur, dans le Volume cité de l'Académie des Sciences, que cette cause est l'aplatissement du sphéroïde de Saturne, produit par un mouvement rapide de rotation de cette planète, mouvement qu'Herschel a confirmé depuis par l'observation. L'Analyse fait voir qu'en supposant les anneaux peu inclinés au plan de l'équateur de Saturne, cet aplatissement les maintient toujours à peu près dans ce plan dont l'action du Soleil tend à les écarter. En même temps que ces anneaux tournent autour de leurs centres de gravité, ces centres se meuvent autour du centre de la planète. De là naissent dans les positions respectives des plans des anneaux, des variations continuelles qui produisent dans la manière dont ils sont éclairés par le Soleil vers leurs apparitions et leurs disparitions, et dans celle dont ils se présentent à l'observateur,

des différences propres à expliquer les apparences singulières que l'on a quelquefois observées. Telle est la disparition d'une des anses avant l'autre qui continue de paraître du même côté de la planète, pendant une et même plusieurs périodes de la rotation de l'anneau. Tels sont encore ces points lumineux qui semblent immobiles, et qui ont porté quelques observateurs à douter de la rotation des anneaux, dont cependant la nécessité est démontrée par les lois de la Mécanique.

Suivant les observations d'Herschel, la durée de la rotation de l'anneau est de $0^j,438$, celle de Saturne est de $0^j,427$, presque égale à la précédente, mais un peu plus petite, comme cela doit être suivant l'hypothèse que j'ai proposée sur la formation des planètes, des satellites et des anneaux. Dans cette hypothèse, les satellites et les anneaux de Saturne ont été formés par les zones que l'atmosphère de la planète a successivement abandonnées à mesure qu'elle s'est resserrée en se refroidissant. Le mouvement de rotation de Saturne s'est accéléré de plus en plus en vertu du principe des aires. La durée de la rotation d'une planète doit donc être, d'après cette hypothèse, plus petite que la durée de la révolution du corps le plus voisin qui circule autour d'elle, ce qui a lieu pareillement pour le Soleil, relativement aux planètes qui sont toutes, les produits des zones abandonnées successivement par l'atmosphère solaire. Tout cela confirmé par l'observation, augmente la probabilité que beaucoup de phénomènes singuliers du système solaire donnent à l'hypothèse dont il s'agit, comme on peut le voir dans l'*Exposition du Système du monde*. On conçoit que dans cette hypothèse, l'anneau intérieur de Saturne étant fort voisin de la planète, la durée de sa rotation ne doit surpasser que très peu celle de la rotation de Saturne. En considérant combien la différence observée entre ces durées est petite, il est difficile de ne pas admettre que l'atmosphère de Saturne s'est étendue jusqu'à ses anneaux, et qu'ils ont été formés par la condensation de ses couches.

FIN DU LIVRE XIV.

ERRATA

Page 250, ligne 7 en remontant, et page 251, ligne 2, au lieu de Mechin, *lisez* Machin

Page 252, ligne première, *effacez* par rapport à l'équinoxe

Page 278, ligne 14 en remontant, *effacez* le parallélisme de

LIVRE XV.

DU MOUVEMENT DES PLANÈTES ET DES COMÈTES.

CHAPITRE Ier.

Notice historique des travaux des Géomètres sur cet objet.

1. Les anciens astronomes et spécialement Hypparque et Ptolémée, déterminèrent les mouvemens apparens des astres. Ils essayèrent de les représenter par des mouvemens circulaires et uniformes qu'ils jugeaient être les plus parfaits, et devoir ainsi appartenir aux corps célestes, n'attribuant, par une bizarrerie de l'esprit humain, aucune imperfection des corps terrestres, à ces mêmes astres dont cependant ils subordonnaient l'existence à la Terre. La complication des cercles qu'ils avaient imaginés et qu'ils multipliaient à chaque inégalité que l'observation faisait découvrir, avait frappé de bons esprits et leur avait inspiré des doutes sur le système de Ptolémée Elle engagea Copernic à rechercher un moyen plus simple d'expliquer les mouvemens célestes Considérant que plusieurs anciens philosophes avaient fait tourner la Terre sur elle-même et autour du Soleil, il appliqua cette hypothèse aux phénomènes, et il reconnut que le mécanisme de l'univers en devenait beaucoup plus simple Elle affranchissait la sphère des étoiles, de l'inconcevable vitesse que sa révolution diurne donnait, dans le système de Ptolémée, à ces astres dont on connaissait déjà le grand éloignement. Les mouvemens rétrogrades des planètes n'étaient que de simples apparences produites par leur mouvement réel, combiné avec celui de la Terre, et le mouvement général du ciel, d'où résulte la précession des équinoxes, se réduisait à un mouvement fort lent dans

l'axe terrestre Mais pour expliquer les inégalités des mouvemens réels, Copernic adopta l'ancienne hypothèse des mouvemens circulaires et uniformes Képler, après avoir essayé long-temps et inutilement de représenter dans cette hypothèse les observations de Ticho-Brac sur la planète Mars, reconnut enfin qu'elle se meut dans une ellipse dont le centre du Soleil occupe un des foyers, et que son rayon vecteur trace autour de ce point, des aires proportionnelles au temps Il étendit ces résultats, à la Terre et aux autres planètes, et il découvrit que toutes leurs ellipses sont liées entre elles par ce beau rapport, savoir que les cubes des grands axes sont proportionnels aux carrés des temps des révolutions

Quoique Képler donne dans la préface de son ouvrage *de stella Martis*, des idées justes sur l'attraction réciproque de la Lune et de la Terre, et sur la tendance des eaux de la mer vers la Lune, et qu'il reconnaisse dans ce même Ouvrage, que les inégalités elliptiques du mouvement des planètes sont dues à l'action du Soleil, il attribue cependant à une autre cause, la périodicité des mouvemens planétaires. Il suppose que le Soleil, par sa rotation, envoie à chaque instant, dans le plan de son équateur, des espèces immatérielles douées d'une activité décroissante en raison des distances, et qui en s'étendant, conservent le mouvement circulaire qu'elles avaient à la surface de cet astre, et donnent aux planètes qu'elles entraînent, leur mouvement de révolution J'ai montré ailleurs comment la rotation du Soleil a pu imprimer à chaque planète, son mouvement initial. Mais pour le rendre presque circulaire, il est nécessaire de le combiner avec une tendance de la planète vers le Soleil Borelli a eu le premier, l'heureuse idée de cette combinaison qu'il a étendue aux satellites relativement à leur planète Newton, Halley, Wren et Hook, en comparant cette idée aux théorèmes d'Huygens sur la force centrifuge, et au rapport trouvé par Képler entre les carrés des temps des révolutions des planètes et les cubes des grands axes de leurs orbites, trouvèrent qu'en supposant ces orbites circulaires, les tendances des planètes vers le Soleil étaient réciproques aux carrés de leurs distances à cet astre. En effet, la vitesse d'une planète étant alors la circonférence de son orbite, divisée par le temps de sa révolution, le carré de cette vitesse est proportionnel au carré du rayon de l'orbite divisé par le carré de ce temps qui, d'après la loi de Képler, est proportionnel à la puissance $\frac{3}{2}$ du rayon, le

carré de la vitesse est donc réciproque au rayon. Par les théorèmes d'Huygens, la force centrifuge d'un corps mu dans un cercle, est égale au carré de sa vitesse divisé par le rayon, elle est donc pour une planète, réciproque au carré de sa distance au Soleil, or cette force doit être balancée à chaque instant par la tendance de la planète vers le Soleil, pour que l'orbite se maintienne circulaire; cette tendance est donc réciproque au carré de la distance

Mais les planètes ne se meuvent point exactement dans des orbes circulaires. On pouvait d'ailleurs douter qu'une planète transportée sur l'orbite d'une autre planète, éprouverait la même tendance qu'elle, vers le Soleil Il était donc nécessaire de démontrer que la même planète, dans ses diverses distances au Soleil, tend vers lui réciproquement à leurs carrés, et que la tendance vers cet astre, ne varie d'une planète à l'autre, qu'à raison de la distance Cette démonstration, alors très difficile, fut vainement tentée par les trois géomètres qui, conjointement avec Newton, avaient déduit des théorèmes d'Huygens, la tendance des planètes vers le Soleil, réciproque au carré de leur distance · elle commença la Mécanique céleste Newton prouva d'abord que la loi des aires décrites par le rayon vecteur d'une planète, indique nécessairement une tendance de la planète vers le centre du Soleil Il fit voir ensuite par une application délicate de sa Méthode des Fluxions, que l'ellipticité de l'orbite exige une tendance réciproque au carré du rayon vecteur. Enfin, il conclut de la loi du carré des temps des révolutions, proportionnel au cube des grands axes, que la tendance vers le Soleil ne varie d'une planète à l'autre, qu'à raison de la distance Les trois lois de Képler furent ainsi ramenées au seul principe d'une tendance des planètes vers le Soleil, réciproque au carré de leurs distances au centre de cet astre Ce principe avait déjà été énoncé par Boullaud son analogie avec l'émission de la lumière, pouvait le faire soupçonner Il paraît être la loi de toutes les forces qui sont perceptibles à des distances sensibles, telles que le magnétisme et l'électricité Mais l'honneur d'une découverte appartient à celui qui, le premier, l'établit solidement par le calcul ou par des observations décisives; et c'est ce que Newton a fait incontestablement à l'égard de la pesanteur universelle

Ce grand géomètre détermina les conditions de direction et de quantité de la vitesse initiale, qui font décrire au mobile, un cercle,

une ellipse, une parabole ou une hyperbole Quelles que soient ces conditions, il assigna une section conique dans laquelle le mobile peut et doit conséquemment se mouvoir; car, avec les mêmes conditions, il ne peut décrire qu'une seule courbe, ce qui répond au reproche que lui fit Jean Bernoulli, de n'avoir point démontré que les sections coniques sont les seules courbes qu'un corps peut décrire en vertu d'une loi d'attraction réciproque au carré de la distance. Newton remarqua que l'on peut, par sa méthode, déterminer la nouvelle section conique que le mobile décrirait, si à un instant quelconque, on lui imprimait une nouvelle force, et il en conclut que l'on pourrait suivre ainsi le mouvement du mobile dérangé continuellement par des actions étrangères. Lagrange en a déduit dans les Mémoires de l'Académie de Berlin pour l'année 1786, les variations différentielles des élémens du mouvement elliptique, mais Newton n'ayant point fait cette application délicate, on doit considérer sa remarque, comme une des choses de son admirable Ouvrage, qui ont été le germe des belles théories de ses successeurs

Newton a étendu sa méthode, au cas général d'un point sollicité par une force centrale, variable suivant une fonction quelconque de la distance Il donne l'expression du carré de la vitesse du point, et il en conclut, au moyen des quadratures des courbes, la nature de la courbe décrite et le temps employé par le mobile à décrire ses diverses parties. Il parvient à ce résultat singulier, savoir qu'un point qui décrit une courbe en vertu d'une force centrale, pourra décrire de la même manière, cette courbe supposée mobile, si l'on augmente la force centrale, d'une quantité réciproque au cube du rayon vecteur. Alors, les vitesses angulaires du point et de la courbe sont en raison constante. Newton déduit de ce théorème, un procédé fort ingénieux pour avoir le mouvement des apsides, dans une orbite presque circulaire décrite en vertu d'une force centrale exprimée par une fonction quelconque de la distance Ce procédé réduit en formule générale, donne l'angle décrit par le mobile, en allant d'un apside au suivant, égal à la demi-circonférence multipliée par la racine carrée d'une fraction dont le numérateur est le produit de l'expression de la force centrale, par le carré du rayon vecteur, et dont le dénominateur est le coefficient de la différentielle du rayon vecteur, dans la différentiation du produit de l'expression de la force centrale par le cube de ce rayon, cette frac-

tion étant rapportée après les différentiations, à la moyenne distance du mobile, à l'origine de la force centrale.

Newton applique son procédé, au cas où la force centrale étant réciproque au carré de la distance, une action étrangère la diminue d'une quantité proportionnelle au rayon vecteur. En supposant cette quantité $\frac{1}{357}$ de la force centrale dans les moyennes distances, ce qui a lieu à fort peu près, relativement à l'action du Soleil sur la Lune, décomposée suivant le rayon vecteur lunaire, il trouve le mouvement de l'apogée, plus petit de moitié que celui de l'apogée de la Lune C'est ce qu'une première approximation donna ensuite aux géomètres qui appliquèrent, les premiers, l'analyse à la théorie de la Lune. Mais il est remarquable que Newton, dans la proposition IV du troisième Livre des Principes, cherchant à corriger la tendance de la Lune vers la Terre, de l'effet de l'action solaire, suppose cet effet égal à $\frac{2}{357}$ de la pesanteur de ce satellite, c'est-à-dire, tel qu'il résulte du mouvement observé de l'apogée lunaire

Newton transporta facilement ses résultats, au mouvement de deux points matériels A et B qui s'attirent en raison de leurs masses et suivant une fonction quelconque de leur distance mutuelle Il avait établi que le mouvement du centre de gravité d'un système de corps ne reçoit aucun changement par leur action réciproque, en imprimant donc à ces points une vitesse égale et contraire à la vitesse initiale de leur centre commun de gravité, ce qui ne change point leur mouvement relatif, ce centre devient immobile. Le point A est attiré vers lui, par l'attraction du point B. En substituant ainsi dans l'expression de l'attraction de ce dernier point, au lieu de la distance mutuelle des deux points, le rayon vecteur mené du centre de gravité, au point A, et multiplié par le rapport de la somme des masses A et B à la masse B, le mouvement de A autour du centre de gravité, sera ramené au cas d'un point attiré suivant une fonction du rayon vecteur, vers un centre de forces immobile

Par la nature du centre de gravité, les deux points A et B sont toujours avec lui, sur une même droite, et leurs distances à ce centre sont en raison constante soit entre elles, soit avec leur distance mutuelle. De là il suit que ces points décrivent dans le même temps, des

courbes semblables, autour de leur centre de gravité et l'un autour de l'autre supposé immobile. Le cas de deux points matériels est celui de deux sphères dont les molécules s'attirent en raison des masses et réciproquement au carré des distances; Newton ayant démontré qu'alors ces corps s'attirent, comme si leurs masses étaient réunies à leurs centres respectifs. Cette propriété très remarquable de la loi de la nature, contribue à la simplicité des mouvemens célestes, parce que le Soleil, les planètes et les satellites étant à très peu près sphériques, leurs mouvemens ne sont que très peu troublés par leurs figures

Le système de tous ces corps est constitué de manière que la masse du Soleil surpasse considérablement celles des planètes, en sorte que l'on peut, dans une première approximation, négliger, avec Newton, leur action les unes sur les autres et sur le Soleil Alors elles obéissent exactement aux lois de Képler Le système d'une planète et de ses satellites est pareillement constitué de manière que la masse de la planète surpasse considérablement celles de ses satellites En négligeant donc dans une première approximation, leur action les uns sur les autres et sur la planète, ils décriraient autour d'elle, des orbes rigoureusement elliptiques, sans la force perturbatrice du Soleil Heureusement, la distance de la planète au Soleil étant considérablement plus grande que celle des satellites à la planète, cette force est très petite. Si cette distance était infinie, le Soleil agissant également sur la planète et sur ses satellites, ne troublerait point leur mouvement relatif, la différence de ses actions sur ces différens corps, est donc très affaiblie par sa grande distance à la planète, et elle altère peu ce mouvement. Newton établit que le centre de gravité du système de la planète et de ses satellites décrit à très peu près, un orbe elliptique autour du Soleil, et il fait voir que la pesanteur du satellite vers la planète, n'est que très peu changée par l'action solaire : elle n'est diminuée que d'un 360me au plus pour la Lune. En négligeant donc cette action et l'action mutuelle des satellites, chacun d'eux peut être censé décrire un orbe elliptique autour de sa planète.

Newton conclut de ce résultat, les rapports des masses des planètes accompagnées de satellites, à la masse du Soleil. Si l'on augmente la distance moyenne du satellite à sa planète, en sorte qu'elle soit égale à la moyenne distance de la planète au Soleil, le carré du

temps de la révolution de ce satellite autour de sa planète sera, par la loi de Képler, augmenté dans le rapport du cube de la seconde de ces distances au cube de la première. Mais il résulte des théorèmes de Huygens sur la force centrifuge, que les masses de la planète et du Soleil sont réciproques aux carrés des temps des révolutions des corps qui circulent autour de chacun d'eux à la même distance De là, il est facile de conclure que le rapport de la masse de la planète à celle du Soleil, est égal à une fraction dont le numérateur est le produit du cube de la moyenne distance du satellite à sa planète, par le carré du temps de la révolution de la planète, et dont le dénominateur est le produit du cube de la moyenne distance de la planète au Soleil par le carré du temps de la révolution du satellite. Newton détermina de cette manière, les rapports des masses de Jupiter, de Saturne et de la Terre à la masse du Soleil. La masse étant égale à la densité multipliée par le volume, les densités de ces quatre corps sont comme leurs masses divisées par les cubes de leurs diamètres apparens vus de la même distance, et les pesanteurs à leurs surfaces sont comme leurs masses divisées par les carrés de ces diamètres. Newton a conclu ainsi ces densités et ces pesanteurs respectives, des mesures astronomiques de ces diamètres.

L'une des plus heureuses applications du principe de la pesanteur universelle, est celle que Newton en fit aux comètes Ces astres se montrent dans toutes les régions du ciel, ils se meuvent dans tous les sens et d'une manière très compliquée, et finissent après quelque temps, par disparaître On avait essayé vainement avant Newton, de déterminer la loi de leurs mouvemens. Ce grand géomètre considéra que les comètes devaient être soumises, comme les planètes et les satellites, à l'attraction du Soleil, et qu'elles décrivaient par conséquent autour de lui, des orbes elliptiques, avec la différence que n'étant visibles pour nous que dans la partie de leurs orbes, la plus voisine du Soleil, ces orbes, au lieu d'être presque circulaires, étaient fort alongés et pouvaient même être des paraboles ou des hyperboles. Pour vérifier ce beau résultat, il fallait le comparer aux observations. mais cette comparaison offrait des difficultés A la vérité, le grand alongement des ellipses décrites par les comètes permet, du moins dans une première approximation, de considérer la partie visible de ces ellipses, comme un arc de parabole, ce qui simplifie le problème

il reste cependant encore très difficile Newton le résolut par une méthode dans laquelle le génie inventeur ne brille pas moins que dans les autres parties de l'ouvrage des Principes. Ce grand géomètre appliqua sa méthode à la fameuse comète de 1680, qui parut pendant un intervalle de temps considérable, et qui reparaissant après avoir été perdue dans les rayons du Soleil, fut regardée par divers astronomes comme formant deux comètes distinctes. Newton fit voir qu'elles étaient identiques, et il représenta toutes les bonnes observations de la comète, avec une précision qui ne laissait aucun doute sur la vérité de sa théorie du mouvement de ces astres Dans la troisième édition de son ouvrage, Newton n'ajouta rien à sa méthode Seulement, il en présenta de nouvelles applications faites principalement par Halley qui soumit à cette théorie, les observations de vingt-quatre comètes parmi lesquelles il reconnut l'identité des comètes de 1531, 1607 et 1682. Il en conclut que cet astre décrit un orbe elliptique dans une période d'environ 75 ans, et qu'il devait reparaître à la fin de 1758 ou au commencement de 1759; ce que l'observation a confirmé La même théorie a représenté exactement les observations de toutes les comètes qui ont paru depuis Newton, en sorte que chaque apparition de ces astres a fourni une nouvelle preuve de cette admirable théorie et du principe de la pesanteur universelle qui en est la base

Plusieurs grands géomètres se sont occupés depuis Newton, du problème de la détermination des orbites des comètes par les observations. Ils sont parvenus sur cet objet, à des résultats intéressans parmi lesquels on doit distinguer l'expression élégante et simple que Lambert a donnée, du temps employé à décrire un arc parabolique, en fonction de cet arc et de la somme des rayons vecteurs extrêmes, expression qu'il a étendue aux arcs elliptiques, et qui est démontrée dans le n° 27 du second Livre

Les diverses solutions de ce problème employaient à la recherche des premières valeurs des élémens, trois observations assez rapprochées pour que l'on pût se permettre de négliger la troisième puissance de l'intervalle de temps qui sépare les deux observations extrêmes Il me parut qu'au lieu de faire porter l'approximation sur les valeurs analytiques, il serait à la fois plus exact et plus simple d'employer une analyse rigoureuse, et de ne faire porter l'approximation que sur les données des observations. C'est ce que j'ai fait par la méthode exposée dans les

» 31 et suivans du second Livre. Les données dont je me sers, sont la longitude et la latitude de la comète à l'époque de l'observation moyenne, et leurs différences premières et secondes, divisées par les puissances correspondantes de l'élément du temps Au moyen de ces données, je détermine rigoureusement par la seule considération des équations différentielles du mouvement de l'astre, sa distance périhélie et l'instant de son passage par le périhélie Cette méthode a l'avantage de pouvoir employer pour déterminer les données, toutes les observations faites dans l'intervalle des observations extrêmes, car si cet intervalle est peu considérable, on peut étendre sans erreur sensible, les mêmes données à ces observations, et former ainsi pour les obtenir, deux fois autant d'équations de condition qu'il y a d'observations Je corrige ensuite par trois observations éloignées entre elles, la distance périhélie et l'instant du passage, directement et sans avoir besoin de connaître les autres élémens de l'orbite Persuadé que l'analyse, lorsqu'elle est convenablement appliquée, peut toujours fournir aux astronomes les méthodes les plus faciles et les plus abrégées pour les calculs numériques, je me suis étudié à leur en offrir un exemple dans ce problème, l'un des plus difficiles de toute l'Astronomie Les nombreuses applications qui ont été faites de cette méthode, prouvent son utilité.

Newton n'a point considéré les perturbations que l'action des planètes sur le Soleil et sur elles-mêmes produit dans leur mouvement elliptique Seulement, il fait voir qu'en considérant le mouvement autour du Soleil, de deux planètes qui s'attirent réciproquement au carré de la distance, et qui sont attirées suivant la même loi, le mouvement elliptique de la planète inférieure et la proportionnalité des aires que son rayon vecteur décrit autour du Soleil seront moins troublés, si cet astre obéit à l'attraction des planètes, que s'il est immobile Il observe encore que l'action de Jupiter sur Saturne dans la conjonction de ces planètes, étant à l'action du Soleil sur Saturne, dans le rapport de l'unité à 211, elle ne doit point être négligée « De là vient, dit-il, » que l'orbe de Saturne est dérangé si sensiblement dans chaque con- » jonction avec Jupiter, que les astronomes s'en aperçoivent ; » cependant, la théorie analytique des mouvemens de ces deux planètes, qui représente exactement toutes les observations, nous montre que le dérangement de Saturne dans sa conjonction avec Jupiter, est presque

insensible. Le dérangement correspondant de Jupiter est environ six fois plus grand, quoique l'action de Saturne sur Jupiter, ne soit à la pesanteur de Jupiter sur le Soleil, que dans le rapport de l'unité à 500 Cette remarque déjà faite par Euler, fait voir qu'il ne faut adopter qu'avec une extrême réserve, les aperçus les plus vraisemblables, tant qu'ils ne sont point vérifiés par des preuves décisives

Depuis la publication de l'ouvrage des Principes, jusqu'aux premiers travaux d'Euler sur les perturbations des planètes, les géomètres n'ont rien ajouté de remarquable aux grandes découvertes consignées dans cet Ouvrage Ils ont traduit en analyse, les démonstrations de Newton qui, probablement, était parvenu par cette méthode, à ses résultats que sa grande prédilection pour la synthèse lui a fait démontrer synthétiquement Cependant les applications de l'analyse aux découvertes Newtoniennes, ont préparé celles qu'Euler et ses contemporains en ont faites à la théorie des perturbations des mouvemens célestes Les recherches sur le Calcul intégral et sur la Mécanique, dont les géomètres s'étaient fort occupés dans l'intervalle dont je viens de parler, ont surtout contribué aux progrès de cette théorie qui leur offrait les applications les plus importantes de l'analyse infinitésimale, sans laquelle il eût été impossible de résoudre les questions difficiles du système du monde. C'est principalement dans la considération des équations différentielles et dans leur intégration, que réside la puissance de cette analyse. Newton ne paraît pas s'être occupé de leur calcul si fécond en résultats, surtout depuis son extension aux équations à différences partielles. C'est à Leibnitz et aux Bernoulli qu'il doit ses premiers progrès Ces illustres géomètres n'adoptèrent point la découverte de la gravitation universelle, à sa naissance, mais leurs recherches perfectionnées et appliquées par leurs disciples, à cette découverte, l'ont élevée au plus haut point de perfection et de certitude

Si l'on conçoit un système de corps sphériques dont toutes les molécules s'attirent proportionnellement à leurs masses, et réciproquement au carré de la distance; on peut rapporter chacun de ces corps, à trois axes fixes perpendiculaires entre eux, et décomposer parallèlement à ces axes, les attractions qu'il éprouve de la part des autres corps En égalant ensuite les différences secondes des coordonnées, divisées par le carré de l'élément du temps, supposé constant, à ces attractions ainsi décomposées, on aura les trois équations différentielles du second ordre,

qui déterminent le mouvement du corps. Chaque corps du système fournit trois équations semblables, en sorte que le nombre de ces équations est triple de celui des corps Leurs intégrales complètes renferment donc six fois autant d'arbitraires, qu'il y a de corps. Ces constantes sont déterminées par les coordonnées initiales de chaque corps, et par ses vitesses initiales suivant ces coordonnées

On a presque toujours besoin de rapporter les corps du système, à un corps principal. Il suffit pour cela, de retrancher les équations différentielles de son mouvement suivant chaque coordonnée, des équations différentielles correspondantes du mouvement des autres corps dont on aura ainsi les équations différentielles relatives à leurs mouvemens autour du corps principal

On n'a pu obtenir jusqu'ici, que sept intégrales des équations différentielles du mouvement du système Les trois premières sont finies et ne sont qu'une traduction du beau théorème de Newton, sur le mouvement du centre de gravité d'un système de corps qui n'éprouvent point d'actions étrangères Les quatre autres intégrales données par les principes des aires et des forces vives, sont différentielles du premier ordre elles sont une généralisation de la loi des aires proportionnelles aux temps, et de l'expression du carré de la vitesse, que Newton a trouvées dans le mouvement du système de deux corps. Le problème de ce mouvement est ainsi ramené à l'intégration d'équations différentielles du premier ordre, qu'il est facile ensuite d'intégrer par les quadratures C'est ce que Newton a développé avec une grande élégance, sous une forme synthétique. Mais, dans le cas d'un plus grand nombre de corps, le problème présente d'extrêmes difficultés Heureusement la constitution du système solaire apporte des simplifications considérables qui permettent de résoudre ce problème par des approximations convergentes.

Les planètes, comme nous l'avons déjà dit, se meuvent autour du Soleil, dans des orbes peu excentriques et peu inclinés à l'écliptique. De plus, leurs masses sont fort petites relativement à la masse de cet astre En négligeant donc leur action sur le Soleil et sur elles-mêmes, on a par une première approximation, le mouvement elliptique dont Newton a développé les lois Si l'on considère ensuite cette action, en négligeant les carrés et les produits des masses planétaires, on a une seconde approximation qui peut être ordonnée suivant les puissances

et les produits des excentricités et des inclinaisons des orbites. En considérant de la même manière, les carrés et les produits des masses des planètes, on obtient une troisième approximation, et ainsi de suite. Le mouvement des satellites autour de leur planète, offre des simplifications semblables. L'action perturbatrice du Soleil est toujours peu considérable par rapport à l'action directe de la planète sur ces corps, quoique l'action du Soleil sur eux soit fort grande Mais leur distance à la planète étant très petite relativement à la distance de la planète au Soleil, cet astre attire à peu près de la même manière, la planète et ses satellites, en sorte que la force perturbatrice de leurs mouvemens relatifs, qui n'est que la différence de ces diverses attractions du Soleil, est fort petite par rapport à l'attraction de la planète sur ses satellites Malgré toutes ces simplifications, les divers problèmes de la théorie des perturbations des planètes et des satellites, présentent de grandes difficultés dont la solution exige des considérations délicates et minutieuses, soit pour choisir les coordonnées qui doivent donner dans les divers cas, les approximations les plus convergentes, soit pour démêler dans le nombre infini des inégalités, celles qui, quoique très petites dans les équations différentielles, acquièrent par les intégrations, de grandes valeurs, et donnent ainsi la cause et les lois des singularités observées par les astronomes, dans les mouvemens célestes.

C'est à la première pièce d'Euler, sur les mouvemens de Jupiter et de Saturne, qu'il faut rapporter les premières recherches sur les perturbations des mouvemens planétaires. Cette pièce couronnée par l'Académie des Sciences en 1748, fut remise au secrétariat de cette Académie, le 27 juillet 1747, quelques mois avant que Clairaut et d'Alembert communiquassent à l'Académie les recherches analogues qu'ils avaient faites sur le *problème des trois corps*, qu'ils nommèrent ainsi parce qu'ils avaient appliqué leurs solutions au mouvement de la Lune attirée par le Soleil et par la Terre. Mais les différences de leurs méthodes à celles d'Euler, prouvent qu'ils n'avaient rien emprunté de sa pièce. Elle fut imprimée en 1749, année où parut l'ouvrage de d'Alembert sur la précession des équinoxes, et qui par là, est remarquable dans l'histoire de la Mécanique céleste

Euler, ainsi que les géomètres qui se sont occupés les premiers de la théorie des perturbations, a choisi pour coordonnées, celles que les astronomes employaient alors dans les Tables astronomiques, savoir la

longitude de la planète comptée d'une droite invariable prise sur un plan fixe, son rayon vecteur, l'inclinaison de l'orbite au même plan, et la longitude de son nœud ascendant. Mayer a le premier introduit directement dans les Tables, la latitude, au lieu de ces deux dernières coordonnées, ce qui est plus commode pour le calcul des perturbations, et pour les calculs astronomiques. Euler donne entre les quatre coordonnées dont il fait usage et le temps dont il suppose l'élément constant, quatre équations différentielles : les deux premières relatives à la longitude de la planète et à son rayon vecteur projeté sur le plan fixe, sont différentielles du second ordre. Les deux autres équations sont relatives à l'inclinaison de l'orbite et à la longitude de son nœud : elles sont différentielles du premier ordre. Euler ne donne point dans sa pièce, l'analyse qui l'a conduit à ces équations. La commission nommée par l'Académie pour juger cette pièce, et dont Clairaut et d'Alembert étaient membres, persuadée que la formation d'équations différentielles propres aux approximations et aux usages astronomiques, était l'un des points les plus intéressans de la théorie des perturbations, témoigna ses regrets de ce que l'auteur se fût contenté de présenter ces équations sans les démontrer. L'analyse par laquelle il y est parvenu, est exposée dans deux de ses Mémoires dont le premier parut en 1749, dans les Mémoires de l'Académie de Berlin pour la même année : le second parut en 1750 dans le volume des Mémoires de l'Académie de Pétersbourg, pour les années 1747 et 1748. On y voit que le procédé d'Euler, consiste à transformer les équations différentielles du second ordre, relatives aux coordonnées parallèles à trois axes fixes perpendiculaires entre eux, en quatre autres qui se rapportent aux coordonnées précédentes, et à combiner ces équations différentielles ainsi transformées, de manière à obtenir les équations différentielles qu'il a présentées dans sa pièce. Le premier des deux Mémoires cités, est surtout remarquable en ce que ce grand géomètre y parvient aux équations différentielles du premier ordre, de l'inclinaison et de la longitude du nœud, en faisant varier les constantes arbitraires qui expriment ces deux élémens dans l'orbite invariable : c'est le premier essai de la méthode de la variation des constantes arbitraires.

Euler considère d'abord les perturbations indépendantes des excentricités et des inclinaisons. Pour cela, il développe les forces perturbatrices, en sinus et cosinus d'angles croissans comme le temps. Mais ce développement sans lequel la formation des Tables astronomiques des

planètes devenait impossible, présentait une difficulté que ce grand géomètre a très heureusement surmontée. Elle consiste à développer les puissances du radical qui exprime la distance mutuelle des deux planètes, dans une série d'angles multiples de leur élongation Euler donne des expressions élégantes des divers termes de ce développement, et de plus, une relation très simple entre trois termes consécutifs, au moyen de laquelle on peut facilement conclure des deux premiers termes, tous les suivans. Il fait la remarque importante, que cette série, quoique peu convergente pour Jupiter et Saturne, le devient beaucoup par les diviseurs que ses divers termes acquièrent en vertu des intégrations

Euler ne considère dans sa pièce, que les perturbations du mouvement de Saturne par l'action de Jupiter Il suppose d'abord les deux orbites, dans un même plan, et il détermine les perturbations du rayon vecteur et de la longitude, en faisant abstraction des excentricités des orbites Les résultats auxquels il parvient, sont peu différens de ceux que j'ai donnés dans le sixième Livre. Il considère ensuite les inégalités dépendantes des excentricités des orbites. Ici, de graves erreurs de calcul qui ne tiennent point à sa méthode, rendent ses résultats inexacts Les deux seules inégalités de ce genre, qu'Euler détermine et qui sont en effet, les plus grandes de cet ordre, ont pour argument, la première, l'élongation de Saturne à Jupiter, moins l'anomalie de Saturne; la seconde, le double de cette élongation, moins l'anomalie de Jupiter Il trouve à cette dernière inégalité, un signe contraire à son véritable signe La comparaison des observations avec sa formule de la longitude de Saturne, lui fit voir qu'elles s'en écartent considérablement, mais qu'elles s'en rapprochent beaucoup, si l'on change le signe de cette inégalité. Soupçonnant alors qu'il s'était trompé dans son calcul, il le revit, mais sans en reconnaître l'erreur, et il en conclut que la loi newtonienne de l'attraction réciproque au carré des distances, devait être modifiée Dans le même temps, Clairaut tira la même conclusion, en appliquant l'analyse différentielle au mouvement de l'apogée lunaire Mais cet illustre géomètre ayant porté plus loin les approximations, reconnut bientôt que la loi newtonienne donne le véritable mouvement de cet apogée Dès-lors tous les géomètres et Euler lui-même admirent cette loi sans aucune restriction, quoique plusieurs phénomènes astronomiques, tels que les grandes irrégularités de Jupiter et de Saturne, et l'accélération du moyen mouvement de la Lune, leur parussent inex-

plicables en vertu de cette loi plutôt que de la modifier, ils préférèrent de recourir à des causes étrangères.

Euler détermine le mouvement de l'aphélie de Saturne; mais sa formule est inexacte. En considérant les inégalités dépendantes de l'excentricité de l'orbite de Jupiter, l'intégration des équations différentielles lui donna une inégalité en longitude, dont le coefficient croît proportionnellement au temps, et dont l'argument est la distance de Saturne à l'aphélie de Jupiter L'apparition de cet arc de cercle l'embarrassa, mais dans un supplément à sa pièce, il reconnut que cette inégalité atteignant son *maximum*, dans le même temps à peu près, que l'équation du centre de Saturne, elle pouvait être représentée par une diminution séculaire de l'excentricité de l'orbite de cette planète On verra bientôt par quel moyen ce grand analyste a fait disparaître cet arc

Enfin, Euler détermine les variations du nœud et de l'inclinaison de l'orbite de Saturne, sur l'orbite de Jupiter supposée fixe. Il fait voir que l'inclinaison moyenne reste constante, mais que le nœud rétrograde sans cesse, et il donne l'expression exacte de ce mouvement rétrograde En transportant ses formules au mouvement de l'orbite terrestre produit par l'action de Jupiter, il en conclut la variation correspondante de la latitude des étoiles, et il en forme une Table dont l'argument est la longitude de l'étoile. Ce grand géomètre n'ayant point eu égard à l'action de Vénus dont l'influence sur ce phénomène est plus grande que celle de Jupiter, sa table est incomplète, mais elle est la première de ce genre

Cette pièce d'Euler étant le premier pas que l'on a fait dans la théorie des perturbations planétaires, j'ai cru devoir en donner une analyse étendue. L'auteur y a tracé la route la plus directe et la plus simple pour arriver aux divers résultats de cette théorie Il a surmonté par son génie et par son profond savoir en analyse, des obstacles qui dès les premiers pas, auraient arrêté la plupart des géomètres. Enfin, il a donné les formules des inégalités périodiques et séculaires du mouvement des planètes, dont plusieurs sont fautives, mais qu'il serait facile de rectifier en suivant ses méthodes analytiques.

L'Académie, en couronnant la pièce dont je viens de parler, et voulant donner à la théorie dont elle est l'objet, une plus grande perfection; proposa cette théorie pour le sujet du prix de Mathématiques qu'elle devait décerner en 1750. Aucune pièce digne du prix ne lui

étant parvenue, elle remit le même sujet pour le prix de l'année 1752, qui fut adjugé à une seconde pièce d'Euler. Ce grand géomètre part des équations différentielles de sa première pièce, mais il les transforme en d'autres dans lesquelles l'élément de l'élongation de Saturne à Jupiter est supposé constant. Il considère simultanément les mouvemens des deux planètes, et il détermine leurs inégalités indépendantes des excentricités. Passant ensuite aux inégalités dépendantes des excentricités, il cherche à obtenir des intégrales sans arcs de cercle, et pour cela, il emploie un moyen très ingénieux et, peut-être, le plus direct et le plus simple que l'on puisse imaginer. On sait que si l'on néglige le carré de l'excentricité, la partie elliptique du rayon vecteur d'une planète, se réduit au produit pris négativement de l'excentricité par le cosinus de la distance de la planète à son aphélie. Euler conçoit dans le rayon vecteur de Jupiter, deux termes semblables rapportés à deux aphélies différens; ce qui revient à supposer une double excentricité à l'orbite. La partie elliptique du mouvement de la planète en longitude est alors formée, comme dans le mouvement elliptique simple, des termes elliptiques du rayon vecteur, dans lesquels on change les cosinus en sinus, en leur donnant pour coefficiens, le double de ceux des cosinus, pris avec un signe contraire. Euler suppose les parties elliptiques du rayon vecteur et de la longitude de Saturne, formées de termes semblables rapportés à ces deux aphélies. En substituant dans l'équation différentielle du rayon vecteur de Jupiter, les termes relatifs à l'un de ces aphélies, la comparaison des mêmes cosinus, lui donne une expression de mouvement de cet aphélie, qui contient le rapport de l'excentricité de l'orbite de Jupiter relative à cet aphélie, à l'excentricité correspondante de l'orbite de Saturne. La même substitution dans l'équation différentielle du rayon vecteur de Saturne, lui donne une seconde expression du mouvement de cet aphélie, pareillement dépendante du rapport des excentricités. De la comparaison de ces deux expressions, il obtient pour déterminer ce rapport, une équation du second degré, dont il choisit une des racines qu'il substitue dans ces expressions pour avoir le mouvement de l'aphélie. En considérant de la même manière, les parties elliptiques relatives à l'autre aphélie; Euler parvient à une autre équation du second degré, qui détermine le rapport des deux excentricités des orbites, correspondantes à cet aphélie. Les racines de cette équation sont imaginaires, mais il les rend réelles et égales, par un léger chan-

gement dans les valeurs des masses des planètes. On est étonné qu'un aussi profond analyste n'ait pas cherché ce que signifiait la racine qu'il négligeait, et ce qui devait faire préférer l'autre racine. Mais s'il eût bien fait son calcul, il aurait trouvé que les deux équations du second degré, qu'il obtenait, n'en forment qu'une dont les deux racines sont réelles et donnent les rapports des excentricités correspondantes dans les deux orbites Euler, malgré l'inexactitude de ses résultats, fit par la considération d'une excentricité multiple des orbites, une découverte importante dont le développement a démontré la stabilité du Système du monde Ce grand géomètre prouve que les excentricités et les positions des aphélies de Jupiter et de Saturne déterminées par les astronomes, varient sans cesse, mais inégalement dans les différens siècles, et qu'elles se rétablissent dans une période d'environ trente mille ans Il en conclut dans la longitude des deux planètes, une grande inégalité séculaire, la même pour chaque planète, maintenant additive à leur longitude et qui se rétablit dans la période précédente Les observations semblaient indiquer au contraire, une accélération dans le mouvement de Jupiter et un ralentissement dans celui de Saturne, mais les recherches ultérieures ont prouvé que cette inégalité introduite par Euler, n'existe pas

D'Alembert publia en 1754, les deux premiers volumes de ses recherches sur le Système du monde. Il y appliqua au mouvement des planètes troublé par leur action mutuelle, les formules par lesquelles il avait calculé les mouvemens de la Lune Mais il n'a rien ajouté aux recherches d'Euler, si ce n'est la remarque de la relation qui existe entre les termes de la série dans laquelle Euler avait développé une puissance quelconque du radical qui exprime la distance mutuelle de deux planètes, et les termes de la série de ce développement, lorsqu'on diminue de l'unité cette puissance On doit encore à ce grand géomètre, pour calculer les perturbations du mouvement d'une planète par l'action de ses satellites, perturbations qu'Euler n'avait point considérées, le moyen le plus simple fondé sur le mouvement à très peu près elliptique du centre commun de gravité de tous ces corps, autour du Soleil D'Alembert avait fait disparaître par un moyen ingénieux, l'arc de cercle que sa méthode d'intégration introduisait dans l'expression du rayon vecteur de la Lune. Il pensa que le même moyen peut être appliqué au mouvement des planètes Mais ce moyen ne réussit qu'au

tant que l'arc de cercle est introduit par le mouvement de l'apogée, ce qui a lieu pour la Lune Si l'arc dépend de ce mouvement et d'une variation séculaire de l'excentricité, ce qui a lieu pour les planètes, le moyen proposé par d'Alembert ne réussit plus, et la question devient beaucoup plus difficile On vient de voir par quel artifice Euler l'a résolue D'Alembert membre des commissions nommées par l'Académie pour juger les pièces d'Euler, ne paraît pas avoir remarqué cet artifice, mais ce qui doit surprendre, c'est qu'Euler lui-même n'en ait pas senti l'importance, et qu'il n'ait pas cherché à l'étendre au Système entier des planètes

En 1756, l'Académie des Sciences couronna une troisième pièce d'Euler sur les inégalités du mouvement des planètes, produites par leurs actions réciproques La méthode que ce grand géomètre y expose, est très belle et fort importante dans la Mécanique céleste Elle consiste à regarder les élémens du mouvement elliptique, comme variables en vertu des forces perturbatrices Ces élémens sont, 1° le grand axe de l'orbite, qui donne par la loi de Képler, le rapport de la différentielle de la longitude moyenne, à l'élément du temps, 2° l'époque de cette longitude, 3° l'excentricité de l'orbite; 4° le mouvement de l'aphélie, 5° l'inclinaison de l'orbite à un plan fixe, 6° la longitude de son nœud. Euler se propose de déterminer les variations que les forces perturbatrices introduisent dans ces élémens Il l'avait déjà fait, comme on l'a vu ci-dessus, par rapport à l'inclinaison et à la longitude du nœud de l'orbite Pour cela il considère qu'à la fin d'un instant infiniment petit, l'expression de la tangente de la latitude peut être censée appartenir également au plan de l'orbite de cet instant, et au plan de l'orbite de l'instant suivant. En différentiant l'expression de la latitude dans l'hypothèse des deux élémens constans, on a la différentielle relative à l'orbite invariable pendant un instant. En différentiant la même expression dans l'hypothèse où la longitude et les élémens varient, on a la différentielle relative à l'origine de l'instant suivant En égalant ces deux différentielles, Euler obtient une équation entre les différentielles de l'inclinaison et de la longitude du nœud Il différencie de nouveau la différentielle de la tangente de la latitude, obtenue dans la première hypothèse, ce qui lui donne entre les différentielles de ces élémens, une seconde équation dans laquelle il substitue, au lieu de la différence seconde de la tangente de la latitude, sa valeur donnée par les équations différentielles du mouvement de la planète

La méthode suivie par Euler pour déterminer les variations des autres élémens du mouvement elliptique, n'est pas aussi directe que la précédente ; mais au fond, elle revient au même Le plan auquel ce grand géomètre rapporte d'abord les coordonnées, est celui de l'orbite de la planète dont il considère les perturbations Il suppose ce plan fixe, ce que l'on peut faire dans le calcul du rayon vecteur et de la longitude, du moins si l'on néglige le carré de la force perturbatrice Il détermine les expressions différentielles de ces deux coordonnées, différentielles que l'on déduit immédiatement du principe des aires et du principe des forces vives Ensuite, il considère l'expression elliptique du rayon vecteur qui, comme l'on sait, est égal au paramètre divisé par l'unité diminuée du produit de l'excentricité, par le cosinus de l'anomalie rapportée à l'aphélie Il différencie cette expression, en supposant les élémens constans, en comparant ensuite cette différentielle à celle du rayon vecteur, qu'il a trouvée en fonction des forces perturbatrices, il détermine le paramètre et l'excentricité, de manière à faire coïncider ces différentielles; ce qui lui donne les expressions de ces deux élémens. Euler en conclut la différentielle du quotient de l'unité divisée par le grand axe. Il est facile de s'assurer qu'elle est une différence exacte des coordonnées de la planète troublée, résultat important auquel Lagrange est parvenu d'une manière directe, et d'où il a conclu, comme nous le dirons bientôt, l'invariabilité des moyens mouvemens planétaires La différentielle de l'expression elliptique ou du rayon vecteur, prise en y faisant varier les élémens et l'anomalie, donne la différentielle de l'anomalie, qui retranchée de la différentielle de la longitude, donne la différentielle du mouvement de l'aphélie Euler ne considère point la variation de l'époque, ce qui rend incomplète, sa théorie de la variation des élémens elliptiques

Dans l'évaluation des forces attractives, Euler rapporte le mouvement de la planète troublée, au plan de la planète perturbatrice, mais il observe que la projection de l'ellipse de la planète troublée, sur ce plan, est une ellipse dans laquelle le Soleil n'étant plus au foyer, les lois de Képler ne sont point observées autour de ce point, ce qui complique les calculs Il juge donc avec raison, que dans le calcul des perturbations du rayon vecteur et de la longitude, il convient de rapporter le mouvement de la planète troublée, au plan de son orbite Il y a de l'avantage à rapporter ce mouvement au plan de l'orbite de la

forme que celui d'Euler, à ce que les observations semblaient indiquer, n'en est pas plus exact

Je présentai en 1773, à l'Académie des Sciences, mes premières Recherches sur le Système du Monde Elles ont paru dans le volume des Mémoires des Savans étrangers de la même année, qui n'a été publié qu'en 1776. Mon objet principal dans ces recherches a été de donner les expressions exactes des inégalités séculaires du mouvement des planètes Frappé des différences qu'offraient à cet égard, les expressions trouvées par Euler et Lagrange, et considérant qu'ils avaient négligé plusieurs quantités du même ordre que celles dont ils avaient tenu compte, je déterminai ces expressions avec l'attention la plus scrupuleuse. Celle du moyen mouvement était surtout importante dans l'Astronomie elle paraissait fort sensible dans le mouvement de Saturne En substituant dans ma formule, les valeurs numériques des quantités relatives à l'action de Jupiter sur cette planète; je fus surpris de trouver un résultat nul, et j'en conclus que l'action de Jupiter n'altère point le mouvement moyen de Saturne. Une substitution semblable relative à l'action de Saturne sur Jupiter, me donna pareillement un résultat nul L'égalité à zéro de ces deux résultats, me fit soupçonner qu'elle ne tenait point aux valeurs propres des élémens de ces deux planètes, et que l'expression analytique elle-même était identiquement nulle Cette expression renferme un nombre considérable de termes multipliés par les coefficiens des angles multiples de l'élongation des deux planètes, dans le développement des puissances du radical qui exprime leur distance mutuelle. On a vu que ces coefficiens ont entre eux des rapports tels, que si le premier et le second coefficiens du développement de l'une de ces puissances sont donnés, on peut en conclure tous les autres. La formule analytique de l'inégalité séculaire du moyen mouvement pouvait être ainsi, réduite à ne renfermer que ces deux coefficiens. Je reconnus que par cette réduction, chacun de ces coefficiens disparaissait, et que la formule se réduisait à zéro. Il fut ainsi bien prouvé que l'action mutuelle des planètes ne produit aucune altération séculaire dans leurs moyens mouvemens, du moins en négligeant les carrés et les produits des masses des planètes, et les produits de quatre dimensions, des excentricités et des inclinaisons des orbites; car il est facile de s'assurer que les quantités de dimensions impaires de ces élémens ne

peuvent entrer dans l'expression analytique de l'inégalité séculaire du moyen mouvement. Cela suffisait aux besoins de l'Astronomie et montrait qu'il fallait chercher ailleurs que dans l'action mutuelle des planètes, la cause des inégalités séculaires que les observations paraissaient indiquer dans les mouvemens de Jupiter et de Saturne.

En réduisant d'une manière semblable, les expressions analytiques des inégalités séculaires de l'excentricité et de l'aphélie; je leur donnai la forme la plus simple.

Je discutai dans le Mémoire qui contient ces recherches, le principe de la gravitation universelle, et la manière dont il avait été employé par Newton et par ses successeurs La propagation instantanée qu'ils supposaient à cette force, me parut peu vraisemblable Déjà Daniel Bernoulli avait soupçonné que le retard d'environ un jour et demi, des plus grandes marées sur les instans des syzygies, pouvait dépendre du temps que l'attraction de la Lune emploie à se transmettre à la mer. Une transmission aussi lente n'est pas sans doute, admissible; mais cette transmission, quoique incomparablement plus prompte, peut cependant être successive, et il était intéressant d'en calculer les effets Je trouvai que son effet le plus sensible serait une inégalité séculaire dans le moyen mouvement de la Lune, croissante comme le carré du temps, et que pour expliquer par ce moyen, l'inégalité déduite des observations par Mayer, il fallait supposer à l'attraction terrestre, une vitesse de transmission, près de huit millions de fois plus grande que celle de la lumière. Maintenant que nous connaissons la vraie cause de l'équation séculaire de la Lune, nous pouvons affirmer que la première de ces vitesses est au moins cinquante millions de fois plus grande que la seconde.

Lagrange envoya en 1774, à l'Académie des Sciences, un beau Mémoire sur les variations des inclinaisons et des nœuds des orbites planétaires, Mémoire qui parut dans le volume de l'Académie, de la même année Ce grand géomètre y détermine les mouvemens des orbites, par la méthode de la variation des élémens, mais au lieu de l'inclinaison et de la longitude du nœud, il considère deux autres variables qui sont les produits de l'inclinaison par le sinus et par le cosinus de la longitude du nœud, et il détermine leurs expressions différentielles. Cette transformation des variables, dont il a fait ensuite un heureux usage dans sa théorie de la libration de la Lune, a l'avan-

tage de réduire les équations différentielles qui déterminent les inclinaisons et les nœuds d'un système d'orbites, à des équations différentielles linéaires à coefficiens constans, et dont le nombre est double de celui des planètes Ayant ramené les variations séculaires de l'excentricité et de la longitude du périhélie, à leur forme la plus simple; il me devint facile de leur appliquer une transformation analogue, en considérant au lieu de ces deux variables, les produits de l'excentricité par le sinus et par le cosinus de la longitude du périhélie J'en conclus les variations séculaires de ces nouvelles variables Je considérai ensuite ces variations, comme le développement en série, de ces variables, suivant les puissances du temps, or le coefficient de la première puissance du temps dans ce développement, est la différentielle de la variable, divisée par l'élément du temps, j'égalai donc ce quotient, au coefficient du temps dans l'expression de l'inégalité séculaire de la variable, ce qui me donna une équation linéaire du premier ordre, entre les variables L'autre variable me donna une équation pareille En étendant la même considération à toutes les variables semblables d'un systeme quelconque de planètes; j'obtins pour les déterminer, un nombre d'équations différentielles linéaires du premier ordre, double de celui des planètes, et je fis ainsi disparaître les arcs de cercle introduits par l'intégration des équations différentielles suivant la méthode ordinaire qui a l'avantage de conduire par la voie la plus simple, aux approximations les plus convergentes et les plus appropriées aux usages astronomiques Je publiai dans la première partie des Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1772, et qui parut en 1776, ces résultats et cette nouvelle méthode de faire disparaître les arcs de cercle puisée dans la nature même des séries. La forme très simple des équations différentielles des élémens elliptiques auxquelles j'étais parvenu, me fit reconnaître un des élémens les plus importans du Système du Monde, sa stabilité. Ces équations étant linéaires à coefficiens constans, leur intégration donne l'expression finie de chacune des variables, par une suite de sinus et cosinus d'angles croissans proportionnellement au temps, et dont les coefficiens du temps dans chaque angle, sont les racines d'une équation algébrique d'un degré égal au nombre des planètes. Si toutes les racines sont réelles et inégales, ces diverses expressions sont périodiques, et le variables restent toujours fort petites, le système des planètes ne fait

donc alors qu'osciller autour d'un état moyen, dans d'étroites limites Mais si quelques-unes des racines étaient imaginaires ou égales entre elles; les sinus et les cosinus correspondans se changeraient en exponentielles ou en arcs de cercle qui, croissant indéfiniment avec le temps, donneraient aux variables, de grandes valeurs, et changeraient considérablement la forme des orbites. Heureusement, je suis parvenu d'une manière fort simple exposée dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1784, à faire voir que, quelles que soient les masses des planètes pourvu qu'elles soient fort petites par rapport à la masse du Soleil, par cela seul qu'elles se meuvent toutes dans le même sens autour de cet astre et dans des orbes presque circulaires et peu inclinés entre eux, l'équation algébrique dont je viens de parler, n'a que des racines réelles et inégales En appliquant les mêmes raisonnemens aux équations différentielles relatives à l'inclinaison et à la longitude du nœud, j'ai trouvé pareillement que les racines de l'équation algébrique dont dépendent leurs intégrales sont réelles et inégales; et qu'ainsi les inclinaisons des orbites sont toujours fort petites. De là il suit que le système des planètes est stable Comme les systèmes des satellites satisfont à la condition que tous les satellites de chaque système se meuvent dans le même sens, autour de leur planète, on peut affirmer, quoique leurs masses soient pour la plupart inconnues, que ces divers systèmes jouissent de la même stabilité, que celui des planètes

Je développai dans la seconde partie des Mémoires de l'Académie des Sciences, pour l'année 1772, la méthode précédente de faire disparaître les arcs de cercle des intégrales, en faisant varier les élémens, et je l'étendis aux équations différentielles d'un ordre quelconque Cette manière de faire varier les constantes arbitraires, diffère de celle qu'Euler avait employée, en ce qu'elle n'embrasse que les inégalités dont la période est indépendante de la configuration mutuelle des planètes, ce qui apporte une grande simplicité dans les calculs Elle s'étend à tous les cas où les élémens d'un système de corps éprouvent par des causes quelconques, telles que la résistance d'un milieu rare, des altérations qui ne deviennent sensibles qu'après un long intervalle de temps.

Fontaine remarqua, le premier, qu'une équation différentielle d'un ordre quelconque, a autant d'intégrales de l'ordre inférieur, qu'il y a d'unités dans son ordre Lagrange, dans sa pièce sur les perturbations des

comètes qui remporta en 1780, le prix de l'Académie des Sciences, et dans les Mémoires de Berlin pour l'année 1782, considéra sous ce point de vue général, les intégrales des équations différentielles du mouvement des planètes Le mouvement d'une planète soumise à la seule attraction du Soleil, est donné par trois équations différentielles du second ordre dont les trois intégrales finies renferment par conséquent six constantes arbitraires qui sont les élémens du mouvement elliptique. En différenciant ces intégrales, on a six équations au moyen desquelles on peut par l'élimination, déterminer chaque élément en fonction des coordonnées du mouvement de la planète, et de leurs différentielles divisées par l'élément du temps Lagrange conçoit que ces six équations différentielles du premier ordre, ont également lieu dans l'ellipse invariable et dans l'ellipse troublée, mais que dans ce dernier cas, les élémens sont variables. Pour avoir les différentielles des élémens, il fait tout varier en différenciant chacune de ces intégrales du premier ordre; et il substitue après la différentiation, au lieu de la différence seconde de chaque coordonnée, sa valeur donnée par les équations différentielles du mouvement de la planète troublée. Il obtient ainsi la différentielle de chaque élément. Ensuite il observe que dans la substitution de la valeur de la différence seconde de chaque coordonnée, on peut ne considérer que la partie de cette valeur, due aux forces perturbatrices; l'autre partie devant disparaître dans l'expression de la différentielle de l'élément, puisque cette expression serait identiquement nulle, si ces forces n'existaient pas Lagrange, dans sa pièce sur l'équation séculaire de la Lune, qui remporta en 1774 le prix de l'Académie des Sciences, exprima les forces attractives décomposées suivant la direction des coordonnées, par les différences partielles d'une fonction prises par rapport à ces coordonnées Si l'on rapporte le mouvement du point attiré, au centre de gravité du système de corps; cette fonction est la somme des molécules attirantes, divisées respectivement par leurs distances au point attiré Si l'on rapporte le mouvement, au centre de l'un des corps du système, considéré comme immobile, il faut ajouter à cette somme, la demi-somme des produits de chaque molécule attirante, par le carré de sa distance au point attiré, diminué des carrés des distances de la molécule et du point au centre du corps supposé immobile, chacun de ces produits étant divisé par le cube de la distance de la molécule attirante à ce même centre. Je nommerai cette fonction, *fonction*

perturbatrice. La propriété dont elle jouit, d'exprimer par ses différences partielles, les forces perturbatrices du mouvement du point attiré, simplifie extrêmement les calculs, et donne à leurs résultats, une forme qui fait voir facilement leurs rapports, surtout quand on considère une infinité de molécules attirantes ou attirées, comme dans les théories de la figure des planètes, du flux et du reflux de la mer, et de la précession des équinoxes. Son introduction dans la Mécanique céleste est, à cause de son utilité, une véritable découverte

Lagrange, en appliquant la méthode précédente de la variation des élémens elliptiques, à l'expression du quotient de l'unité divisée par le grand axe, reconnut que la différentielle de cette expression prise en moins est la différentielle exacte de la fonction perturbatrice, prise par rapport aux seules coordonnées de la planète troublée. Si l'on développe cette fonction dans une série de sinus et de cosinus d'angles croissans proportionnellement au temps, et si l'on néglige le carré des forces perturbatrices; on obtient cette différentielle, en ne faisant varier dans ces sinus et cosinus, que les angles qui se rapportent à la planète. Lagrange en conclut que l'expression du grand axe ne contient que des inégalités périodiques; et qu'ainsi la longitude moyenne que l'on en déduit par les lois de Képler, ne contient elle-même que des inégalités de ce genre, et ne renferme point d'inégalités séculaires. Ce théorème auquel j'étais parvenu en négligeant les produits de quatre dimensions des excentricités et des inclinaisons des orbites, fut ainsi, non-seulement confirmé par ce grand géomètre, de la manière la plus élégante et la plus simple, mais encore étendu à des excentricités et à des inclinaisons quelconques.

J'ai fait voir dans le sixième Livre, qu'en ayant égard aux carrés et aux produits des masses de Jupiter et de Saturne, leurs grandes inégalités n'altèrent point ce résultat M Poisson est ensuite parvenu par une savante analyse insérée dans le tome VIII du Journal de l'École Polytechnique, à démontrer généralement, que le carré de la force perturbatrice n'introduit que des quantités périodiques, dans l'expression de la longitude moyenne; résultat important dans l'Astronomie, parce qu'une inégalité séculaire dans l'expression différentielle du grand axe, quoique multipliée par le carré des masses planétaires, donnerait par la double intégration qu'elle subit dans l'expression de la longitude moyenne, une inégalité du même ordre que l'inégalité du mouvement

elliptique, dont l'argument est le double de l'anomalie Ces recherches de M Poisson et celles qu'il a publiées dans le même volume, sur la précession des équinoxes et sur l'uniformité de la rotation de la Terre, lui ont acquis de justes droits à la reconnaissance des géomètres et des astronomes.

Le résultat précédent cesse d'avoir lieu, si les moyens mouvemens ont entre eux des rapports commensurables. Ce cas très singulier se présente dans le système des satellites de Jupiter, et je l'ai discuté dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de 1784. La longitude moyenne du premier satellite moins trois fois celle du second, plus deux fois celle du troisième est égale à la demi circonférence L'approximation avec laquelle les Tables des satellites de Jupiter par Vargentin donnent ce rapport, me fit soupçonner qu'il est rigoureux Il était contre toute vraisemblance de supposer que le hasard a placé originairement les trois premiers satellites, aux distances et dans les positions convenables à ce rapport, et il était extrêmement probable qu'il est dû à une cause particulière. Je cherchai donc cette cause dans l'action mutuelle des satellites L'examen approfondi de cette action, me fit voir qu'elle a suffi pour rendre ce rapport rigoureux, s'il a été fort approché à l'origine, d'où je conclus qu'en déterminant de nouveau par la discussion d'un très grand nombre d'observations éloignées entre elles, les longitudes moyennes des trois premiers satellites, on trouverait qu'ils approchent encore plus de ce rapport, que les Tables de Vargentin. Cette conséquence de la théorie a été confirmée avec une précision remarquable, par les recherches que Delambre a faites sur les satellites de Jupiter, et les Tables qu'il a publiées sont rigoureusement assujetties à ce rapport La petite différence qui a pu exister primitivement à cet égard, a donné lieu à une inégalité d'une étendue arbitraire, qui se partage entre les trois satellites, et que j'ai désignée par le nom de *libration* des mouvemens de ces satellites Les deux constantes arbitraires de cette inégalité, remplacent les deux arbitraires que ce rapport fait disparaître dans les moyens mouvemens et dans les époques des longitudes moyennes, car le nombre des arbitraires que renferme la théorie du mouvement d'un système de corps, est nécessairement sextuple du nombre de ces corps La discussion des observations n'ayant point fait reconnaître cette inégalité, elle est fort petite et même insensible

Dans les Mémoires de l'Académie de Berlin pour les années 1781 et

ivantes, Lagrange détermina par la méthode de la variation des élémens elliptiques, les inégalités séculaires et périodiques du mouvement des planètes, et il les réduisit en nombres, en donnant aux masses planétaires, les valeurs qui lui parurent les plus vraisemblables. Cette méthode déjà fort longue quand on considère la première puissance des excentricités et des inclinaisons, devient presque impraticable, lorsqu'on veut l'étendre aux carrés et aux puissances supérieures de ces quantités, ce qui est indispensable dans la théorie des planètes Mais elle peut être extrêmement simplifiée par les considérations suivantes.

On a vu que la différentielle de la puissance première inverse du grand axe prise en moins est égale à la différentielle de la fonction perturbatrice, prise en n'y faisant varier que les coordonnées de la planète troublée. En développant donc cette fonction dans une série de sinus et de cosinus d'angles croissans proportionnellement au temps, il suffira dans une première approximation où l'on néglige le carré de la force perturbatrice, de différencier chacun des termes de cette série, par rapport au seul mouvement de la planète. On aura ensuite par l'intégration de ces termes, l'expression de l'unité divisée par le grand axe on en conclura par les lois de Képler, la différentielle de la longitude moyenne, qui intégrée de nouveau, donnera cette longitude. On peut observer ici, que cette double intégration donne à chaque terme du développement de la fonction perturbatrice, pour diviseur, le carré du coefficient du temps compris sous les signes *sinus* ou *cosinus;* ce qui rend ce terme, fort grand, lorsque ce coefficient est très petit.

La facilité que donne l'expression très simple de la différentielle du grand axe, pour avoir la longitude, me fit rechercher s'il est possible de donner aux différentielles des autres élémens elliptiques, une forme aussi simple, dans laquelle les différences partielles de la fonction perturbatrice ne seraient prises que par rapport aux élémens, et dont les coefficiens ne renfermeraient point le temps En effet, il suffirait alors de différencier par rapport à ces élémens, chaque terme du développement de la fonction perturbatrice et ensuite de l'intégrer Je parvins à obtenir les différentielles des élémens sous cette forme, par l'analyse que j'ai donnée dans le Supplément à la Mécanique céleste, et que je présentai le 27 août 1807, au Bureau des Longitudes Dans la même séance, Lagrange présenta une très belle analyse par laquelle il exprimait la différence partielle de la force perturbatrice, prise par rapport

à chaque élément, par une fonction linéaire des différentielles des élémens, divisées par la différentielle du temps, et dans laquelle les coefficiens de ces différentielles, ne renfermaient point le temps En déterminant au moyen de ces expressions, la différentielle de chaque élément, il parvint ensuite aux mêmes équations que j'avais trouvées Ce grand géomètre a étendu son analyse, au mouvement des corps solides, et généralement au mouvement d'un système de corps liés entre eux d'une manière quelconque. Ce travail des dernières années de sa vie, est une de ses plus belles productions il montre que l'âge n'avait point affaibli son génie M Poisson a publié sur cet objet, plusieurs savans Mémoires où il a été conduit sur le mouvement des corps solides, à des équations de la même forme que pour les points libres; ce qui établit l'analogie de ces mouvemens

Les recherches sur Jupiter et Saturne dont j'ai parlé ci-dessus, laissaient encore inconnue, la cause des grandes irrégularités que les observations anciennes et modernes indiquaient dans les mouvemens de ces deux planètes Halley avait conclu de la comparaison des observations anciennes avec les modernes, un ralentissement dans le moyen mouvement de Saturne, et une accélération dans celui de Jupiter. Lambert avait obtenu un résultat contraire en comparant les observations du dernier siècle avec celles de Ticho-Brahé. Enfin Lalande trouvait les retours de Saturne à l'équinoxe du printemps, plus prompts que ses retours à l'équinoxe d'automne, quoique les positions de Jupiter et de Saturne, soit entre eux, soit à l'égard de leurs aphélies, fussent à peu près les mêmes. Cela portait à croire que des causes étrangères avaient altéré les mouvemens de ces deux planètes, mais en y réfléchissant, la marche de ces altérations me parut si bien d'accord avec ce qui devait résulter de leur action mutuelle, que je ne balançai point à rejeter toute action extérieure au système planétaire.

C'est un résultat remarquable de l'action réciproque des planètes, que si l'on n'a égard qu'aux inégalités dont les périodes sont très longues, la somme des masses de chaque planète divisées respectivement par les grands axes de leurs orbes considérés comme des ellipses variables, est à très peu près constante. Nous avons dit précédemment que ces inégalités acquièrent par une double intégration, dans l'expression de la longitude, pour diviseur, le carré du très petit coefficient du temps dans leur argument, ce qui peut les rendre considérables. De là il est facile de voir

que la somme des produits des inégalités de ce genre, qui résultent de l'action de Jupiter et de Saturne, multipliées respectivement par les masses de ces planètes, est nulle; ainsi, quand en vertu de ces inégalités, le mouvement de Saturne se rallentit par l'action de Jupiter, celui de Jupiter doit s'accélérer par l'action de Saturne, et le rallentissement doit être à l'accélération, dans le rapport de la masse de Jupiter multipliée par la racine carrée de son grand axe, à la masse de Saturne multipliée par la racine carrée de son grand axe; ce qui est à fort peu près conforme au résultat de Halley. Réciproquement, quand ces inégalités accélèrent le mouvement de Saturne, elles retardent celui de Jupiter dans le même rapport; ce qui s'accorde à peu près avec le résultat de Lambert. Cela indiquait avec une grande probabilité, l'existence d'une inégalité à très longue période dans les mouvemens de ces deux planètes. Il me fut aisé de reconnaître une inégalité semblable, dans les équations différentielles de ces mouvemens. Ils approchent beaucoup d'être commensurables, et cinq fois le mouvement de Saturne est à fort peu près égal à deux fois celui de Jupiter. De là je conclus que les termes qui ont pour argument, cinq fois la longitude moyenne de Saturne, moins deux fois celle de Jupiter, pouvaient devenir très sensibles par les intégrations, quoiqu'ils fussent multipliés par les cubes et par les produits de trois dimensions des excentricités et des inclinaisons des orbites. Je regardai donc ces termes, comme une cause fort vraisemblable des variations observées dans les moyens mouvemens de ces planètes. La probabilité de cette cause et l'importance de l'objet me déterminèrent à entreprendre le calcul long et pénible, nécessaire pour m'en assurer. Le résultat de ce calcul confirma pleinement ma conjecture, en me faisant voir 1°. qu'il existe dans le mouvement de Saturne, une grande inégalité de 8896″ centésimales dans son *maximum*, dont la période est de 929 ans; 2°. qu'il existe dans le mouvement de Jupiter une inégalité correspondante dont la période est à très peu près la même, mais qui, affectée d'un signe contraire, ne s'élève qu'à 3662″. La grandeur des coefficiens de ces inégalités, et la durée de leur période ne sont pas toujours les mêmes : elles participent aux variations séculaires des élémens des orbites. J'ai déterminé avec un soin particulier ces coefficiens et leurs variations séculaires. Le rapport presque commensurable des moyens mouvemens de Jupiter et de Saturne, donne naissance à d'autres inégalités très sensibles. La plus considérable est celle qui affecte le mou-

vement de Saturne. Elle se confondrait avec l'équation du centre, si cinq fois le moyen mouvement de cette planète était exactement égal à deux fois celui de Jupiter C'est elle qui dans le dernier siècle, a rendu les retours de Saturne à l'équinoxe du printemps, plus prompts que ses retours à l'équinoxe d'automne, comme Lalande l'avait remarqué En général, lorsque j'eus reconnu ces diverses inégalités, et déterminé avec plus de soin qu'on ne l'avait fait, celles que l'on avait déjà calculées, je vis toutes les observations anciennes et modernes représentées par ma théorie, avec la précision qu'elles comportent. Elles semblaient auparavant, inexplicables par la loi de la pesanteur universelle, elles en sont maintenant une des preuves les plus frappantes. Tel a été le sort de cette brillante découverte, que chaque difficulté qui s'est élevée, est devenue pour elle, un nouveau sujet de triomphe; ce qui est le plus sûr caractère du vrai système de la nature. Il restait à former des Tables de Jupiter et de Saturne, fondées sur ma théorie; ce qui exigeait une discussion nouvelle des meilleures observations, et leur comparaison avec ma théorie, pour en déduire les élémens du mouvement elliptique Delambre exécuta ce travail, et les tables qu'il construisit ne s'écartèrent pas d'une minute, des observations bien faites et bien discutées Il appliqua mes formules à la planète Uranus que Herschel venait de découvrir, et il parvint à représenter par ses Tables, non-seulement les observations faites depuis cette découverte, mais encore quelques observations de Flamsteed, Mayer et Bradley qui avaient observé cette planète, en la considérant comme une étoile. Désirant donner aux Tables de ces trois planètes, la plus grande précision; j'ai revu avec un soin particulier, leur théorie; et M Bouvard l'ayant comparée avec un grand nombre d'observations faites avec d'excellens instrumens, et par les meilleurs observateurs; il a construit de nouvelles Tables de ces trois planètes, qui ne s'écartent pas de ces observations, au-delà de treize secondes sexagésimales Dans les équations de condition, qu'il a formées pour déterminer les élémens elliptiques, il a laissé comme indéterminées, les corrections des masses de ces planètes que l'on avait conclues des observations de leurs satellites En résolvant ces équations, il a déterminé ces corrections Il a trouvé nulle à fort peu près, celle de la masse de Jupiter. La correction de la masse de Saturne diminue d'un sixième environ la valeur que Newton en a donnée. Si l'on applique à ces résultats, le calcul des probabilités, on trouve qu'il est extrêmement probable que

l'erreur n'est pas un centième de leur valeur. La correction de la masse d'Uranus conclue des observations de ses satellites, est peu considérable. L'action de cette planète sur Saturne n'étant pas très sensible, la valeur de sa masse est moins sûre, que celle de la masse de Saturne; mais elle confirme la valeur déduite des observations des satellites d'Uranus, et qui vu l'incertitude de ces observations, avait besoin d'être confirmée. Les Tables de M. Bouvard représentent aussi bien qu'on peut le désirer, les observations anciennes de Jupiter et de Saturne, et la conjonction de ces deux planètes observée par Ibn Junis dans l'année 1007. Cet accord prouve que depuis les temps anciens jusqu'à nous, l'action des causes étrangères a été insensible.

En considérant le peu de différence qui existe entre cinq fois le moyen mouvement de Saturne et deux fois celui de Jupiter, on voit qu'un léger changement dans les distances moyennes primitives de ces deux planètes eût suffi pour la rendre nulle. Mais cela même n'était pas nécessaire à cet objet; car l'attraction mutuelle des deux planètes eût rendu cette différence constamment nulle, dans le cas où elle ne l'aurait pas été à l'origine, pourvu qu'elle eût été contenue dans d'étroites limites. On verra bientôt que ces limites sont à peu près, plus ou moins quatre dixièmes de la différence observée; et que pour faire tomber cette différence dans ces limites, il suffirait d'augmenter d'un 530,e la moyenne distance de Saturne au Soleil, et de diminuer d'un 1300e, celle de Jupiter. Il s'en est donc fallu bien peu que les deux plus grosses planètes de notre système n'aient offert un phénomène analogue à celui des trois premiers satellites de Jupiter, mais qui eût été bien plus compliqué, par sa grande influence sur les variations séculaires des élémens de leurs orbites

J'ai donné dans le sixième Livre, l'application de mes formules au système des planètes principales. Elles ont été appliquées aux quatre planètes télescopiques découvertes depuis le commencement de ce siècle. L'excentricité considérable des orbites de Pallas et de Junon rend les approximations peu convergentes. La recherche de nouvelles méthodes pour soumettre leurs perturbations au calcul, sera utile à l'Astronomie et à l'Analyse.

Clairaut s'occupa, le premier, des perturbations des comètes. Il appliqua sa solution du problème des trois corps, au retour de la comète de 1682. Cette comète avait été observée en 1531 et 1607.

Halley avait déduit des observations, les intervalles de ses passages au périhélie, de 1531 à 1607 et de 1607 à 1682, et il en avait conclu son retour vers la fin de 1758, ou au commencement de 1759. Clairaut se proposa de rechercher la différence entre ces intervalles et celui de son passage au périhélie en 1682, au passage prochain. Après d'immenses calculs, il annonça à l'Académie des Sciences, dans sa séance publique du 14 novembre 1758, que le dernier de ces intervalles devait surpasser le précédent, d'environ 618 jours, et qu'en conséquence, la comète passerait à son périhélie vers le milieu d'avril 1759. Il observa en même temps que les petites quantités négligées dans ces approximations, pouvaient avancer ou reculer ce terme, d'un mois. Il remarqua d'ailleurs, « qu'un corps qui passe dans des régions aussi » éloignées, et qui échappe à nos yeux pendant des intervalles aussi » longs, pourrait être soumis à des forces totalement inconnues, telles » que l'action des autres comètes ou même de quelque planète trop » distante du Soleil, pour être jamais aperçue. »

Il eut la satisfaction de voir sa prédiction accomplie. La comète revint au périhélie le 12 mars 1759, dans les limites des erreurs dont il croyait son résultat susceptible. Après une révision de ses calculs, Clairaut a fixé ce passage au 4 avril, et il l'aurait avancé jusqu'au 24 mars, c'est-à-dire, à douze jours seulement de l'observation, s'il eût employé la vraie valeur de la masse de Saturne. Cette différence paraîtra bien petite, si l'on considère les erreurs inévitables dans des approximations aussi nombreuses et aussi compliquées, et l'influence de la planète Uranus dont l'existence, au temps de Clairaut, n'était pas connue. On doit donc regarder ce travail de Clairaut, comme une belle confirmation du principe de la pesanteur universelle. L'annonce de ce grand géomètre, sur le retour de la comète de 1759, donna lieu à une vive discussion sur la manière d'apprécier son erreur. Quelques-uns voulaient la répartir sur la révolution entière de la comète. D'Alembert jugea avec raison, que cette erreur devait se rapporter à la différence de l'intervalle entre les passages au périhélie de 1607 à 1682, à l'intervalle des passages au périhélie de 1682 à 1759 Il étendit aux comètes, sa solution du problème des trois corps, mais sans en faire d'applications numériques. C'est principalement aux perturbations des comètes, que la méthode de la variation des élémens elliptiques est appropriée Cette méthode donne immédiatement ces élémens par des

quadratures mécaniques que l'on peut simplifier, sur-tout lorsque la comète est à une distance considérable de la planète perturbatrice Lagrange a développé cette méthode dans la pièce qui remporta le prix de l'Académie des Sciences, en 1780 ; et je l'ai présentée avec étendue dans le neuvième Livre. MM Encke et Damoiseau ont calculé les perturbations de la singulière comète dont la période n'est que de 1200 jours; et M. Damoiseau, dans une pièce couronnée par l'Académie des Sciences de Turin, a calculé le retour prochain de la comète de 1759. L'Académie des Sciences de Paris vient de provoquer de nouvelles recherches sur ces deux objets, en les proposant pour le sujet du prix qu'elle doit décerner en 1826.

Les géomètres ont soumis au calcul, les perturbations que l'action des comètes peut faire éprouver aux planètes et spécialement à la Terre. Cette action a été jusqu'à présent insensible, les perturbations produites par l'action des planètes et des satellites suffisant seules pour représenter les observations. Il en résulte que les masses des comètes sont extrêmement petites, ce que leur apparence nébuleuse confirme. La comète que l'on observe maintenant, est une nébulosité sans queue, dont le diamètre est d'environ deux minutes sexagésimales, et dans laquelle on ne distingue point de noyau. Cette masse de vapeurs n'exerce qu'une action insensible sur ses molécules extrêmes qui, comme la masse entière, n'obéissent qu'à l'action du Soleil. La régularité avec laquelle son mouvement suit les lois du mouvement parabolique, montre l'extrême rareté de la lumière et des autres fluides qui peuvent être répandus dans les espaces célestes; puisqu'ils n'opposent aucune résistance sensible, au mouvement d'une nébulosité aussi rare. Mais cette résistance, quoique insensible pendant l'apparition d'une comète, peut devenir sensible pendant une longue suite de ses révolutions. Son principal effet est par le chapitre VIII du dixième Livre, de diminuer sans cesse les grands axes des orbites. On peut expliquer ainsi la courte durée de la révolution de la comète qui a reparu après un intervalle de 1200 jours, et qui doit reparaître sans cesse après un semblable intervalle, à moins que l'évaporation qu'elle éprouve à chacune de ses apparitions, ne finisse par la rendre invisible.

CHAPITRE II.

Considérations sur quelques objets du second Livre.

Sur les variations des élémens du mouvement elliptique.

2 J'ai donné dans le chapitre VIII du second Livre, les expressions différentielles des élémens du mouvement elliptique. J'ai repris cet objet d'une manière encore plus générale, dans le Supplément à la Mécanique céleste Je vais ajouter ici quelques considérations à ce que j'ai dit dans ce Supplémont dont je conserverai les dénominations, et que je suppose que l'on ait sous les yeux.

Les équations (5) et (6) de la page 6 de ce Supplément, supposent que l'on néglige les carrés et les puissances supérieures de p et de q, ce qui revient à les considérer comme infiniment petites. Mais il est facile d'étendre ces équations, au cas où ils sont finis Pour cela, imaginons sur la surface d'une sphère, deux arcs AC et BC se coupant en C, et dont le premier représente un plan infiniment peu incliné à l'orbite représentée par BC, C étant le nœud ascendant de cette orbite sur AC. Représentons encore par l'arc BAM, un autre plan fixe formant avec AC, l'angle aigu et fini CAB. Je ne donne point ici cette figure, parce qu'elle est simple et facile à tracer d'après les indications précédentes. Nommons γ' l'inclinaison de l'orbite BC sur BM ou le supplément de l'angle CBM AC étant ce que j'ai nommé θ dans le Supplément cité, et l'angle ACB étant ce que j'ai nommé γ; on aura, en désignant par π la demi-circonférence et par A l'angle CAB,

$$A + \pi - \gamma' + \gamma = \pi + \text{surface ABC}.$$

La surface ABC est aux infiniment petits près du second ordre, égale à $\gamma(1 - \cos\theta)$ et par conséquent égale à $\gamma - q$, q désignant dans

le supplément, $\gamma \cos \theta$; on a donc

$$A + \pi - \gamma' + \gamma = \pi + \gamma - q;$$

ce qui donne en différenciant

$$dq = d\gamma''.$$

On a ensuite, en faisant $AB = f$,

$$\sin \gamma \,.\, \sin \theta = \sin f \,.\, \sin \gamma'$$

Ce qui donne en observant que γ et f sont infiniment petits, et que $\gamma . \sin \theta$ est ce que nous avons nommé p dans le Supplément,

$$dp = df \,.\, \sin \gamma'.$$

Nommons présentement θ' la distance du nœud de l'orbite sur BAM au point fixe M, et faisons

$$p' = \sin \gamma' \,.\, \sin \theta'; \quad q' = \sin \gamma' \,.\, \cos \theta';$$

on aura, en observant que $df = d\theta'$,

$$dp' = d\gamma' \,.\, \cos \gamma' \,.\, \sin \theta' + df \,.\, \sin \gamma' \,.\, \cos \theta',$$
$$dq' = d\gamma' \,.\, \cos \gamma' \,.\, \cos \theta' - df \,.\, \sin \gamma \,.\, \sin \theta'.$$

L'expression précédente de dp donne

$$df = \frac{dp}{\sin \gamma'}.$$

On a ensuite par ce qui précède, $d\gamma' = dq$; on aura donc

$$dp' = dq \,.\, \cos \gamma' \,.\, \sin \theta' + dp \,.\, \cos \theta',$$
$$dq' = dq \,.\, \cos \gamma' \,.\, \cos \theta' - dp \,.\, \sin \theta'$$

Si l'on substitue au lieu de dp et dq leurs valeurs données par les équations (5) et (6) de la page 6 du Supplément, on aura

$$dp' = \frac{and\iota}{\sqrt{1 - e^2}} \left[\cos \gamma' \,.\, \sin \theta' \left(\frac{dR}{dp}\right) - \cos \theta' \left(\frac{dR}{dq}\right) \right].$$

On a évidemment, en considérant successivement R comme fonction

de p et de q, et comme fonction de p' et de q',

$$\left(\frac{d\mathrm{R}}{dp}\right) dp + \left(\frac{d\mathrm{R}}{dq}\right) dq = \left(\frac{d\mathrm{R}}{dp'}\right) dp' + \left(\frac{d\mathrm{R}}{dq'}\right) dq'.$$

En substituant pour dp' et dq', leurs valeurs précédentes en dp et dq, et comparant séparément les coefficiens de dp et de dq, on aura

$$\left(\frac{d\mathrm{R}}{dp}\right) = \left(\frac{d\mathrm{R}}{dp'}\right) \cos\theta' - \left(\frac{d\mathrm{R}}{dq'}\right) \sin\theta',$$

$$\left(\frac{d\mathrm{R}}{dq}\right) = \left(\frac{d\mathrm{R}}{dp'}\right) \cos\gamma' \,.\, \sin\theta' + \left(\frac{d\mathrm{R}}{dq'}\right) \cos\gamma' \cos\theta'$$

Ces valeurs de $\left(\frac{d\mathrm{R}}{dp}\right)$ et de $\left(\frac{d\mathrm{R}}{dq}\right)$ substituées dans l'expression précédente de dp' donnent

$$dp' = -\frac{andt}{\sqrt{1-e^2}} \,.\, \cos\gamma' \left(\frac{d\mathrm{R}}{dq'}\right)$$

On trouvera de la même manière,

$$dq' = \frac{andt}{\sqrt{1-e^2}} \,.\, \cos\gamma' \left(\frac{d\mathrm{R}}{dp'}\right)$$

Ces équations sont rigoureuses, et peuvent être substituées aux équations (5) et (6) du Supplément cité.

On peut en conclure, de cette manière, les valeurs de $d\gamma'$ et de $d\theta'$. Pour cela, on observera que

$$\sin^2\gamma' = p'^2 + q'^2\,; \quad \tang\theta' = \frac{p'}{q'}\,;$$

ce qui donne

$$d\gamma' \,.\, \sin\gamma' \,.\, \cos\gamma' = p'dp' + q'dq',$$
$$d\theta' \,.\, \sin^2\gamma' = q'dp' - p'dq'$$

Substituant au lieu de dp' et de dq' leurs valeurs précédentes, on aura

$$d\gamma' \,.\, \sin\gamma' = -\frac{andt}{\sqrt{1-e^2}} \left[p'\left(\frac{d\mathrm{R}}{dq'}\right) - q'\left(\frac{d\mathrm{R}}{dp'}\right)\right].$$

On a

$$\left(\frac{dR}{dp'}\right) dp' + \left(\frac{dR}{dq'}\right) dq' = \left(\frac{dR}{d\theta'}\right) d\theta' + \left(\frac{dR}{d\gamma'}\right) d\gamma'$$

En substituant pour $d\theta'$ et $d\gamma'$, leurs valeurs précédentes, et en comparant séparément les coefficiens de dp' et de dq', on aura

$$\left(\frac{dR}{dp'}\right) = \left(\frac{dR}{d\theta'}\right) \frac{\cos^2\theta'}{\sin\gamma'} + \left(\frac{dR}{d\gamma'}\right) \frac{\sin\theta'}{\cos\gamma'},$$

$$\left(\frac{dR}{dq'}\right) = -\left(\frac{dR}{d\theta'}\right) \frac{\sin\theta'}{\sin\gamma'} + \left(\frac{dR}{d\gamma'}\right) \frac{\cos\theta'}{\cos\gamma'},$$

d'où l'on tire

$$p'\left(\frac{dR}{dq'}\right) - q'\left(\frac{dR}{dp'}\right) = -\left(\frac{dR}{d\theta'}\right),$$

on a donc

$$d\gamma' = \frac{andt}{\sin\gamma' \sqrt{1-e^2}} \cdot \left(\frac{dR}{d\theta'}\right)$$

On trouvera de la même manière,

$$d\theta' = -\frac{andt}{\sin\gamma' \sqrt{1-e^2}} \cdot \left(\frac{dR}{d\gamma'}\right)$$

En ajoutant ces deux équations multipliées respectivement par $d\theta'$ et $-d\gamma'$, on aura

$$0 = \left(\frac{dR}{d\gamma'}\right) d\gamma' + \left(\frac{dR}{d\theta'}\right) d\theta'.$$

Ainsi, la fonction R est constante eu égard aux variations de θ' et de γ'

Si l'on réunit ces équations, aux équations (1), (2), (3), (4) du Supplément cité, et si l'on désigne ici par γ et θ, ce que nous venons de désigner par γ' et θ', on aura les six équations suivantes

$$da = -2a^2 \cdot dR, \qquad (1)$$

$$d\varepsilon = -\frac{andt \cdot \sqrt{1-e^2}}{e}\left(1 - \sqrt{1-e^2}\right)\left(\frac{dR}{de}\right) + 2a^2 ndt\left(\frac{dR}{da}\right); \qquad (2)$$

$$de = \frac{a \cdot \sqrt{1-e^2}}{e}\left(1 - \sqrt{1-e^2}\right) dR + \frac{andt \cdot \sqrt{1-e^2}}{e}\left(\frac{dR}{d\varpi}\right), \qquad (3)$$

$$d\varpi = -\frac{andt\ \sqrt{1-e^2}}{e}\left(\frac{dR}{de}\right), \tag{4}$$

$$d\gamma = \frac{andt}{\sin\gamma\ .\ \sqrt{1-e^2}}\left(\frac{dR}{d\theta}\right); \tag{5}$$

$$d\theta = -\frac{andt}{\sin\gamma\ .\ \sqrt{1-e^2}}\left(\frac{dR}{d\gamma}\right). \tag{6}$$

On doit observer que la différence partielle $\left(\frac{dR}{da}\right)$ doit être prise ici, sans faire varier n.

Dans la théorie des variations séculaires, il est plus simple d'employer au lieu des quantités e, ϖ, γ, θ, les suivantes, h, l, p, q, en faisant

$$h = e\ .\ \sin\varpi;\quad l = e\ .\ \cos\varpi,$$
$$p = \gamma\ .\ \sin\theta,\quad q = \gamma\ .\ \cos\varpi.$$

Si l'on néglige les carrés de e et de γ et leurs produits, eu égard à l'unité, si l'on substitue pour n, $\frac{1}{a}$, et si l'on observe qu'en n'ayant égard qu'aux variations séculaires, on doit négliger dR, ou le supposer nul, les équations (3), (4), (5) et (6) donneront les suivantes

$$m.\frac{dh}{dt}\ .\ \sqrt{a} = -m\left(\frac{dR}{dl}\right),$$

$$m.\frac{dl}{dt}\ .\ \sqrt{a} = m\left(\frac{dR}{dh}\right),$$

$$m\ .\ \frac{dp}{dt}\ .\ \sqrt{a} = -m\left(\frac{dR}{dq}\right),$$

$$m\ .\ \frac{dq}{dt}\ .\ \sqrt{a} = m\left(\frac{dR}{dp}\right),$$

où l'on ne doit considérer, dans une première approximation, que la partie de R, constante et dépendante de h, l, p et q. Cela posé; si l'on développe l'expression de R du n° 46 du second Livre, et si l'on désigne par F la quantité

$$\Sigma\left\{\begin{array}{l}\frac{3mm'aa'(a,a')^2}{8(a'^2-a^2)^2}\left[h^2+l^2+h'^2+l'^2-(p'-p)^2-(q'-q)^2\right]\\ -3mm'\left[\frac{(a^2+a'^2)\ (a,a')+aa'\ (a,a')^2}{2\ (a'^2-a^2)^{2}}\right](hh'+ll')\end{array}\right\},$$

(a, a') étant la partie indépendante de θ dans le développement de $(a^2 - 2aa' \cdot \cos\theta + a'^2)^{\frac{1}{2}}$, suivant les cosinus de θ et de ses multiples; $(a, a')^1$ étant le coefficient de $\cos\theta$ dans ce développement, et la caractéristique Σ servant à exprimer la somme de toutes les quantités semblables à celle qu'elle précède, et que l'on peut former en considérant deux à deux les masses m, m', m'', etc, on aura les équations suivantes

$$m \cdot \frac{dh}{dt} \cdot \sqrt{a} = -\left(\frac{dF}{dl}\right),$$

$$m \cdot \frac{dl}{dt} \cdot \sqrt{a} = \left(\frac{dF}{}\right),$$

$$m \cdot \frac{dp}{dt} \cdot \sqrt{a} = -\left(\frac{dF}{dq}\right),$$

$$m \cdot \frac{dq}{dl} \cdot \sqrt{a} = \left(\frac{dF}{dp}\right),$$

$$m' \cdot \frac{dh'}{dt} \cdot \sqrt{a'} = -\left(\frac{dF}{dl'}\right),$$

etc

Ces équations sont les équations (A) et (C) des n°s 55 et 59 du second livre. Lagrange a donné le premier les équations (C) relatives aux inclinaisons et aux nœuds des orbites, dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de 1774. J'ai donné les équations (A) dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de 1772. Toutes ces équations sont linéaires et facilement intégrables par les méthodes connues. Leur forme symétrique et fort simple m'a fait voir que leurs intégrales ne renferment par rapport aux temps, ni exponentielles ni arcs de cercle, et qu'ainsi les excentricités et les inclinaisons des orbites sont fonctions de sinus et de cosinus d'angles croissans avec une grande lenteur, et indépendans de la configuration mutuelle des planètes, en sorte que les orbites planétaires ont toujours été et seront toujours presque circulaires et peu inclinées entre elles, ce qui assure la stabilité du système planétaire. Il est facile de voir que les équations précédentes donnent

$$m\sqrt{a}\,(hdh + ldl) + m'\sqrt{a'}\,(h'dh' + l'dl') + \text{etc} = 0,$$

$$m \cdot \sqrt{a}\,(pdp + qdq) + m'\sqrt{a'}\,(p'dp' + q'dq') + \text{etc} = 0,$$

d'où l'on tire en intégrant

$$e^2 . m\sqrt{a} + e'^2 . m' . \sqrt{a'} + \text{etc.} = C,$$

$$\gamma^2 . m\sqrt{a} + \gamma'^2 . m' . \sqrt{a'} + \text{etc.} = C'$$

C et C' étant deux constantes très petites, il en résulte que e, e', etc., γ, γ', etc., seront toujours des quantités très petites.

Lagrange, dans la seconde édition de sa Mécanique analytique, observe que si la masse m' est très petite par rapport à m, comme Mars relativement à Jupiter dont il n'est pas la centième partie; alors le terme $e'^2 m' \sqrt{a'}$ sera toujours du même ordre que $e^2 m \sqrt{a}$, quoique e' croisse considérablement et devienne même égal à l'unité. Il en conclut que l'on ne peut être alors assuré que e'^2 conservera toujours une petite valeur, qu'en résolvant l'équation algébrique qui détermine les coefficiens du temps, dans les sinus et cosinus des expressions de h, l, h', l', etc., et en s'assurant que les racines de cette équation sont toutes réelles. Mais si ce grand géomètre eût considéré ce que j'ai dit dans les Mémoires de l'Académie des Sciences de 1784, et dans le n° 57 du second Livre de la Mécanique céleste, il aurait vu que sans recourir à cette résolution, je démontre que ces racines sont toutes réelles et inégales.

Sur le développement en série, des puissances du radical qui exprime la distance mutuelle de deux planètes.

3. Si l'on nomme r et r' les rayons vecteurs de deux planètes, et θ l'angle au Soleil, compris entre ces rayons, la distance mutuelle des deux planètes sera

$$\sqrt{r^2 - 2rr' . \cos\theta + r'^2}.$$

r et r' diffèrent toujours peu des moyennes distances a et a' de ces planètes, en sorte qu'en désignant r par $a + \delta r$, r' par $a' + \delta r'$, on aura en développant le radical dans une série ordonnée suivant les puissances et les produits de δr et de $\delta r'$, une suite de termes multipliés par les puissances successivement décroissantes du radical

$$\sqrt{a^2 - 2aa' . \cos\theta + a'^2}$$

Supposons a' plus grand que a, et faisons $\frac{a}{a'} = \alpha$; ce radical devient

$$a' \sqrt{1 - 2\alpha \cdot \cos\theta + \alpha^2}.$$

Considérons généralement la puissance

$$(1 - 2\alpha \cdot \cos\theta + \alpha^2)^{-s},$$

et supposons qu'en la développant dans une série ordonnée par rapport à $\cos\theta$, $\cos 2\theta$, etc., on ait la suite

$$\tfrac{1}{2} \cdot b_s^{(0)} + b_s^{(1)} \cdot \cos\theta + b_s^{(2)} \cdot \cos 2\theta + \ldots + b_s^{(i)} \cdot \cos i\theta + \text{etc} \;;$$

on aura par le n° 49 du second Livre,

$$(i - s)\alpha \cdot b_s^{(i)} = (i - 1)(1 + \alpha^2) \cdot b_s^{(i-1)} - (i + s - 2)\alpha \cdot b_s^{(i-2)} \qquad (a)$$

Cette équation aux différences finies peut être intégrée au moyen d'intégrales définies, par la méthode que j'ai donnée dans ma Théorie analytique des Probabilités. En faisant d'après cette méthode

$$b_s^{(i)} = \int x^i \cdot \varphi \cdot dx,$$

φ étant une fonction de x; il faut déterminer φ et les limites de l'intégrale $\int x^i \varphi dx$; ce que l'on fera de cette manière

On substituera cette valeur de $b_s^{(i)}$ dans l'équation aux différences finies (a) qui devient ainsi

$$0 = (i - s)\alpha \int x^i \varphi dx - (i - 1)(1 + \alpha^2) \int x^{i-1} \varphi dx + (i + s - 2)\alpha \int x^{i-2} \varphi dx.$$

En intégrant par parties, on aura

$$\begin{aligned} 0 = {} & x^{i-1} \cdot \varphi \cdot [\alpha - (1 + \alpha^2)x + \alpha x^2] \\ & + \int x^{i-2} \cdot \varphi dx [(s - 1)\alpha + (1 + \alpha^2)x - (s + 1)\alpha x^2] \\ & - \int x^{i-1} \cdot d\varphi [\alpha - (1 + \alpha^2)x + \alpha x^2] \end{aligned}$$

Cette équation doit, suivant la méthode que j'ai citée, se partager en deux, en égalant séparément à zéro les termes compris sous le signe

intégral, ce qui donne

$$0 = \varphi\,[(s-1)\alpha + (1+\alpha^2)x - (s+1)\alpha x^2]\,dx - x\,d\varphi\,[\alpha - (1+\alpha^2)x + \alpha x^2],$$

$$0 = x^{i-1}.\,\varphi.\,[\alpha - (1+\alpha^2)x + \alpha x^2].$$

La première de ces équations donne en l'intégrant

$$\varphi = \frac{H\,x^{i-1}}{[\alpha - (1+\alpha^2)x + \alpha x^2]^i};$$

H étant une constante arbitraire. La seconde équation qui sert à déterminer les limites de l'intégrale, donne pour les limites de l'intégrale $\int x^i \varphi\, dx$,

$$0 = x^{i+i-2}\,[\alpha - (1+\alpha^2)x + \alpha x^2]^{1-i}.$$

On peut toujours supposer s moindre que l'unité; parce qu'ayant pour ce cas, la valeur de $b_s^{(i)}$, on peut par le n° 49 du second Livre, en conclure la valeur relative à tous les cas où s est augmenté ou diminué d'un nombre entier. Dans le cas des planètes, $s = \frac{1}{2}$, et l'équation des limites devient

$$0 = x^{i-\frac{3}{2}}.\,[\alpha - (1+\alpha^2)x + \alpha x^2]^{\frac{1}{2}}$$

dont les racines sont, lorsque i est égal ou plus grand que 2,

$$x = 0, \quad x = \alpha, \quad x = \frac{1}{\alpha}.$$

Ainsi l'intégrale complète de l'équation (a) est alors

$$b_{\frac{1}{2}}^{(i)} = H.\frac{\int x^{i-\frac{1}{2}}dx}{\sqrt{(\alpha - x)(1 - \alpha x)}} + H'.\frac{\int x^{i-\frac{1}{2}}dx}{\sqrt{(\alpha - x)(1 - \alpha x)}},$$

la première intégrale étant prise depuis $x = 0$ jusqu'à $x = \alpha$, et la seconde étant prise depuis $x = \alpha$ jusqu'à $x = \frac{1}{\alpha}$. H et H′ sont deux arbitraires. Cette dernière intégrale introduit dans l'expression de $b_{\frac{1}{2}}^{(i)}$, des puissances négatives de α, de l'ordre $\frac{1}{\alpha^i}$, ce qui n'a point lieu pour

les planètes. On doit donc alors supposer H′ nul. Pour avoir l'intégrale

$$\mathrm{H}.\int \frac{x^{i-\frac{1}{2}}dx}{\sqrt{(\alpha-x)(1-\alpha x)}},$$

nous ferons

$$x = \alpha(1 - t^2);$$

l'intégrale précédente devient ainsi

$$2\mathrm{H}.\alpha^i\int \frac{dt.(1-t^2)^{i-\frac{1}{2}}}{\sqrt{1-\alpha^2+\alpha^2t^2}},$$

cette dernière intégrale étant prise depuis $t = 0$, jusqu'à $t = 1$; c'est l'expression de $b^{(i)}_{\frac{1}{2}}$. Soit

$$(1-t^2)^{i-\frac{1}{2}} = c^{-u^2};$$

c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité; on aura en développant en série

$$t^2 = \frac{u^2}{i-\frac{1}{2}}.\left[1 - \frac{u^2}{1.2.(i-\frac{1}{2})} + \frac{u^4}{1.2.3\,(i-\frac{1}{2})^2} - \text{etc.}\right];$$

ce qui donne

$$t = \frac{u}{\sqrt{i-\frac{1}{2}}}\left(1 - \frac{u^2}{4(i-\frac{1}{2})} + \text{etc.}\right)$$

Lorsque i est un grand nombre, les termes qui suivent le premier dans le second membre, deviennent successivement plus petits et sont des ordres $\frac{1}{i}$, $\frac{1}{i^2}$, etc., par rapport à lui. Nous ne considérerons ici que le premier, et alors l'expression précédente de $b^{(i)}_{\frac{1}{2}}$, devient

$$\frac{2\mathrm{H}\,\alpha^i}{\sqrt{(i-\frac{1}{2})\,(1-\alpha^2)}}.\int du.c^{-u^2}$$

t nul, donne u nul, et $t = 1$, donne u infini. L'intégrale $\int du.c^{-u^2}$ devient, comme l'on sait, dans ces limites, égale à $\frac{1}{2}\sqrt{\pi}$, π étant

la demi-circonférence dont le rayon est l'unité On a donc, lorsque i est un grand nombre

$$b^{(i)}_{\frac{1}{2}} = \frac{H\alpha^i \sqrt{\pi}}{\sqrt{(i-\frac{1}{2})(1-\alpha^2)}}$$

Pour déterminer H, nous observerons que $b^{(i)}_{\frac{1}{2}}$ étant le coefficient de $\cos i\theta$, dans le développement de $(1 - 2\alpha . \cos\theta + \alpha^2)^{-\frac{1}{2}}$, ou de

$$\left(1 - \alpha . e^{\theta\sqrt{-1}}\right)^{-\frac{1}{2}}\left(1 - \alpha e^{-\theta\sqrt{-1}}\right)^{-\frac{1}{2}},$$

on a

$$2b^{(i)}_{\frac{1}{2}} = \frac{1.3\ 5.\ \ (2i-1)}{2\ 4.6\ ..2i}\ \alpha^i\left[1+\frac{2i+1}{2i+2}\ \frac{1}{2}\ \alpha^2+\frac{\overline{2i+1}\ \overline{2i+3}}{\overline{2i+2}\ \overline{2i+4}}\ \frac{1\ 3}{2.4}.\alpha^4+\text{etc.}\right].$$

Considérons $b^{(i)}_{\frac{1}{2}}$ comme fonction de i et de α, et développons cette fonction suivant les puissances descendantes de i. Le premier terme du facteur

$$1 + \frac{2i+1}{2i+2}.\frac{1}{2}.\alpha^2 + \frac{\overline{2i+1}.\overline{2i+3}}{\overline{2i+2}\ \overline{2i+4}}.\frac{1\ 3}{2.4}\alpha^4 + \text{etc},$$

est

$$1 + \frac{1}{2}.\alpha^2 + \frac{1\ 3}{2.4}.\alpha^4 + \text{etc.},$$

ou

$$(1 - \alpha^2)^{-\frac{1}{2}}.$$

Le premier terme du facteur

$$\frac{1\ 3\ 5\ .\ \ (2i-1)}{2\ 4.6\ .\ \ 2i},\ \text{ou}\ \ \frac{1\ 2\ 3\ .\ \ 2i}{2^{2i}(1\ 2\ 3\ \ i)^2}$$

développé suivant les puissances descendantes de i, peut être ainsi déterminé. On a par les théorèmes connus, pour le premier terme du produit, $1.2.3\ldots.2i$, la quantité

$$(2i)^{2i+\frac{1}{2}}.e^{-2i}.\sqrt{2\pi},$$

et pour le premier terme du produit $1.2\ldots i$, le terme

$$i^{i+\frac{1}{2}}.e^{-i}.\sqrt{2\pi};$$

le facteur précédent devient ainsi $\frac{1}{\sqrt{i\pi}}$. Le premier terme de la valeur de $b^{(i)}_{\frac{1}{2}}$ réduite en série par rapport aux puissances descendantes de i est donc

$$\frac{\alpha^i}{\sqrt{i\pi(1-\alpha)}},$$

mais par ce qui précède, ce premier terme est

$$\frac{\Pi.\alpha^i\sqrt{\pi}}{\sqrt{i(1-\alpha^2)}},$$

on a donc

$$\Pi=\frac{1}{i\pi},$$

et par conséquent,

$$b^{(i)}_{\frac{1}{2}}=\frac{\alpha^i}{\pi\sqrt{1-\alpha^2}}.\int\frac{(1-t^2)^{i-1}dt}{\sqrt{(1-t^2)\left(1+\frac{\alpha^2t^2}{1-\alpha^2}\right)}},$$

l'intégrale étant prise depuis t nul jusqu'à t égal à l'unité. α étant toujours moindre que l'unité, on voit que les valeurs de $b^{(i)}_{\frac{1}{2}}$ deviennent de plus en plus petites, et qu'ainsi la série du développement de $(1-2\alpha.\cos\theta+\alpha^2)^{-\frac{1}{2}}$, est très convergente.

De la grande inégalité de Jupiter et de Saturne

Il résulte du n° 65 du second Livre, qu'en considérant l'orbite troublée d'une planète, comme une ellipse variable, si l'on nomme ζ la longitude moyenne de Jupiter, ζ' celle de Saturne, l'expression différentielle des grands axes donne les deux équations différentielles

$$\frac{dd\zeta}{dt^2}=q.\sin(5\zeta'-2\zeta+A),$$
$$\frac{dd\zeta'}{dt^2}=q'.\sin(5\zeta'-2\zeta+A),$$

q, q', A étant fonctions des demi-grands axes des deux planètes, que nous désignerons par a pour Jupiter et par a' pour Saturne, des

excentricités et des inclinaisons des orbites, des longitudes des périhélies et des nœuds, enfin des époques de la longitude Nous regarderons ici ces quantités, comme constantes; ce qui, pour notre objet, peut être supposé sans erreur sensible. En faisant donc

$$V = 5\zeta' - 2\zeta + A,$$

nous aurons

$$\frac{d^2V}{dt^2} = (5q' - 2q) \sin V,$$

d'où l'on tire, en multipliant cette équation par dV et en l'intégrant,

$$\frac{dV}{dt} = \sqrt{c^2 - (10q' - 4q) \cos V},$$

c étant une constante arbitraire. Relativement à Jupiter et à Saturne, c est égal à $5n' - 2n$, nt et $n't$ étant les parties non périodiques de leurs longitudes moyennes

Si c^2 surpasse $(10q' - 4q)$ pris positivement, on pourra réduire en série convergente, la quantité sous le radical; et alors on obtient, pour Jupiter et Saturne, la valeur qui résulte des formules du sixième Livre Mais si c^2 est moindre que $10q' - 4q$ pris positivement; l'angle V ne peut plus croître indéfiniment, il ne peut qu'osciller autour de l'un de ces deux points, zéro et la demi-circonférence. Ce changement de révolution en oscillation, aura lieu si, en faisant varier n et n' de δn et $\delta n'$, on a

$$5n' - 2n + 5\,\delta n' - 2\delta n = \sqrt{10q' - 4q},$$

la quantité sous le radical étant prise positivement. Cette quantité peut être supposée sensiblement la même pour toutes les valeurs de δn et $\delta n'$, pourvu qu'elles soient fort petites relativement à n et n', parce que les demi-grands axes a et a' dont q et q' dépendent, restent alors à très peu peu près les mêmes. Les deux grandes inégalités de Jupiter et de Saturne sont à fort peu près,

$$\frac{-q}{(5n' - 2n)^2} \cdot \sin V, \quad \frac{-q'}{(5n' - 2n)^2} \cdot \sin V$$

Dans les dernières tables de M. Bouvard, ces inégalités sont en secondes centésimales,

$$3662'',4 \cdot \sin V, \quad -8895'',7 \cdot \sin V,$$

ce qui donne

$$q = -(5n' - 2n)^2 . 3662'',4 ; \quad q' = (5n' - 2n)^2 . 8875'',7.$$

En réduisant les arcs, en parties du rayon; on a

$$\sqrt{10q' - 4q} = (5n' - 2n) . 0,4042 ;$$

les deux limites de l'oscillation de $\frac{dV}{dt}$ sont donc

$$\pm (5n' - 2n) . 0,4042$$

Pour que la valeur de $\frac{dV}{dt}$ soit comprise dans ces limites, il faut que l'on ait

$$5n' - 2n + 5\delta n' - 2\delta n' < 0,4042 . (5n - 2n) ;$$

ce qui commence à exister, lorsque l'on a

$$5\delta n' - 2\delta n = -0,5958 . (5n' - 2n).$$

Alors le moyen mouvement de Saturne deviendrait exactement les deux cinquièmes de celui de Jupiter. Si l'on fait δn égal à $\delta n'$, l'équation précédente donne

$$\delta n' = -\frac{0,5958}{7} . (5n' - 2n)$$

Or on a à fort peu près, $5n' - 2n = \frac{n'}{30}$, on aura donc

$$\frac{\delta n'}{n'} = -\frac{0,5958}{210}$$

On a, par les lois de Képler, $\frac{\delta n'}{n'} = -\frac{3}{2} . \frac{\delta a'}{a'}$; on aura ainsi

$$\delta a' = \frac{a'}{530} ;$$

et comme on a supposé $\delta n = \delta n'$, on aura

$$\delta a = \frac{a}{1320}.$$

Il eût donc suffi de faire varier de ces petites fractions, les distances moyennes de ces deux planètes au Soleil, pour rendre leurs moyens mouvemens commensurables La détermination de V aurait alors présenté des difficultés, mais il est inutile de nous en occuper.

Sur la détermination des orbites des comètes par les observations

5 J'ai donné dans les n°s 28 et suivans du second Livre, une nouvelle méthode pour déterminer les orbites des comètes Elle consiste à déterminer par les observations, en partant d'une époque fixe, la longitude et la latitude géocentriques de la comète, et leurs premières et secondes différences, divisées par les puissances correspondantes de l'élément dt du temps supposé constant On conclut ensuite rigoureusement, des équations différentielles du mouvement de la comète, sa distance périhélie et l'instant de son passage par le périhélie. Pour obtenir avec plus de précision, les données dont je viens de parler, j'avais proposé d'employer plus de trois observations, en ayant soin d'augmenter l'intervalle des observations extrêmes, en raison du nombre des observations employées. Mais indépendamment de la longueur du calcul, les erreurs des observations nuisent à l'exactitude que l'on peut attendre de la multiplicité des observations; et il me paraît préférable de n'en employer que trois, en fixant l'époque, à l'observation intermédiaire, et en prenant les observations extrêmes, assez peu distantes entre elles pour que dans l'intervalle qui les sépare, les données précédentes puissent être supposées à fort peu près les mêmes

Soient $\alpha_{,}$, α, α' les longitudes géocentriques de la comète, dans la première, dans la seconde et dans la troisième observation Soient $\theta_{,}$, θ et θ' les latitudes géocentriques, correspondantes Désignons par ι l'intervalle de la première à la seconde observation, et par ι' l'intervalle de la seconde observation à la troisième Prenons pour époque la seconde observation, et désignons par a, b, h, l, les quatre différentielles $\frac{d\alpha}{dt}$, $\frac{dd\alpha}{dt^2}$, $\frac{d\theta}{dt}$, $\frac{dd\theta}{dt^2}$ Nous aurons par les formules connues, les quatre équations,

$$\alpha - \alpha_{,} = \iota a - \frac{\iota^2}{2} b; \quad \theta - \theta_{,} = \iota h - \frac{\iota^2}{2} . l,$$

$$\alpha' - \alpha = \iota' a + \frac{\iota'^2}{2} \cdot b, \quad \theta' - \theta = \iota' h + \frac{\iota'^2}{2} \cdot l$$

On doit observer ici, que les intervalles ι et ι' sont égaux aux produits du nombre des jours qu'ils comprennent, par l'arc que la Terre décrit dans un jour, en vertu de son mouvement moyen En supposant donc que dans les équations précédentes, ι et ι' soient ces nombres de jours, ces équations donneront, en y changeant a, b, h, l, en a', b', h', l', les valeurs de ces dernières quantités, en secondes Si elles sont sexagésimales, on aura les logarithmes de a et de h, en retranchant des logarithmes des nombres de secondes contenues dans a' et h', le logarithme 3,5500072 On aura les logarithmes de b et l, en retranchant des logarithmes des nombres de secondes contenues dans b' et l', le logarithme 1,7855874

On déterminerait avec plus d'exactitude, les quatre inconnues a, b, h et l, en employant d'autres observations, pourvu qu'elles soient comprises entre les deux observations extrêmes précédentes On aura, par ce qui précède, les équations relatives aux observations ajoutées On formera ensuite, de toutes ces équations, par la méthode la plus avantageuse, quatre équations finales qui détermineront les inconnues a, b, h et l. Cela posé, les équations (1), (2), (3) et (4) du n° 36 du second Livre, donnent les suivantes

$$r^2 = \frac{x^2}{\cos^2\theta} - 2Rx \cdot \cos(\odot - \alpha) + R^2; \qquad (a)$$

$$ay = \frac{1}{2} R \cdot \sin(\odot - \alpha)\left(\frac{1}{r^3} - \frac{1}{R^3}\right) - \frac{1}{2} bx, \qquad (a')$$

$$hy = -x\left(h^2 \cdot \operatorname{tang}\theta + \frac{1}{2} l + \frac{1}{2} a^2 \cdot \sin\theta \cdot \cos\theta\right), \qquad (a'')$$
$$+ \frac{1}{2} R \cdot \sin\theta \cdot \cos\theta \cdot \cos(\odot - \alpha)\left(\frac{1}{R^3} - \frac{1}{r^3}\right),$$

$$0 = \frac{y^2}{\cos^2\theta} + a^2x^2 + \frac{h^2x^2}{\cos^4\theta} + \frac{2hyx \operatorname{tang}\theta}{\cos^2\theta}$$
$$+ 2y\left[\frac{\sin(\odot - \alpha)}{R} - (R' - 1)\cos(\odot - \alpha)\right], \qquad (a''')$$
$$- 2ax\left[(R' - 1)\sin(\odot - \alpha) + \frac{\cos(\odot - \alpha)}{R}\right]$$
$$+ \frac{1}{R^2} - \frac{2}{1}$$

Ces équations sont relatives au mouvement parabolique, r est le rayon vecteur de la comète, au moment de l'observation prise pour époque, R, est le rayon vecteur de la Terre, sa moyenne distance au Soleil étant prise pour unité, ○ est la longitude du Soleil, à l'instant de l'époque, R′ est le rayon vecteur de la Terre, lorsqu'on augmente ○ d'un angle droit, α et θ sont les longitudes et les latitudes géocentriques de la comète au moment de l'époque, x est la distance de la comète au centre de la Terre, projetée sur le plan de l'écliptique Enfin y désigne $\frac{dx}{dt}$

Il y a, comme on voit, plus d'équations que d'inconnues; ce qui doit avoir lieu dans le mouvement parabolique, en vertu de la supposition du grand axe infini, il faut donc alors ou choisir entre les deux équations (a') et (a''), ou les combiner de la manière la plus avantageuse. J'avais proposé dans le second Livre, d'employer l'équation (a'), ou l'équation (a''), selon que b est plus grand ou plus petit que l. Mais depuis, m'étant fort occupé de l'influence des erreurs des observations, sur leurs résultats, j'ai reconnu que le moyen le plus propre à diminuer ici cette influence, consiste à combiner ces équations, en multipliant l'équation (a') par a, l'équation (a'') par h, et en ajoutant ces produits; ce qui donne l'équation suivante.

$$y = \left\{ \begin{array}{l} \dfrac{[a \sin(\bigcirc - \alpha) - h \sin\theta \quad \cos\theta \cos(\odot - \alpha)]}{2(a^2 + h^2)} . \mathrm{R} \left(\dfrac{1}{r^3} - \dfrac{1}{\mathrm{R}^3}\right) \\ \qquad \dfrac{- x(h^3 \quad \tang\theta + \frac{1}{2} ab + \frac{1}{2} hl + \frac{1}{2} a^2 h \quad \sin\theta \quad \cos\theta)}{a^2 + h^2} \end{array} \right\} . \quad (a^{\text{IV}})$$

On combinera donc cette équation avec les équations (a) et (a'''), pour avoir les valeurs de x, y, r. On fera une première supposition pour x, et l'équation (a) donnera la valeur correspondante de r, ensuite l'équation (a^{IV}) donnera la valeur de y. Ces valeurs substituées dans l'équation (a''') doivent y satisfaire, si la valeur de x a été bien choisie Si cette équation n'est pas satisfaite, on prendra une seconde valeur de x; et ainsi de suite Quelques essais feront bientôt connaître la vraie valeur de x. On en conclura, comme dans le n° 36 du second Livre, la distance périhélie, et l'instant du passage de la comète par le périhélie. On formera la quantité

$$\frac{\lambda}{\cos^2\theta}(y + hx.\tang\theta) - Ry.\cos(\odot - \alpha)$$
$$+ x\left[\frac{\sin(\odot - \alpha)}{R} - (R' - 1)\cos(\odot - \alpha)\right] - Rax.\sin(\odot - \alpha)$$
$$+ R.(R' - 1)$$

En désignant par P cette quantité, et par D la distance périhélie; on aura

$$D = r - \tfrac{1}{2}P^2,$$

le cosinus de l'anomalie que nous nommerons v, sera donné par l'équation

$$\cos^2\tfrac{1}{2}v = \frac{D}{r},$$

et l'on en conclura par la table du mouvement des comètes, le temps employé à parcourir l'angle v En ajoutant ce temps à l'époque, ou en l'en retranchant suivant que P est négatif ou positif, on aura l'instant du passage au périhélie

Ayant ainsi à peu près la distance périhélie de la comète, et l'instant de son passage au périhélie, on les corrigera par la méthode du n° 36 du second Livre

Pour faciliter l'usage de la méthode précédente, je vais présenter ici l'application que M. Bouvard en a faite à la comète que l'on observe maintenant.

On a choisi les trois observations suivantes évaluées en mesures sexagésimales et en temps moyen à Paris, compté de minuit

Août 1824.

	Longitudes observées.	Latitudes observées
$16^j,90801$	$\alpha_1 = 237°29'\ 3''$	$\theta_1 = 55°18'42''$ Bor.
$22^j,90153$	$\alpha = 230°31'33''$	$\theta = 57°42'22''$ Bor
$28^j,87972$	$\alpha' = 224°\ 6'30''$	$\theta' = 59°33'58''$ Bor

En prenant pour époque moyenne, l'observation du 22 août, les nombres de jours i et i' seront

$$i = 5^j,99352, \qquad i' = 5^j,97819$$

On aura ainsi, relativement à la longitude, les deux équations

$$5,99352 \,.\, a' - 17,96115 \,.\, b' = -6^\circ,95834;$$
$$5,97819 \,.\, a' + 17,86938 \,.\, b' = -6^\circ,41750$$

La résolution de ces équations donne

$$a' = -4021'',807, \quad b' = 52'',6188$$

En retranchant du logarithme du nombre de secondes de cette valeur de $-a'$, le logarithme constant 3,5500072, on aura pour le logarithme de la valeur de $-a$, 0,0544141 Retranchant du logarithme du nombre de secondes de cette valeur de b', le logarithme constant $\bar{1}$,7855874, on aura, pour le logarithme de la valeur de b, $\bar{1}$,9355515 α est ici 230° 31′ 33″.

En considérant d'une manière semblable les équations relatives à la latitude, on formera les équations

$$5,99352 \,.\, h' - 17,96115 \,.\, l' = 2^\circ,39445,$$
$$5,97819 \,.\, h' + 17,86938 \,.\, l' = 1^\circ,85999,$$

d'où l'on tire

$$h' = 1278'',9414, \quad l' = -53'',1516,$$

ce qui donne pour les logarithmes de h et de $-l$,

$$\bar{1},5568434, \quad \bar{1},9399266,$$

et l'on a $\theta = 57^\circ\, 42'\, 22''$.

Pour donner un exemple de la manière d'employer plus de trois observations, on a considéré les observations du 20 et du 25 août, qui donnent

Temps moyen	Longitude observée	Latitude observée	
20j,93635	232° 44′56″	56° 59′ 5″.	Bor
25j,90792	227° 13′38″	58° 42′11″.	Bor

On a formé les quatre équations suivantes relatives à la longitude

$$5,99352 \,.\, a' - 17,96115 \,.\, b' = -6^\circ,95834,$$
$$1,96518 \,.\, a' + 1,93097 \,.\, b' = -2^\circ,22305,$$

$$3{,}00639 \,.\, a' + 4{,}51919 \,.\, b' = -3^\circ{,}29862,$$
$$5{,}97819 \,.\, a' + 17{,}86938 \,.\, b' = -6^\circ{,}41750$$

Pour réduire ces équations, à deux équations finales, on a multiplié chacune de ces équations par son coefficient de a', et l'on a ajouté ces produits, ce qui a donné, pour première équation,

$$+ 84{,}56138 \,.\, a' + 8{,}96778 \,.\, b' = -94^\circ{,}35563$$

On a multiplié chacune des mêmes équations par son coefficient de b' et l'on a ajouté les produits, ce qui a donné, pour équation finale,

$$8{,}96778\, a' + 666{,}06906 \,.\, b' = -0^\circ{,}31145$$

De ces deux équations finales, on a conclu, comme ci-dessus,

$$\log - a = 0{,}0544923; \quad \log b = \bar{1}{,}9343631.$$

Ces valeurs diffèrent très peu des précédentes. La valeur de α est la même que ci-dessus

En opérant d'une manière semblable sur les latitudes, on a trouvé

$$\log h = \bar{1}{,}5563862, \quad \log - l = \bar{1}{,}9397564.$$

La valeur de θ est la même que ci-dessus

Ayant ainsi les valeurs de α, a, b, θ, h, l, on les a substituées dans les équations (a), (a^{IV}), (a''''), en observant qu'à l'époque de l'observation du 22 août, on a

$$\begin{aligned} \odot &= 149^\circ\, 38'\, 37'', \\ \log \mathrm{R} &= 0{,}0046329, \\ \log (1 - \mathrm{R}') &= \bar{2}{,}1097810 \end{aligned}$$

On a formé ainsi les trois équations suivantes,

$$r^2 = 3{,}50341 \,.\, x^2 - 0{,}32033\, x + 1{,}021565,$$
$$y = 0{,}32913 \,.\, x + \frac{0{,}39060}{r^3} - 0{,}37830,$$
$$0 = 3{,}50341 \,.\, y^2 + 3{,}99184 \,.\, xy + 2{,}87655 \,.\, x^2 - 1{,}945969 \,.\, y$$
$$+ 0{,}38431 \,.\, x - \frac{2}{r} + 0{,}97889$$

On a trouvé après un petit nombre d'essais

$$x = 0{,}41331\,; \quad y = -\,0{,}026789, \quad r = 1{,}21970,$$

d'où l'on a conclu

$$P = -\,0{,}577229\,;$$

et la distance périhélie, égale à 1,053095; ce qui a donné pour l'instant du passage au périhélie, sept. $29^j{,}10239$, temps moyen compté de minuit à Paris.

Les valeurs précédentes de a, b, h, l, relatives à trois observations, ont donné la distance périhélie égale à 1,053650, et pour l'instant du passage, sept. $29^j{,}04587$, ce qui diffère peu des résultats fondés sur cinq observations.

FIN DU LIVRE XV.

LIVRE XVI.

DU MOUVEMENT DES SATELLITES

DU MOUVEMENT DE LA LUNE.

CHAPITRE Ier.

Notice historique des travaux des Géomètres et des Astronomes sur cet objet.

1. Les Chaldéens ont connu l'accélération du mouvement de la Lune, lorsqu'elle va de son apogée à son périgée, et sa diminution, en allant du périgée à l'apogée Ils supposaient cette accélération et cette diminution, constantes et de 18′ sexagésimales par jour, ce qui répond à une équation du centre d'environ 4° 7′. Nous ignorons l'inclinaison qu'ils supposaient à l'orbite lunaire. Ils avaient reconnu par les observations des éclipses, les mouvemens des nœuds et de l'apogée de cette orbite; et ils avaient formé la période remarquable de 6585^{j} $\frac{1}{3}$, pendant lesquels la Lune fait 223 révolutions à l'égard du Soleil, 239 révolutions anomalistiques, et 241 révolutions par rapport à ses nœuds. Ils ajoutaient $\frac{4}{135}$ de la circonférence, à dix-huit circonférences, pour avoir le mouvement sidéral du soleil dans cet intervalle, ce qui suppose l'année sidérale de 365^{j} $\frac{1}{4}$, la même que l'année tropique admise par les plus anciens astronomes. Il paraît donc que la précession des équinoxes était inconnue aux Chaldéens

Hypparque perfectionna la période Chaldéenne, en la comparant à

un grand nombre d'éclipses. Il fixa l'inclinaison de l'orbite de la Lune et son équation du centre, à 5 degrés dans ces phénomènes. Mais il remarqua que cette équation ne représentait point dans les quadratures, ses observations qui offraient alors de grandes anomalies. Ptolémée suivant avec soin ces anomalies, fut conduit à la découverte de l'inégalité lunaire que l'on nomme *évection*, dont il détermina la valeur avec beaucoup d'exactitude.

Les astronomes n'ajoutèrent rien à la théorie de la Lune de Ptolémée, jusqu'à Ticho-Brahé qui, en comparant cette théorie avec ses observations de la Lune dans les octans, reconnut l'inégalité de la variation dont le *maximum* correspond à ces points. L'exactitude de ces observations lui fit encore reconnaître que l'équation du temps propre au Soleil, n'était point applicable sans correction à la Lune, et qu'il fallait, pour ce dernier astre, la corriger d'une quantité dépendante de l'anomalie du Soleil. Les astronomes ont ensuite appliqué cette correction au mouvement de la Lune, en donnant à cet astre la même équation du temps qu'à tous les autres; ce qui ajoute à son mouvement, l'inégalité connue sous le nom d'*équation annuelle*. On supposait avant Ticho-Brahé, l'inclinaison de l'orbite lunaire, constante; et le mouvement de ses nœuds, uniforme. Ce grand astronome dut encore à la bonté de ses observations, la connaissance des deux inégalités principales de ces élémens, d'où résulte la principale inégalité de la Lune en latitude.

Tel était l'état de la théorie de la Lune, lorsque Newton entreprit d'appliquer à cette théorie, le principe de la pesanteur universelle. Il publia ses recherches sur cet objet, dans le troisième livre des Principes mathématiques de la Philosophie naturelle; et je n'hésite point à les regarder comme une des parties les plus profondes de cet admirable ouvrage (*). Newton n'a point rattaché à son principe, la plus grande des inégalités lunaires, l'*évection* qu'il considérait avec Horox, comme le résultat de deux inégalités, l'une dans l'excentricité de l'orbite, l'autre dans le mouvement de l'apogée. On voit cependant qu'il avait essayé de déterminer ces inégalités, ainsi que le moyen

(*) On voit dans la correspondance de Newton avec Halley, que Newton fatigué de ses querelles avec Hooek, voulait supprimer ce troisième Livre. Mais heureusement pour les progrès de l'Astronomie, cédant aux instances de Halley, il consentit à le publier.

mouvement de l'apogée; mais ces essais ne l'ayant point satisfait, il s'abstint de les publier. En effet, la détermination de ce mouvement a présenté aux géomètres de grandes difficultés.

Newton a été plus heureux par rapport à la variation. Pour l'obtenir, il détermine d'abord les forces dont la Lune est sollicitée par l'action du Soleil dans son mouvement relatif autour de la terre. En faisant ensuite abstraction de l'excentricité et de l'inclinaison de l'orbe lunaire, il cherche la variation de l'aire décrite par le rayon vecteur de la Lune, pendant l'élément de temps, supposé constant; il obtient la loi de cette variation depuis la syzygie jusqu'à la quadrature. Les carrés des vitesses de la Lune dans ces deux points sont, en négligeant le carré de la force perturbatrice, comme les carrés des aires instantanées, divisés respectivement par les carrés des rayons vecteurs. Les carrés des vitesses, divisés par les rayons de courbure, sont égaux aux forces centrifuges correspondantes. Aux deux points de la syzygie et de la quadrature, ces forces sont dirigées suivant les rayons vecteurs, et elles sont égales et contraires aux forces lunaires décomposées suivant la direction de ces rayons.

De là, Newton déduit le rapport des rayons de courbure aux mêmes points, en fonction des rayons vecteurs correspondans. Pour avoir un second rapport, Newton considère l'orbite de la Lune, comme une ellipse mobile dont la Terre occupe le centre, et dont le périgée suit le Soleil de manière que le petit axe de l'ellipse correspond toujours à la syzygie, et le grand axe, à la quadrature. Cette considération est exacte, mais elle exigeait une démonstration. C'est ainsi que Newton dans sa théorie de la figure de la Terre, a supposé sans démonstration, que les méridiens sont elliptiques. Ces hypothèses de calcul fondées sur des aperçus vraisemblables sont permises aux inventeurs, dans des recherches aussi difficiles, mais étant liées mathématiquement au principe que l'on veut établir, on peut toujours craindre, tant que cette liaison n'est pas démontrée, qu'elles ne soient contradictoires à ce principe. Newton détermine par sa méthode des fluxions, les rayons de courbure de l'orbite de la Lune, lorsque cet astre parvient aux extrémités des axes de l'ellipse mobile; ce qui lui donne un second rapport de ces rayons, en fonction des axes et par conséquent des rayons vecteurs correspondans à la syzygie et à la quadrature. En égalant ce rapport, au précédent; il obtient le rapport des deux axes de l'ellipse,

qu'il trouve être celui de 69 à 70. Ce rapport donne le rayon vecteur de l'ellipse dans un point quelconque, en divisant donc l'expression de la variation instantanée de l'aire, par le carré de ce rayon, on a la différentielle de la longitude vraie de la Lune, et en intégrant, on obtient cette longitude et par conséquent l'inégalité de la variation.

Le procédé de Newton, quoique moins direct, conduit au même résultat qui lui donne l'inégalité de la variation, égale à 35′ 10″ sexagésimales dans son *maximum*; ce qui est à très peu près, conforme aux observations.

Cette méthode de Newton est fort ingénieuse, et l'on verra dans le chapitre suivant, qu'en la traduisant en analyse, elle conduit facilement aux équations différentielles du mouvement lunaire.

Newton considère ensuite le mouvement du nœud ascendant, et la variation de l'inclinaison de l'orbite lunaire. Pour cela, il décompose l'action perturbatrice du Soleil sur la Lune, en deux forces. l'une est dirigée vers le centre de la Terre, et par conséquent étant dans le plan de l'orbite, elle ne dérange point la position de ce plan. l'autre force est parallèle à la ligne menée du Soleil à la Terre, et dérange le plan de l'orbite. Newton la compose avec le mouvement de la Lune à la fin d'un instant, et faisant passer un plan par la résultante et par le centre de la Terre, il détermine la position de ce plan qui devient celui de l'orbite lunaire dans l'instant suivant. Il trouve ainsi le mouvement horaire du nœud, égal au produit d'un facteur à très peu près constant, par le mouvement horaire de la Lune, par le produit des sinus des deux angles qui expriment les distances du Soleil au nœud, et du nœud à la Lune, et par le cosinus de la distance de la Lune au Soleil. En changeant dans cette fonction, le mouvement horaire de la Lune, dans la différentielle de ce mouvement; en développant en cosinus simples, le produit des sinus et des cosinus, et ensuite en intégrant; on a facilement l'expression du moyen mouvement du nœud, et ses inégalités. Ce procédé n'était point au dessus de l'analyse connue de Newton; mais il ne l'a point donné, soit qu'alors on ne fût point familiarisé avec les développemens en sinus et cosinus simples, des produits de sinus et de cosinus, et avec l'intégration de leurs différentielles; soit que Newton s'étant proposé d'exposer toutes ses théories sous une forme synthétique, ait cherché les moyens d'y parvenir par la synthèse, soit enfin qu'ayant trouvé ses résultats par l'a-

nalyse, il les ait traduits synthétiquement; ce qu'il paraît avoir fait dans plusieurs cas. La manière dont il a déterminé le mouvement moyen du nœud, et son inégalité principale, quoique compliquée, est exacte et ingénieuse. Newton observe que dans le cours de chaque mois, le mouvement du nœud s'accélère et se ralentit de manière qu'il a rétrogradé à la fin du mois, d'une quantité dépendante seulement de sa distance au Soleil. Il parvient ainsi à séparer dans l'expression du mouvement horaire du nœud, ce qui est indépendant de la position de la Lune dans son orbite, de ce qui en dépend. Cette dernière partie ne devant produire que des inégalités dont la période est à peu près d'un demi-mois, et qui disparaissent de l'expression de la latitude, en se combinant avec les inégalités correspondantes de l'inclinaison; Newton la néglige et ne considère que la première partie du mouvement horaire du nœud. Il en conclut par des considérations géométriques et par la quadrature des courbes, le moyen mouvement annuel du nœud et son inégalité principale dont l'argument est le double de la distance du Soleil au nœud. Il obtient de la même manière l'inégalité principale de l'inclinaison, qu'il trouve conforme ainsi que l'inégalité du nœud, à celles que Tycho-Brahé avait déduites de ses observations.

Tels sont les résultats dont Newton dans la première édition de son ouvrage des Principes, a donné les démonstrations auxquelles il n'a rien changé dans les éditions suivantes. Il y a seulement ajouté quelques équations qu'il dit avoir déduites de sa théorie de la gravité, mais sans en donner les démonstrations. De ce nombre est l'équation annuelle de la Lune, pour laquelle il se contente d'observer que l'orbe lunaire se dilate par l'action du Soleil dans son périhélie, et se contracte par la diminution de cette action dans l'aphélie, et que la Lune se mouvant avec plus de lenteur, dans un orbe plus dilaté, son mouvement doit retarder, lorsque le Soleil est plus près de la terre, et s'accélérer, lorsque cet astre est plus éloigné; d'où résulte dans le mouvement lunaire, une inégalité annuelle de signe contraire à celle du Soleil, et dont il trouve une valeur conforme aux observations. Newton donne encore sans démonstration, quelques autres inégalités. Mais l'analyse peut seule conduire à la détermination exacte de toutes les inégalités lunaires. Il fallait sans doute, une force d'esprit extraordinaire, pour obtenir sans son secours, les résultats auxquels Newton est

parvenu, et qui, quoique incomplets, suffisent pour établir que l'attraction du Soleil sur la Lune et sur la Terre, est la vraie cause de toutes les anomalies du mouvement de la Lune.

Un avantage immense de la théorie et des aperçus de Newton sur ce mouvement, a été la formation de nouvelles tables de la Lune, tables qui par l'application de l'analyse à cette théorie, ont acquis le haut degré de perfection nécessaire aux besoins de la Navigation et de la Géographie.

En 1747, Clairaut et d'Alembert présentèrent à l'Académie des Sciences, les équations différentielles du mouvement d'un corps attiré par deux autres, et leurs méthodes pour intégrer ces équations, lorsque la force principale qui sollicite le corps est fort supérieure aux forces perturbatrices, ce qui est le cas de la Lune et des planètes. Ces deux illustres géomètres firent une application spéciale de leurs analyses, au mouvement de la Lune, et ils en conclurent avec une grande facilité, non-seulement l'inégalité de la variation, que Newton avait obtenue d'une manière compliquée, quoique fort ingénieuse, mais encore l'évection qu'il avait tenté inutilement de rattacher à cette théorie, l'équation annuelle et beaucoup d'autres inégalités.

Dans le calcul des perturbations du mouvement de la Lune en longitude Clairaut considère l'orbite comme située dans le plan de l'écliptique; il donne une expression élégante et simple du rayon vecteur de la Lune. La première partie de cette expression, indépendante de la force perturbatrice, est la valeur elliptique qui sans cette force subsisterait seule. L'autre partie dépend de cette force, et renferme deux intégrales qui ne peuvent être rigoureusement déterminées qu'autant que l'on connaît déjà le rayon vecteur Mais on peut les avoir d'une manière approchée, en substituant pour ce rayon, sa partie elliptique On obtient ainsi une valeur du rayon vecteur approchée aux quantités près de l'ordre du carré de la force perturbatrice. En substituant cette valeur dans les intégrales; on a une seconde valeur du rayon vecteur approchée aux quantités près de l'ordre du cube de la force perturbatrice, et ainsi de suite. Mais ce procédé introduit dans l'expression de ce rayon, des arcs de cercles qui la rendraient bientôt inexacte. Pour obvier à cet inconvénient, Clairaut rapporte la partie elliptique du rayon vecteur à un apogée mobile En substituant alors cette partie dans les intégrales, il n'a plus d'arcs de cercle; mais la valeur qu'il trouve pour le

rayon vecteur contient un terme elliptique relatif à un apogée immobile. En déterminant convenablement les constantes introduites par le calcul, il fait disparaître ce terme, et en comparant la valeur du rayon vecteur qu'il trouve ainsi, avec celle qu'il a supposée, il obtient le mouvement de l'apogée. Une première approximation ne lui donna que la moitié du mouvement observé.

Newton était déjà parvenu à ce résultat singulier, dans la proposition 45 du premier livre des Principes; mais dans la théorie de la Lune qu'il a donnée dans le troisième livre, il n'a point rappelé ce résultat qui pouvait paraître infirmer cette théorie, et qui, en effet, porta Clairaut à penser qu'elle devait être modifiée, en ajoutant à la loi de l'attraction, un terme proportionnel à une puissance de la distance inverse, supérieure au carré, terme qui, insensible pour les planètes, ne deviendrait sensible qu'à des distances peu considérables, telles que la distance de la Lune. Cette conclusion de Clairaut fut vivement attaquée par Buffon qui se fondait sur ce que les lois primordiales de la nature, devant être de la plus grande simplicité, leur expression ne doit dépendre que d'un seul module, et par conséquent, ne renfermer qu'un terme. Cette considération doit nous porter sans doute, à ne compliquer la loi de l'attraction que dans un besoin extrême; mais l'ignorance où nous sommes de la nature de cette force, ne nous permet pas de prononcer avec assurance sur la simplicité de son expression. Quoi qu'il en soit, le métaphysicien eut raison vis-à-vis du géomètre qui reconnut son erreur, et fit la remarque importante, qu'en poussant plus loin l'approximation, la loi de l'attraction newtonienne donne à fort peu près le mouvement de l'apogée. Ce résultat dont Clairaut fit part à l'Académie, le 17 mai 1749, dissipa tous les doutes sur la loi de l'attraction qu'Euler trompé par une erreur de calcul avait jugée contraire aux observations de Saturne, dans sa première pièce sur les mouvemens de cette planète et de jupiter.

Clairaut réunit les divers résultats de sa théorie de la Lune, dans une pièce qui remporta le prix proposé en 1750 par l'Académie des Sciences de Pétersbourg. Cette pièce imprimée d'abord en 1752 dans cette capitale, fut réimprimée à Paris en 1765, avec des additions et de nouvelles tables de la Lune déjà fort rapprochées des observations, et qui faisaient naître l'espoir que l'on parviendrait un jour à déduire de la théorie seule, des tables aussi parfaites qu'on puisse les désirer.

D'Alembert dans sa théorie de la Lune, choisit pour coordonnées, le rayon vecteur lunaire projeté sur le plan de l'écliptique, et le mouvement vrai de la Lune rapporté à ce plan. Il donne l'équation différentielle du second ordre, du rayon vecteur projeté, dans laquelle l'élément de la longitude vraie est supposé constant et l'expression de l'élément du temps est fonction de cette longitude Ces deux équations sont les mêmes que les deux premières des équations (L) du n° 1 du Livre VII Au lieu de la troisième de ces équations, qui détermine la latitude, d'Alembert emploie, comme Newton, les variations différentielles du mouvement du nœud et de l'inclinaison de l'orbite. Pour intégrer l'équation différentielle du rayon vecteur projeté, il ne rapporte point, comme Clairaut, la partie elliptique de l'expression de ce rayon, à un apogée mobile; mais il fait disparaître par un moyen ingénieux, l'arc de cercle qu'introduirait la supposition d'un apogée immobile, ce qui le conduit sans hypothèse, à la considération d'un apogée mobile. Une seconde approximation ayant presque doublé le mouvement de l'apogée donné par la première, et par là, ayant accordé la théorie avec l'observation; il était à craindre que les approximations suivantes ne détruisissent cet accord. Il devenait donc important de porter encore plus loin, ces approximations. C'est ce que d'Alembert a fait, et il a trouvé que la théorie se rapprochait ainsi de plus en plus de l'observation.

Peu de mois avant que Clairaut et d'Alembert présentassent à l'Académie des Sciences, leurs solutions du problème des trois corps; elle reçut la première pièce d'Euler sur Jupiter et Saturne, qui contient une solution du même problème, appliquée au mouvement de Saturne Ce grand géomètre fit paraître cette solution dans les Mémoires de l'Académie de Pétersbourg pour les années 1747 et 1748, et dans les Mémoires de l'Académie de Berlin pour 1750; et il en déduisit le mouvement du nœud de l'orbite lunaire, et les inégalités de son inclinaison à l'écliptique. Il publia en 1753, un ouvrage spécial sur la théorie de la Lune, dans lequel il prend pour coordonnées du mouvement lunaire, le rayon vecteur projeté sur l'écliptique, l'anomalie vraie, et au lieu de la latitude, il considère comme Newton, le mouvement du nœud et l'inclinaison de l'orbite.

On peut varier la solution du problème des perturbations lunaires, d'autant de manières qu'il y a de systèmes différens de coordonnées.

Mais un des points les plus importans de cette solution, est le choix du système qui donne les approximations les plus faciles et les plus convergentes, et qui fait le mieux démêler dans le nombre infini des inégalités de la Lune, celles qui peuvent devenir sensibles, en acquérant par les intégrations successives, de petits diviseurs. Je ne balance point à regarder le système de coordonnées dont j'ai fait usage dans le Livre VII, comme le plus avantageux sous ces rapports. La force perturbatrice du mouvement lunaire, dépend des sinus et cosinus de son mouvement vrai et de son élongation au Soleil; leur réduction en sinus et cosinus d'angles dépendans du mouvement moyen de la Lune, est pénible et peu convergente à cause de la grandeur de son équation du centre et de ses principales inégalités. Il y a donc de l'avantage à éviter cette réduction, et à déterminer d'abord la longitude moyenne en fonction de la longitude vraie; ce qui peut être utile dans le cas où l'on cherche le temps correspondant à la longitude vraie. On détermine ensuite par le retour des séries, la longitude vraie en fonction de la longitude moyenne; et l'on n'a point à craindre dans ce retour, le peu de convergence des approximations, que l'intégration des équations différentielles laisse toujours incertaine. A la vérité, il faut dans cette méthode, convertir le mouvement vrai du Soleil, en fonction de la longitude vraie de la Lune. Mais dans cette conversion, les grandes inégalités lunaires sont multipliées par le rapport du moyen mouvement du Soleil à celui de la Lune, ou par un treizième environ, ce qui les rend fort petites.

Mayer publia en 1753 dans les Mémoires de l'Académie de Gottingue, de nouvelles tables de la Lune: pour les former, après avoir reconnu par la théorie les argumens des diverses inégalités lunaires, il détermina leurs coefficiens par les observations. Il perfectionna ces tables et la théorie qui l'avait guidé, et il les adressa en 1755, au Bureau des Longitudes de Londres. Après sa mort arrivée en 1762, sa veuve envoya au même Bureau, une copie de ces tables encore perfectionnées; et Bradley les ayant comparées à beaucoup d'observations les trouva si exactes, qu'on leur adjugea un prix de trois milles livres sterlings. Elles ont été imprimées ainsi que la théorie de l'auteur, en 1765. Dans cette théorie, Mayer prend pour coordonnées de la Lune, son rayon vecteur, un angle dont la différentielle est proportionnelle à l'élément du temps, divisé par le carré du rayon vecteur; et la lati-

tude qu'il substitue au mouvement du nœud et à l'inclinaison de l'orbite, ce qui est plus direct et plus simple. Il a porté fort loin les approximations analytiques, et il a rectifié par les observations, les coefficiens déjà fort approchés par sa théorie, des diverses inégalités lunaires. Mason perfectionna ces tables, en les assujettissant à un très grand nombre d'observations de Bradley, et en leur ajoutant quelques inégalités indiquées par la théorie. La comparaison des observations avec ses tables lui donna une inégalité en longitude, proportionnelle au sinus de la longitude du nœud de l'orbite et dont il trouva le coefficient égal à 7",7 sexagésimales, inégalité que Mayer avait déjà reconnue, mais avec un coefficient plus petit et seulement de quatre secondes. Cette inégalité ne paraissant pas résulter de la théorie de l'attraction, fut négligée par les astronomes.

Les tables de Mayer rectifiées par Mason, ont servi pendant plusieurs années, au calcul des éphémérides destinées aux navigateurs. Mais elles laissaient à désirer des tables aussi parfaites, uniquement fondées sur la théorie. C'est ce qu'Euler tenta d'exécuter au moyen d'une nouvelle théorie de la Lune. Il y rapporte les coordonnées de la Lune, à un axe mu sur l'écliptique autour du centre de la Terre, d'un mouvement égal au moyen mouvement de la Lune, et il donne les équations différentielles des trois coordonnées orthogonales rapportées à cet axe mobile et au plan de l'écliptique. Il les intègre par des approximations convergentes, et il réduit en tables, leurs intégrales qui déterminent la position de la Lune à un instant quelconque. Mais ces tables étant moins commodes et moins précises que celles de Mason, les astronomes n'en ont point fait usage. Euler exposa sa nouvelle méthode dans deux pièces qu'il envoya à l'Académie des Sciences pour concourir aux prix qu'elle proposa sur la théorie de la Lune, en 1770 et en 1772 ; ensuite il la développa dans un traité spécial fort étendu.

Lagrange envoya à l'Académie, pour le concours au prix de 1772, une pièce dans laquelle il considère le mouvement de la Lune, sous un point de vue purement analytique. Il imagine trois corps qui s'attirent mutuellement, en raison de leurs masses, et réciproquement au carré de leurs distances. Ces corps forment un triangle variable, mobile autour de leur centre commun de gravité. Il donne les équations différentielles de chaque côté de ce triangle, et il en déduit la solution rigoureuse du problème des trois corps dans quelques cas particuliers. J'ai

développé et généralisé ces résultats, dans le chapitre VII du Livre X par une méthode fort simple et indépendante de toute intégration

Halley comparant entre elles, les observations anciennes d'éclipses, celles d'Albaténius, et les observations modernes, soupçonna le premier, l'accélération du moyen mouvement de la Lune Dunthorne, et Mayer ensuite, en confirmèrent l'existence, par une comparaison plus étendue des observations En supposant cette accélération proportionnelle au carré du temps, ils en fixèrent à 10″ sexagésimales, environ, la quantité pour le premier siècle, à partir de 1700 L'Académie des Sciences toujours animée du désir de perfectionner la théorie de la Lune, proposa pour le sujet du prix de Mathématiques de 1774, la cause de cette équation séculaire Elle couronna une pièce de Lagrange dans laquelle l'auteur détermine l'influence de la figure de la terre sur le mouvement de ce satellite il prouve que son équation séculaire ne peut en résulter Considérant ensuite que les géomètres avaient inutilement tenté de la déduire des attractions du Soleil et de la Terre supposés sphériques, il se crut d'autant plus fondé à la révoquer en doute, qu'il ne la jugea pas suffisamment établie par les observations. Mais son existence ne peut être contestée, surtout depuis la connaissance que M Caussin nous a donnée des observations arabes, par sa traduction d'une partie de l'Astronomie d'Ibn-Jounis, manuscrit de la bibliothèque de Leyde, que le Gouvernement Batave voulut bien confier à l'Institut de France.

L'Académie des Sciences ayant proposé pour le sujet du prix qu'elle devait décerner en 1762, la question de savoir si les planètes se meuvent dans un milieu dont la résistance produise quelque effet sensible sur leurs mouvemens, elle couronna une pièce de Bossut dans laquelle l'auteur établit que cette résistance doit être beaucoup plus sensible sur le moyen mouvement de la Lune, que sur celui des planètes; ce qui peut expliquer l'équation séculaire de la Lune. En réfléchissant sur la loi de l'attraction et sur la manière dont les géomètres l'avaient employée; j'observai qu'ils supposaient sa transmission d'un corps à l'autre, instantanée Je recherchai alors les effets qui pourraient naître d'une transmission successive je trouvai qu'elle devait produire une équation séculaire dans le mouvement de la Lune, et que pour satisfaire aux observations, la propagation de la force attractive de la Terre devait être huit millions de fois plus prompte que celle de la lumière.

Mais de nouvelles recherches sur cet important phénomène, me conduisirent enfin à sa véritable cause

En m'occupant de la théorie des satellites de Jupiter, je reconnus que la variation séculaire de l'excentricité de l'orbite de Jupiter devait produire des équations séculaires dans leurs mouvemens moyens. Je m'empressai de transporter ce résultat à la Lune, et je trouvai que la variation séculaire de l'excentricité de l'orbe terrestre produit dans le moyen mouvement de la Lune, l'équation séculaire déterminée par les astronomes Je trouvai de plus que la même cause produit dans les mouvemens du nœud et du périgée de l'orbite de la Lune, des équations séculaires. Je communiquai ces recherches à l'Académie des Sciences, le 19 novembre 1787 elles parurent en 1788 dans le volume de cette Académie pour l'année 1786 Je les ai perfectionnées dans le Livre VII, et j'ai trouvé que les termes qui dépendent du carré de la force perturbatrice et qui doublent le mouvement du périgée lunaire déterminé par une première approximation, augmentent presque dans le même rapport, l'équation séculaire de ce mouvement; en sorte que l'équation séculaire de l'anomalie moyenne est au moins quadruple de celle du moyen mouvement. Une équation aussi grande et dont l'effet sur la longitude de la Lune apogée ou périgee, est la moitié de l'effet de l'équation séculaire du moyen mouvement, doit être fort sensible dans les observations anciennes comparées à celles des Arabes et aux observations modernes C'est ce que je reconnus facilement, je trouvai même que les équations séculaires soit de la Lune, soit de son périgée, sont sensibles dans les moyens mouvemens de la Lune et du périgée, conclus par Hypparque et Ptolémée, des éclipses anciennes comparées avec elles-mêmes, en sorte que si l'on ne connaissait pas d'ailleurs l'époque où ces astronomes ont vécu, on pourrait la retrouver à un siècle ou deux près, par ces moyens mouvemens J'ai reconnu ainsi, que les tables de la Lune rapportées de l'Inde par Legentil, loin de remonter, comme Bailli le pensait, à trois mille ans avant notre ère, sont moins anciennes que les tables de Ptolémée

M. Bouvard a comparé avec ma théorie, toutes les observations anciennes et arabes, et un grand nombre d'observations modernes. Ce travail utile couronné en 1800 par l'Institut de France, ne laisse aucun doute sur l'existence des trois équations séculaires de la Lune et sur leur grandeur respective

L'Académie royale des Sciences de Stockholm proposa en 1787, pour le sujet du prix qu'elle devait décerner en 1791, la cause des équations séculaires de la Lune, de Jupiter et de Saturne Aucune pièce ne lui étant parvenue pour le concours; elle adjugea le prix à mes recherches qui depuis trois ans étaient publiées, et qui lui parurent contenir la solution complète de la question proposée. Ce prix décerné par une société savante aussi célèbre, me flatta d'autant plus, qu'il était inattendu.

La conformité de la théorie lunaire avec les observations, établit plusieurs points importans du système du monde On voit d'abord que la résistance des milieux éthérés et la transmission successive de la gravité, n'ont point d'influence sensible sur les équations séculaires de la Lune, puisque l'attraction seule des corps célestes suffit pour représenter les observations. D'ailleurs, l'équation séculaire du périgée, bien constatée par les observations, suffit pour exclure l'une et l'autre de ces causes; puisqu'elles ne produisent aucun mouvement dans le périgée. C'est ainsi que les phénomènes, en se développant, nous dévoilent leurs véritables causes. Nous sommes donc certains que les milieux éthérés, depuis les observations les plus anciennes, n'ont point sensiblement altéré les mouvemens des planètes, car leur résistance serait beaucoup plus sensible sur le mouvement de la Lune, où nous venons de voir qu'elle est insensible.

Nous avons dit que pour expliquer l'équation séculaire de la Lune au moyen de la transmission successive de la gravité, il fallait supposer la propagation de la force attractive, huit millions de fois plus prompte que celle de la lumière. Ainsi l'attraction des corps célestes représentant, au moins à très peu près, l'équation séculaire observée, nous pouvons en conclure que la vitesse de la force attractive surpasse cinquante millions de fois la vitesse de la lumière, on peut donc la supposer infinie

La constance de la durée du jour, élément essentiel de toutes les théories astronomiques résulte encore des équations séculaires de la Lune. Si cette durée surpassait maintenant, d'un centième de seconde centésimale, celle du temps d'Hypparque, la durée du siècle actuel serait plus grande qu'alors, de 365″,25. Dans cet intervalle, la Lune décrit un arc de 534″,6 centésimales. Le mouvement séculaire actuel de la Lune, en paraîtrait donc augmenté de cette quantité, ce qui, en supposant que cet accroissement ait été depuis Hypparque, propor-

tionnel au temps, augmenterait de 13″,51 centésimales, son équation séculaire pour le premier siècle à partir du commencement de 1801, et dont la valeur résultante des attractions célestes est d'environ 32″ Les observations ne permettent pas de supposer un accroissement aussi considérable Il est donc certain que depuis Hypparque, la durée du jour n'a pas varié d'un centième de seconde. Si par des causes quelconques inconnues, cette durée éprouvait quelque altération sensible, on le reconnaîtrait par le mouvement de la Lune dont les observations, d'ailleurs si utiles, acquièrent par cette considération, une nouvelle importance

Le moyen mouvement du périgée lunaire conclu de la théorie par une longue suite d'approximations, s'accorde tellement avec le mouvement observé, qu'à une distance même très petite par rapport aux distances des planètes au Soleil, la loi de l'attraction réciproque au carré des distances, si elle n'est pas rigoureuse, doit être au moins extrêmement approchée

Ma théorie de la Lune, exposée dans le Livre VII, se rapproche plus des observations, que celles qui l'avaient précédée Elle renferme quelques inégalités nouvelles telle est l'inégalité en latitude, dont l'argument est la longitude de la Lune Cette inégalité et celle en longitude dont l'argument est la longitude du nœud, et que Mayer avait soupçonnée par les observations, dépendent de l'aplatissement de la Terre Les comparaisons de leurs expressions analytiques avec un grand nombre d'observations, s'accordent à donner l'aplatissement $\frac{1}{305}$, le même à fort peu près, que les aplatissemens qui résultent des mesures des degrés et du pendule mais il a sur eux, l'avantage d'être indépendant des attractions locales qui les modifient En multipliant les observations lunaires propres à déterminer les inégalités dont il s'agit, on obtiendra l'aplatissement de la Terre avec une exactitude extrême.

Mayer avait déterminé la parallaxe solaire, en comparant aux observations, l'expression analytique de l'inégalité lunaire parallactique qui a pour facteur, cette parallaxe. J'ai mis un soin particulier à déterminer cette expression : en la comparant aux observations, elle donne la valeur de la parallaxe solaire qui résulte des passages de Vénus sur le Soleil, observés en 1761 et 1769. Une conséquence importante de cet accord, est que l'action du Soleil sur la Lune est à très peu près la même que son action sur la Terre, et que la différence, s'il y en a une, n'est pas la trois millionième partie de cette action

Newton chercha par l'expérience, à reconnaître si la pesanteur terrestre imprime en temps égal, la même vitesse à tous les corps placés au même lieu, quelle que soit leur nature. Pour cela, il mit successivement des corps de même poids et de diverse nature, dans une même boîte fermée qui terminait un pendule, et il les y plaça de manière que le centre d'oscillation fût toujours le même En faisant osciller le pendule, il observa la durée de ses oscillations, et il trouva cette durée la même pour tous ces corps; ce qui lui fit voir que l'action de la pesanteur donne à tous les corps, une vitesse égale dans le même temps, ou du moins que la différence, s'il y en a une, est au-dessous d'un millième. Ces expériences de Newton ont été répétées par divers physiciens, et les nombreuses expériences faites pour déterminer la longueur du pendule à secondes, ont établi avec une grande précision, que cette durée est indépendante de la nature du corps oscillant. En appellant donc *masses égales*, des masses qui se choquant avec des vitesses égales et contraires se feraient équilibre, deux corps de même poids, ou qui placés aux extrémités de deux bras égaux d'un levier droit se font équilibre, ont des masses égales; puisque la pesanteur tend à leur imprimer la même vitesse initiale.

En comparant le sinus verse de l'arc décrit par la Lune dans une seconde, avec l'espace que la pesanteur fait décrire aux corps terrestres dans la première seconde de leur chute; Newton reconnut que la pesanteur à la surface de la Terre, diminuée en raison du carré de la distance, est la force qui retient la Lune dans son orbite. La parallaxe lunaire que j'ai conclue de ce principe, s'accorde si bien avec la parallaxe observée; que l'on peut regarder comme nulle, ou du moins, comme insensible, la modification de l'action de la Terre sur la Lune, par la nature de la substance lunaire On peut conclure également de cet accord, que l'action de la Terre sur chaque molécule de la Lune, n'est point altérée par l'interposition des couches lunaires, car il est facile de prouver qu'une légère altération de ce genre, modifierait sensiblement le principe dont je viens de parler.

Newton étendit à l'attraction de tous les astres, la propriété dont jouit l'attraction terrestre, d'imprimer à tous les corps placés à la même distance, la même vitesse en temps égal Il démontra que relativement à l'attraction du Soleil sur les planètes, cette propriété résulte de la loi de Kepler suivant laquelle les carrés des temps des

révolutions des planètes sont comme les cubes de leurs moyennes distances au Soleil Il est facile, en effet, de voir que si les actions du Soleil sur la Terre et sur Mars différaient d'un millième, le rayon vecteur des Tables de Mars, en serait altéré d'un trois millième, ce qui serait très sensible dans les observations de cette planète en quadrature

On verra dans la suite, qu'une différence d'un millionième, dans les actions du Soleil sur la Terre et sur la Lune, changerait de plusieurs secondes, la parallaxe du Soleil, conclue de la comparaison de l'inégalité parallactique lunaire observée, avec sa valeur donnée par la théorie, et qui, comme je l'ai dit, s'accorde parfaitement avec les observations Il est donc bien prouvé que l'attraction du Soleil imprimerait en temps égal, la même vitesse à la Terre et à la Lune, placées à la même distance de cet astre. Cette attraction n'est donc point modifiée par la nature des substances qui composent la Terre et la Lune Si en pénétrant dans l'intérieur de ces corps, elle s'affaiblissait et s'éteignait comme la lumière en traversant l'atmosphère, cette extinction serait différente pour la Terre et pour la Lune, en vertu de la différence de leurs dimensions. Je trouve par un calcul fort simple, qu'une très petite extinction de l'attraction solaire produirait une différence sensible et inadmissible dans la valeur de l'inégalité parallactique Ainsi l'interposition des corps n'altère point l'attraction d'une molécule sur une autre, ce qui confirme ce que nous venons de dire sur cet objet.

Enfin, M. Bouvard ayant formé des tables très exactes de Jupiter et de Saturne, fondées sur la théorie que j'ai donnée de ces planètes, et les ayant comparées à un très grand nombre d'observations, a formé des équations de condition dans lesquelles il a pris pour indéterminées, les corrections des élémens elliptiques et des masses de Jupiter et de Saturne Il en a conclu la masse de Jupiter, qu'il a retrouvée la même que Newton avait déterminée par les élongations des satellites de Jupiter, mesurées avec beaucoup de précision par Pound Les grandes perturbations des mouvemens de Saturne et de Jupiter, prouvent donc que Jupiter agit sur Saturne, comme sur ses propres satellites. Ainsi la propriété d'attirer également tous les corps placés à la même distance appartient à chaque partie de la matière Les doutes qu'on a élevés sur cette propriété fondamentale de la loi d'attraction, ne paraissent donc point fondés. Cette loi que les géomètres ont essayé de modi-

fier, soit par rapport à son décroissement quand la distance augmente, soit relativement à la propagation instantanée de la force attractive, soit enfin par rapport à la nature des corps, est telle que Newton l'a proposée, ou du moins, les phénomènes n'y font reconnaître aucune modification sensible.

La théorie de la Lune nous donne encore par ses deux inégalités dépendantes de l'aplatissement de la Terre, le moyen le plus précis d'avoir cet aplatissement Ces inégalités étant le résultat de la tendance du centre de la Lune vers chaque molécule du sphéroïde terrestre, prouvent que les tendances des centres des corps célestes, les uns vers les autres, sont les résultantes des attractions réciproques de toutes leurs molécules

Désirant de voir toute l'Astronomie fondée sur la seule loi de l'attraction, n'emprunter des observations, que les données indispensables, j'obtins de l'Académie des Sciences, qu'elle proposerait pour le sujet du prix de Mathématiques qu'elle devait décerner en 1820, la formation par la seule théorie, de tables lunaires aussi exactes que celles qui ont été construites par le concours de la théorie et des observations Je désirais encore que mes résultats sur les inégalités séculaires de la Lune, fussent vérifiés et même perfectionnés par les géomètres Ces vœux ont été remplis par les deux pièces que l'Académie a couronnées L'une de M. Damoiseau, était accompagnée de tables lunaires qui comparées à un grand nombre d'observations, les ont représentées aussi bien que les meilleures tables employées par les astronomes. L'autre pièce dont MM Carlini et Plana sont les auteurs, est surtout remarquable par l'étendue et par la justesse de l'approximation avec laquelle ils ont déterminé les équations séculaires, et spécialement celle du périgée qu'ils ont trouvée plus grande encore que suivant ma formule.

M Burg, en comparant les moyens mouvemens de la Lune conclus des observations de Flamsteed, de Bradley et de Maskelyne, remarqua des différences qui lui parurent indiquer une inégalité à longue période. Il me fit part de cette remarque d'après laquelle je reconnus que l'action solaire produit une inégalité proportionnelle au sinus de la longitude du périgée lunaire, plus deux fois celle du nœud, moins trois fois la longitude du périgée solaire, et dont la période est d'environ 180 ans Son coefficient acquiert par l'intégration, un très petit diviseur, mais il a pour facteur, le produit de l'excentricité de

l'orbe lunaire, par le carré du sinus de son inclinaison à l'écliptique, par le cube de l'excentricité de l'orbe solaire et par la parallaxe du Soleil, il paraît donc devoir être très petit. Le grand nombre de termes dont il dépend, rend sa détermination par la théorie, presque impossible. M. Burg, en adoptant cette inégalité dans ses tables, détermina par les observations, son coefficient qu'il trouva d'environ 15″ sexagésimales. J'ai reconnu ensuite que l'ellipticité du sphéroïde terrestre, produit une inégalité dont la période est à peu près la même que la précédente, et qui est proportionnelle au cosinus de la longitude du périgée lunaire plus deux fois celle du nœud, moins la longitude du périgée solaire. Mais le coefficient de cette inégalité paraît être aussi petit que celui de l'inégalité dont je viens de parler. Enfin, j'ai trouvé que s'il existe une différence entre les deux hémisphères terrestres, elle doit produire une inégalité lunaire proportionnelle au cosinus de la longitude du périgée de la Lune, plus deux fois celle du nœud. J'avais indiqué cette inégalité à M. Burkhardt qui l'a employée dans ses tables, après avoir déterminé son coefficient par les observations. Mais en soumettant cette inégalité à l'analyse, j'ai vu qu'elle est insensible. Si les observations futures confirment cette anomalie du mouvement lunaire, il sera temps alors d'en rechercher la cause.

CHAPITRE II.

Sur la théorie lunaire de Newton.

2. Parmi les inégalités du mouvement de la Lune en longitude, Newton n'a développé que la *variation*. La méthode qu'il a suivie, me paraît être une des choses les plus remarquables de l'ouvrage des Principes. Je vais, en y appliquant l'analyse, montrer son analogie avec les méthodes actuelles, et faire voir qu'elle conduit aux équations différentielles du mouvement de la Lune, dont elle donne dans le cas de la variation les intégrales, d'une manière indirecte, mais très ingénieuse

Newton considère d'abord l'aire décrite par le rayon vecteur de la Lune, et pour simplifier le calcul, il fait abstraction de l'excentricité de l'orbe lunaire, et de son inclinaison à l'écliptique Il décompose l'action du Soleil sur la Lune, en deux forces, l'une parallèle au rayon vecteur de la Lune, l'autre parallèle au rayon vecteur de la Terre. Newton observe que la première de ces forces ne produit aucun changement dans l'aire que le rayon vecteur de la Lune trace autour de la Terre. En retranchant ensuite de la seconde force, l'action du Soleil sur la Terre que l'on regarde ici comme immobile, il décompose la différence, en deux forces, l'une dirigée suivant le rayon de l'orbe lunaire, l'autre perpendiculaire à ce rayon. Cette dernière force est la seule qui fasse varier l'aire décrite par le rayon vecteur de la Lune. Newton trouve pour son expression

$$3m^2 \,.\, \sin(v' - v) \,.\, \cos(v' - v),$$

m étant le rapport du moyen mouvement sidéral du Soleil, à celui de la Lune, ou du mois sidéral à l'année sidérale, v' est la longitude du Soleil, et v celle de la Lune. La force qui retient la Lune dans

son orbite, est prise pour unité de force, ainsi que le rayon moyen de l'orbite lunaire est pris pour unité de distance, ce qui donne la vitesse moyenne de la lune égale à l'unité de vitesse, puisqu'en vertu des théorèmes d'Huygens sur la force centrifuge, la force centrale de la Lune est égale au carré de sa vitesse divisé par le rayon de son orbite En multipliant l'expression précédente par l'élément dt du temps, la somme de tous les produits, correspondante à un temps quelconque, sera l'accroissement de vitesse, résultant de la force perpendiculaire au rayon En le multipliant par $\frac{1}{2}\,dv$, on aura aux quantités près de l'ordre du carré des forces perturbatrices, l'accroissement de l'aire décrite par le rayon vecteur de la Lune, pendant l'instant dt Newton détermine par un procédé particulier, la somme produit de dt, par la force

$$3m^2 \,.\, \sin(v' - v) \,.\, \cos(v' - v)$$

Cette somme est à fort peu près l'intégrale de la différentielle

$$3m^2 dv \,.\, \sin(mv - v) \,.\, \cos(mv - v),$$

en substituant mv pour v', ce que l'on peut faire, quand on néglige l'excentricité de l'orbe terrestre, et en mettant dv pour dt, la vitesse moyenne $\frac{dv}{dt}$ étant prise pour unité Cette intégrale prise depuis la quadrature où $v - mv$ est un angle droit, est

$$\frac{3m^2 \cos^2(v - mv)}{2(1 - m)}$$

Cette expression multipliée par $\frac{1}{2}\,dv$, donne l'accroissement de l'aire instantanée, égal à

$$\frac{3m^2 dv}{8(1 - m)} + \frac{3m^2 dv \cos(2v - 2mv)}{8(1 - m)},$$

ainsi la variation de cette aire est

$$\frac{3m^2 dv \cos(2v - 2mv)}{8(1 - m)}.$$

Cette variation est nulle dans les octans où par conséquent, l'aire instantanée a sa valeur moyenne en prenant pour unité cette valeur,

la valeur de l'aire instantanée sera dans les autres points de l'orbite,

$$1 + \frac{3m^2}{4(1-m)} \cdot \cos(2v - 2mv)$$

La valeur de l'aire instantanée est donc à sa valeur moyenne comme

$$\frac{4(1-m)}{3m^2} + \cos(2v - 2mv) \quad \text{est à} \quad \frac{4(1-m)}{3m^2},$$

et à cause de m^2 égal à $\frac{1}{178,7}$, comme

$$220,46 + \cos(2v - 2mv) \text{ est à } 220,46;$$

ce qui est le résultat de Newton.

Le carré de la vitesse de la Lune autour de la Terre, est $\frac{r^2dv^2 + dr^2}{dt^2}$, en représentant par r son rayon vecteur. Mais si l'on fait avec Newton, abstraction de l'excentricité de l'orbite, dr^2 devient de l'ordre du carré de la force perturbatrice, et peut ainsi être négligé, en sorte que l'on peut supposer le carré de cette vitesse, égal à $\frac{r^2dv^2}{dt^2}$ Mais l'aire décrite par le rayon vecteur pendant l'instant dt, est $\frac{1}{2}r^2dv$. Le carré de cette aire divisé par dt^2 est $\frac{r^4dv^2}{4dt^2}$, il est donc le quart du carré de la vitesse multiplié par r^2. Dans les syzygies et dans les quadratures, les carrés des aires instantanées sont, par ce qui précède, dans le rapport

$$1 + \frac{3m^2}{2(1-m)} \quad \text{à} \quad 1 - \frac{3m^2}{2(1-m)},$$

en désignant donc par $1 - x$, le rayon vecteur r dans les syzygies, et par $1 + x$, ce rayon vecteur dans les quadratures, les carrés des vitesses dans ces deux points, seront en négligeant le carré de x, dans le rapport de

$$1 + 2x + \frac{3m^2}{2(1-m)} \quad \text{à} \quad 1 - 2x - \frac{3m^2}{2(1-m)}.$$

Soient R et R′ les rayons vecteurs de l'orbite lunaire dans ces deux points, les forces centrales seront par les théorèmes d'Huygens sur la force centrifuge, dans le rapport de

$$\frac{1 + 2x + \frac{3m^2}{2(1-m)}}{R} \quad \text{à} \quad \frac{1 - 2x - \frac{3m^2}{2(1-m)}}{R'},$$

Si l'on nomme k la somme des masses de la Terre et de la Lune, il est facile de voir que la force centrale dans les syzygies, est

$$k(1+2x)-2m^2;$$

et qu'elle est dans les quadratures

$$k(1-2x)+m^2,$$

ces deux forces sont donc dans le rapport de

$$1+2x-\frac{2m^2}{k} \quad \text{à} \quad 1-2x+\frac{m^2}{k}.$$

k serait l'unité, sans la force perturbatrice, puisqu'il serait alors égal au carré de la vitesse, divisé par le rayon, k ne diffère donc de l'unité, que de quantités de l'ordre m^2, ainsi sans rechercher cette différence, nous pouvons en négligeant le carré de la force perturbatrice, supposer les deux forces précédentes, dans le rapport de

$$1+2x-2m^2 \quad \text{à} \quad 1-2x+m^2.$$

En égalant le rapport de ces forces, à celui que nous avons donné ci-dessus, on aura

$$\frac{R'}{R}=1-3m^2\left(1+\frac{1}{1-m}\right).$$

Pour déterminer x, Newton considère l'orbe lunaire, comme une ellipse dont la Terre occupe le centre, et qui se meut d'un mouvement angulaire égal au mouvement apparent du Soleil, en sorte que son périgée soit constamment au-dessous de cet astre Dans une pareille ellipse, si l'on prend avec Newton, pour unité de distance, le rayon vecteur dans les octans, ce rayon dans un point quelconque de l'orbite sera

$$1-x\,.\cos 2(v-mv)$$

Newton en conclut que la courbure $\frac{1}{R}$ dans les syzygies, est à la courbure $\frac{1}{R'}$ dans les quadratures, dans le rapport de

$$1-3x+(1+x).\frac{[1-(1-m)^2]}{(1-m)^2} \quad \text{à} \quad 1+3x+(1-x).\frac{[1-(1-m)^2]}{(1-m)^2};$$

ce qui donne

$$\frac{R'}{R} = 1 - 2x[4(1-m)^2 - 1].$$

En égalant cette valeur de $\frac{R'}{R}$, à la précédente, on a

$$x = \frac{\frac{3m^2}{2}\left(1 + \frac{1}{1-m}\right)}{4(1-m)^2 - 1}$$

Cette expression de x, réduite en nombres, donne $\frac{69}{70}$ pour le rapport du petit axe au grand axe de l'ellipse supposée par Newton

La valeur de x peut être conclue de la seule considération des syzygies. En effet, le carré de la vitesse divisé par le rayon de courbure, est dans les syzygies, par ce qui précède

$$\frac{1 + 2x + \frac{3m^2}{2(1-m)}}{R}$$

En l'égalant à la force centrale dans ces points, et qui comme on l'a vu, est

$$k(1 + 2x) - 2m^2,$$

on aura

$$\frac{1}{R} = k\left(1 - \frac{3m^2}{2(1-m)}\right) - 2m^2$$

On trouve, suivant le procédé de Newton, pour déterminer la courbure de l'orbite dans les syzygies,

$$\frac{1}{R} = 1 - x[4(1-m)^2 - 1]$$

Pour déterminer k, on doit observer que Newton a pris pour unité, le rayon vecteur de l'orbite, dans les octans. Or on trouve facilement qu'alors, dans ces points, le rayon de courbure et le carré de la vitesse sont égaux à l'unité, et que la force centrale dirigée vers le centre de courbure, est $k - \frac{1}{2}m^2$, on a donc par les théorèmes d'Huygens

$$k - \frac{1}{2}m^2 = 1,$$

ce qui donne

$$k = 1 + \frac{1}{2}m^2,$$

La première expression de $\frac{1}{R}$ devient ainsi

$$\frac{1}{R} = 1 - \frac{3}{2} m^2 \left(1 + \frac{1}{1-m}\right).$$

En l'égalant à la seconde, on a, comme ci-dessus,

$$x = \frac{\frac{3}{2} m^2 \left(1 + \frac{1}{1-m}\right)}{4(1-m)^2 - 1}.$$

Dans ce procédé, il faut déterminer k; ce que l'on évite en considérant à la fois, les syzygies et les quadratures.

Pour conclure de ces résultats, l'inégalité de la variation, Newton observe que dans une ellipse immobile où les aires tracées par le rayon vecteur partant du centre seraient proportionnelles aux temps, la tangente du mouvement vrai compté de l'extrémité du grand axe, serait à la tangente du mouvement moyen, comme le petit axe est au grand axe, ou comme $1 - x$ est à $1 + x$. Ensuite, pour avoir égard à l'accroissement de l'aire depuis la quadrature jusqu'à la syzygie, Newton multiplie la tangente du mouvement vrai, par le rapport de la racine carrée de l'aire instantanée dans la quadrature à la racine carrée de l'aire instantanée dans la syzygie, rapport qui, par ce qui précède, est $1 - \frac{3m^2}{4(1-m)}$. Ainsi la tangente du mouvement vrai, est à très peu près égale au produit de la tangente du mouvement moyen, par $1 - 2x - \frac{3m^2}{4(1-m)}$. Dans les octans ou le mouvement vrai est en degrés sexagésimaux égal à 45°, Newton trouve en substituant pour x et pour m, les valeurs qu'il a déterminées, le mouvement vrai de la Lune égal à 44° 27′ 28″; et le soustrayant de 45°, la différence 32′ 32″ est la valeur du coefficient de l'inégalité de la variation. Mais Newton observe qu'en vertu du mouvement apparent du Soleil, le mouvement lunaire de la quadrature à la syzygie, au lieu d'être 90°, est agrandi dans le rapport de la durée du mois synodique, à la durée du mois sidéral, ce qui revient à diviser 90° par $1 - m$. Il en conclut que tous les angles autour de la Terre, et par conséquent l'inégalité de la variation, doivent être augmentés dans le même rapport; ce qui porte cette inégalité à 35′ 10″.

Pour avoir l'expression analytique de l'inégalité de la variation, qui résulte du procédé de Newton, nommons δv cette inégalité Nous aurons

$$\operatorname{tang}(v+\delta v)=\left(1-2x-\frac{3m^2}{4(1-m)}\right)\operatorname{tang} v,$$

v étant le moyen mouvement de la Lune compté de la quadrature. Cela donne en négligeant le carré de δv

$$\frac{\delta v}{\cos^2 v}=-\left(2x+\frac{3m^2}{4(1-m)}\right).\frac{\sin v}{\cos v}$$

ou

$$\delta v=-\tfrac{1}{2}\left(2x+\frac{3m^2}{4(1-m)}\right).\sin 2v$$

Il faut, suivant Newton, substituer dans cette expression, $v-mv$ au lieu de v et la diviser par $1-m$; ce qui donne

$$\delta v=-\frac{\left(2x+\frac{3m^2}{4(1-m)}\right).\sin(2v-2mv)}{2(1-m)}$$

Si l'on fait partir l'angle $v-mv$ de la syzygie; il faut l'augmenter de 90°, ce qui revient à changer le signe de $\sin(2v-2mv)$

On peut obtenir cette expression plus simplement, de la manière suivante. On a par ce qui précède

$$r^2.\,d(v+\delta v)=dv\left[1+\frac{3m^2.\cos(2v-2mv)}{4(1-m)}\right].$$

Substituant pour r, sa valeur $1-x.\cos 2(v-mv)$, on aura

$$d\delta v=\left(2x+\frac{3m^2}{4(1-m)}\right).\cos(2v-2mv)$$

d'où l'on tire en intégrant

$$\delta v=\frac{\left(2x+\frac{3m^2}{4(1-m)}\right)}{2(1-m)}\sin(2v-2mv)$$

ici l'angle $v-mv$ est compté de la syzygie

Généralisons maintenant, la méthode de Newton Pour cela repre-

nous l'expression de Q du n° 1, du Livre VII. Cette expression donne $\frac{1}{r}\cdot\left(\frac{dQ}{dv}\right)$, pour la force qui anime la Lune, décomposée perpendiculairement au rayon r, et $-\left(\frac{dQ}{dr}\right)$ pour cette force décomposée suivant ce rayon et dirigée vers la Terre La force $\frac{1}{r}\cdot\left(\frac{dQ}{dv}\right)$, multipliée par l'instant dt donne l'accroissement de vitesse pendant l'instant dt, perpendiculairement au rayon cet accroissement multiplié par dt et par $\frac{1}{2}r$, donne $\frac{1}{2}\left(\frac{dQ}{dv}\right)dt$ pour l'accroissement de l'aire instantanée $\frac{1}{2}r^2dv$, dt étant supposé constant, on a donc

$$\frac{d\,r^2dv}{dt}=\left(\frac{dQ}{dv}\right).dt.$$

En multipliant les deux membres de cette équation par $\frac{r^2dv}{dt}$, et intégrant, on aura

$$(r^2dv)^2=h^2dt^2\left[1+\frac{2}{h^2}\cdot\int\left(\frac{dQ}{dv}\right).r^2dv\right],$$

h étant une constante arbitraire; d'où l'on tire, en faisant $\frac{1}{r}=u$,

$$dt=\frac{dv}{hu^2.\sqrt{1+\frac{2}{h^2}.\int\left(\frac{dQ}{dv}\right).\frac{dv}{u^2}}};$$

ce qui est la première des équations (L) du n° 1 du Livre VII

Si l'on nomme ds l'élément de la courbe décrite par la Lune, $\frac{ds^2}{dt^2}$ sera le carré de sa vitesse. en substituant pour dt sa valeur précédente, on aura pour ce carré

$$h^2u^4.\frac{ds^2}{dv^2}.\left[1+\frac{2}{h^2}.\int\left(\frac{dQ}{dv}\right).\frac{dv}{u^2}\right].$$

Soit R le rayon osculateur de l'orbite; les formules connues du rayon de courbure donnent en supposant dv constant,

$$\frac{1}{R}=dv^3.\frac{\left[\left(\frac{ddu}{dv^2}\right)+u\right]}{u^3ds^3},$$

ainsi le carré de la vitesse divisé par le rayon de courbure est

$$u\frac{dv}{ds}.h^2.\left[\left(\frac{ddu}{dv^2}\right)+u\right].\left[1+\frac{2}{h^2}.\int\left(\frac{dQ}{dv}\right).\frac{dv}{u^2}\right].$$

Il faut par les théorèmes d'Huygens, égaler cette expression, à la force lunaire décomposée suivant le rayon de courbure et dirigée vers le centre de courbure. On a vu que la force lunaire se décompose en deux, l'une dirigée vers la Terre et égale à $-\left(\frac{dQ}{dr}\right)$, l'autre perpendiculaire à r et égale à $\frac{1}{r}\left(\frac{dQ}{dv}\right)$. Si l'on décompose la force $-\left(\frac{dQ}{dr}\right)$ en deux, l'une parallèle à l'élément de la courbe, et l'autre dirigée vers le centre de courbure, on aura pour celle-ci $-\left(\frac{dQ}{dr}\right).\frac{rdv}{ds}$, ou $u\left(\frac{dQ}{du}\right).\frac{dv}{ds}$. Pareillement la force $\frac{1}{r}\left(\frac{dQ}{dv}\right)$ décomposée suivant le rayon de courbure sera $-\frac{du}{uds}.\left(\frac{dQ}{dv}\right)$. En réunissant ces deux forces dirigées vers le centre de courbure, on aura pour la force lunaire dirigée vers ce point

$$u.\frac{dv}{ds}\left(\frac{dQ}{du}\right)-\frac{du}{uds}\left(\frac{dQ}{dv}\right);$$

en l'égalant au carré de la vitesse divisé par le rayon de courbure, on aura

$$0=\left(\frac{ddu}{dv^2}+u\right)\left[1+\frac{2}{h^2}.\int\left(\frac{dQ}{dv}\right)\frac{dv}{u^2}\right]-\frac{1}{h^2}\left(\frac{dQ}{du}\right)+\frac{du}{h^2u^2dv}.\left(\frac{dQ}{dv}\right),$$

équation qui coïncide avec la seconde des équations (L) du n° 1 du Livre VII, lorsqu'on néglige l'inclinaison de l'orbite lunaire

3. Newton considère ensuite le mouvement des nœuds de l'orbe lunaire, et la variation de son inclinaison à l'écliptique Après avoir décomposé l'action du Soleil sur la Lune, en deux, l'une dirigée suivant le rayon de l'orbe lunaire, l'autre parallèle au rayon mené du Soleil à la Terre; il retranche de celle-ci, l'action du Soleil sur la Terre, et il observe que leur différence est la seule force qui puisse altérer la position du plan de l'orbite lunaire, comme n'étant pas dans ce plan Pour déterminer la variation des nœuds qui en résulte, Newton fait passer un plan par l'élément de l'arc que la Lune décrit dans un instant, et par le rayon lunaire de la dernière extrémité de cet élément

Ce plan sera celui de l'orbite pendant cet instant : dans l'instant suivant, la différence des forces dont nous venons de parler, fera dévier la Lune, de ce plan Si par l'extrémité du rayon lunaire, on mène une petite droite pour représenter cette différence ; en la composant avec la vitesse de la Lune dans le premier instant, on aura la direction de cette vitesse dans le second instant, et faisant passer un plan par le rayon lunaire et par cette direction, on aura le nouveau plan de l'orbite Newton détermine ensuite la différence de position des nœuds de ces deux plans, et il trouve que le mouvement horaire du nœud ascendant est égal à

$$-3m^2v_1 \,.\, \sin(v - N) \,.\, \sin(mv - N) \,.\, \cos(v - mv),$$

N étant la longitude du nœud, et v_1 étant le mouvement horaire de la Lune En désignant donc par N_1 le mouvement horaire du nœud, on a

$$N_1 = -3m^2v_1 \,.\, \sin(v - N) \,.\, \sin(mv - N) \,.\, \cos(v - mv).$$

Dans l'état actuel de l'analyse, on réduit le produit de ces sinus et cosinus, en cosinus simples ; ce qui donne

$$N_1 = -\tfrac{3}{4}m^2 \,.\, v_1 \,.\, [1 + \cos(2v - 2mv) - \cos(2v - 2N) - \cos(2mv - 2N)]$$

En changeant ensuite N_1 et v_1 en dN et dv, et désignant $-\frac{3}{4}m^2v$ par zv, on aura à très peu près, en intégrant

$$N = -\tfrac{3}{4}m^2v - \frac{3\,m^2}{8(1-m)} \,.\, \sin(2v - 2mv) + \frac{3m^2}{8(1-z)} \,.\, \sin(2v - 2N)$$
$$+ \frac{3m^2}{8(m-z)} \,.\, \sin(2mv - 2N).$$

Ce procédé n'était point au-dessus de l'analyse connue de Newton, et s'il en eût fait usage, il aurait eu fort simplement l'inégalité annuelle du mouvement du nœud, que son petit diviseur rend très sensible, et qui par ce qui précède est

$$\frac{3m^2}{8(m-z)} \,.\, \sin(2mv - 2N).$$

En substituant pour N, sa valeur précédente, dans l'expression de dN ;

on aura le terme non périodique

$$\tfrac{3}{4} m^2 dv \cdot \frac{3m^2}{8(m-i)};$$

en sorte que le moyen mouvement du nœud sera

$$-\tfrac{3}{4} m^4 v \left[1 - \frac{3m^2}{8(m-i)}\right],$$

expression exacte aux quantités près de l'ordre m^4

Newton, au lieu de décomposer l'expression du mouvement horaire en cosinus simples, pour ne considérer que l'inégalité indépendante du mouvement de la Lune, emploie un procédé qui revient au même. Il observe que dans le cours de chaque mois, le mouvement du nœud s'accélère et retarde, et que de là résulte un mouvement horaire médiocre qu'il trouve égal à

$$-\tfrac{3}{2} m^2 v_1 \cdot \sin^2 (mv - N),$$

ce qui donne

$$N_1 = -\tfrac{3}{4} m^2 v_1 [1 - \cos (2mv - 2N)],$$

N_1 étant ici le mouvement horaire médiocre. Cette expression de N_1 revient à négliger dans la précédente, les termes dont la période est d'environ un mois Newton néglige en effet, les inégalités de ce genre; parce qu'elles disparaissent de l'expression de la latitude, en se combinant avec les inégalités semblables de l'inclinaison de l'orbite lunaire. En changeant N_1 et v_1 en dN et dv, on a

$$dN = -\tfrac{3}{2} m^2 dv \cdot \sin^2 (mv - N).$$

Supposons

$$mv - N = \varphi,$$

on aura

$$mdv = d\varphi + dN;$$

on aura donc

$$dN = -\frac{\frac{3}{2} m d\varphi \sin^2\varphi}{1 + \frac{3}{2} m \sin^2\varphi} = -\tfrac{3}{2} m d\varphi \cdot \sin^2 \varphi + \frac{\frac{3}{2} m \, d\varphi \sin^4 \varphi}{\frac{2}{3m} + \sin^2 \varphi}.$$

En intégrant cette valeur de dN, depuis φ nul, jusqu'à φ égal à la circonférence 2π, on aura le mouvement moyen du nœud dans l'intervalle de deux retours consécutifs du Soleil au même nœud. L'in-

tégrale de $-\frac{3}{2} m d\varphi . \sin^2 \varphi$ est $-\frac{3}{4} m . 2\pi$. Newton a déterminé l'intégrale

$$\frac{\frac{3}{2} m \; d\varphi . \sin^4 \varphi}{\frac{2}{3m} + \sin^2 \varphi}$$

par la méthode des suites, qui donne pour cette intégrale

$$\frac{27}{32} . m^2 \left(1 - \frac{5m}{4}\right) . 2\pi$$

On a ainsi pour le mouvement moyen du nœud dans l'intervalle de deux retours consécutifs du Soleil au même nœud,

$$-\frac{3m}{4} . 2\pi \left(1 - \frac{9m}{8} + \frac{45m^2}{32}\right).$$

En exprimant cette quantité par $-2F\pi$, il faut suivant Newton, pour avoir le mouvement sydéral du nœud, la multiplier par $\frac{1}{1-F}$, ce qui donne pour le moyen mouvement du nœud,

$$-\frac{3}{4} m^2 v \left(1 - \frac{3m}{8} + \frac{9m^2}{32}\right).$$

Newton ajoute à cette expression les termes de l'ordre m^4, qui résultent de ce qu'en vertu de l'argument de la variation, le rayon vecteur de la Lune n'est pas constant, et son mouvement n'est pas uniforme Il trouve qu'il en résulte dans le mouvemement du nœud, la quantité

$$\frac{3}{4} m^2 v \left(2x + \frac{3}{4} m^2\right),$$

x désignant ce que nous lui avons fait désigner dans le n° précédent, ce qui donne le mouvement du nœud suivant Newton, égal à

$$-\frac{3}{4} m^2 v \left(1 - \frac{3m}{8} - 2x - \frac{15\, m^2}{32}\right).$$

L'expression de ce mouvement donnée dans le n° 13 du Livre VII, et qui a été vérifiée par divers géomètres, est aux quantités près de l'ordre m^5,

$$-\frac{3}{4} m^2 v \left(1 - \frac{3m}{8} - \frac{27}{32} . m^2 - 2x\right);$$

la différence de ces deux expressions est très petite.

Pour avoir l'inégalité du mouvement du nœud, Newton fait usage de l'expression précédente dN, qui en l'intégrant et négligeant les quantités de l'ordre m^3, donne

$$N = -\tfrac{3}{4} m\varphi\left(1 - \tfrac{9}{8} m\right) + \tfrac{3}{8} m\left(1 - \frac{3m}{2}\right).\sin 2\varphi + \frac{9m^2}{128}.\sin 4\varphi.$$

L'inégalité dépendante de $\sin.4\varphi$ est insensible · celle qui dépend de $\sin 2\varphi$ ou de $\sin(2mv - 2N)$, a été reconnue par Ticho. En réduisant en nombres, son coefficient, on a celui que Ticho a déduit de ses observations

Newton détermine ensuite la variation horaire de l'inclinaison de l'orbite lunaire à l'écliptique, et il la trouve égale à

$$-3m^2\gamma.v_1.\cos(v - N).\sin(mv - N).\cos(v - mv).$$

γ étant l'inclinaison de l'orbite. En changeant le mouvement horaire v_1 de la Lune en dv, en réduisant en sinus simples le produit des cosinus et du sinus, et en intégrant, on a pour la variation de l'inclinaison, cette expression fort approchée

$$-\frac{3m^2\gamma\cos(2v - 2mv)}{8(1 - m)} + \frac{3m^2\gamma\cos(2v - 2N)}{8(1 - 1)} + \frac{3m^2\gamma\cos(2mv - 2N)}{8(m - 1)};$$

γ étant l'inclinaison moyenne de l'orbite Newton ne considère, comme il l'a fait pour le mouvement du nœud, que la partie de cette expression qui n'est relative qu'à la distance du Soleil au nœud il trouve le mouvement horaire de l'inclinaison, relatif à cette partie, égal à

$$\frac{3m^2}{2} v_1\gamma.\sin(mv - N).\cos(mv - N);$$

d'où il conclut la principale inégalité de l'inclinaison

Il observe que les deux autres inégalités dont la période est d'un mois à peu près, en se combinant avec les deux inégalités correspondantes du mouvement du nœud, ne produisent aucune inégalité sensible dans la latitude En effet, si l'on nomme δN et $\delta\gamma$ les variations

du nœud et de l'inclinaison; la variation de la latitude sera

$$\delta\gamma \,.\, \sin(v - N) - \gamma\delta N \,.\, \cos(v - N).$$

En substituant pour $\delta\gamma$ et δN, leurs termes périodiques trouvés ci-dessus, cette fonction devient

$$\frac{-3m^2}{8(m-1)} \,.\, \sin(v - N) + \frac{3m^2}{8}\left(\frac{1}{m-1} + \frac{1}{1-m}\right) \,.\, \sin(v - 2mv + N).$$

Le premier de ces termes se confond avec la première équation de latitude : le second forme la seconde équation de la latitude, dont le coefficient est augmenté d'une quantité de l'ordre m^2, par la considération des inégalités de l'inclinaison et du mouvement du nœud, dont la période est d'un mois à peu près.

CHAPITRE III.

Des inégalités lunaires à longues périodes, dépendantes de la figure non sphérique de la Terre.

De l'inégalité lunaire à longue période, dépendante de la différence des deux hémisphères terrestres.

4 Cette inégalité a pour argument, la longitude du périgée lunaire, plus deux fois la longitude du nœud · sa période est d'environ 180 ans Pour la déterminer, je vais reprendre la formule (T) du n° 46 du second Livre, en lui donnant cette forme

$$d.\delta v = \frac{2\,d^2(r\delta r) - d(dr\delta r) + dt^2\left[3\int\delta\,dR + 2\delta.r\left(\frac{dR}{dr}\right) - \left(\frac{dR}{dr}\right).\delta r\right]}{r^2 dv}, \quad (T)$$

l'angle v étant rapporté à l'orbite lunaire Je supposerai ici que la caractéristique δ se rapporte à la différence des deux hémisphères terrestres

On peut supposer dans cette formule, r^2dv proportionnel à l'élément dt du temps. Cette proportionnalité a lieu dans la théorie de la Lune, en ayant même égard aux termes de l'ordre m dans les expressions de r et de dv, m exprimant comme ci-dessus, le rapport du moyen mouvement du Soleil à celui de la Lune. Ces termes que l'intégration a réduits à l'ordre m, ont des argumens qui ne diffèrent de v, que de quantités de l'ordre m tel est spécialement celui qui représente l'évection. Ils peuvent être considérés comme autant d'équations du centre; en sorte que si l'on désigne par $mk \cos q$, le terme de l'expression de r; le terme correspondant de l'expression de dv sera

aux quantités près de l'ordre m^2, égal à $-2mk.\cos q$; ainsi, en négligeant les quantités de cet ordre, k disparaît de l'expression de r^2dv. Ces termes ne troublent donc point sensiblement, la proportionnalité des aires aux temps En prenant ainsi pour unité de distance, la moyenne distance de la Lune à la Terre, et pour mesure du temps t, le moyen mouvement de la Lune, nous pourrions supposer r^2dv égal à dt Par le n° 1 du Supplément au Traité de Mécanique céleste, δR peut être supposé nul relativement aux inégalités à longue période, et par rapport à ces inégalités, on peut évidemment négliger le terme $2d^2(r\delta r)$ L'équation (T) devient ainsi

$$d.\delta v = -\frac{d(dr\delta r)}{dt} + dt\left[2\delta.r\left(\frac{dR}{dr}\right) - \left(\frac{dR}{dv}\right).\delta r\right] \quad (a)$$

Il faut maintenant déterminer la valeur de R Si l'on nomme V la somme de toutes les molécules de la Terre, divisées par leurs distances à son centre, on aura par le n° 14 du Livre III, une expression pour V de cette forme

$$\frac{T}{r} + H^{(1)}.\frac{D}{r^2}.U^{(2)} + H^{(2)}.\frac{D^2}{r^3}.U^{(2)} + H^{(3)}.\frac{D^3}{r^4}.U^{(3)} + \text{etc.}$$

T étant la masse du sphéroïde terrestre, D, son rayon moyen, et $U^{(i)}$ étant une fonction rationnelle et entière de μ et de ϖ, telle que l'on ait

$$0 = \left\{\frac{d\left[(1-\mu^2).\left(\frac{dU^{(i)}}{d\mu}\right)\right]}{d\mu}\right\} + \frac{\left(\frac{ddV^{(i)}}{d\varpi^2}\right)}{1-\mu^2} + i.\overline{i+1}.U^{(i)},$$

μ étant le sinus de la déclinaison de la Lune, et ϖ étant la distance angulaire de son méridien à un méridien déterminé En négligeant, comme on peut le faire ici, les sinus et cosinus d'angles dépendans de cette distance, on aura

$$U^{(3)} = \mu^3 - \tfrac{3}{5}\mu$$

Le terme divisé par r^4 dans l'expression de V dépend de la différence des deux hémisphères terrestres. Il prend par le n° 46 du Livre II, un signe contraire dans l'expression de R où il devient

$$-H^{(3)}.\frac{D^3}{r^4}.(\mu^3 - \tfrac{3}{5}\mu)$$

En désignant par s la tangente de la latitude de la Lune; par fv sa

longitude vraie rapportée à l'écliptique et comptée de l'équinoxe mobile du printemps, et par λ l'obliquité de l'écliptique, on a

$$\mu = \frac{\sin\lambda \,.\, \sin fv + s \,.\, \cos\lambda}{(1+s^2)^{\frac{1}{2}}},$$

ce qui produit dans la fonction $\mu^3 - \frac{3}{5}\mu$, le terme

$$\frac{-\sin^3\lambda \sin 3fv}{4(1+s^2)^{\frac{3}{2}}}$$

C'est le seul terme de cette fonction, auquel nous devions avoir égard ici En faisant donc

$$k = \frac{\Pi^{(3)}\, D^3 \sin^3\lambda}{4},$$

on aura dans l'expression de R, le terme

$$\frac{k \sin 3fv}{(1+s^2)^{\frac{3}{2}} \,.\, r^4}.$$

On peut observer ici que f est extrêmement près de l'unité, et qu'il n'en diffère qu'à raison de la précession des équinoxes dont le mouvement est très lent par rapport à v.

Pour avoir l'expression de R, il faut y ajouter ce qui dépend de l'action du Soleil, et l'on verra facilement en rapprochant l'expression de R du n° 46 du Livre II, de l'expression Q des n°s 1 et 3 du Livre VII, que cette partie de R est la fonction

$$-\frac{m^2}{4} \,.\, r^2 \left[1 - 3s^2 + 3(1-s^2)\cos(2v - 2mv)\right];$$

les angles v et mv étant ici rapportés à l'écliptique En la désignant par r^2Q', la partie de R que nous devons considérer dans la question présente sera

$$r^2Q' + \frac{k \sin 3fv}{(1+s^2)^{\frac{3}{2}}\, r^4}.$$

On aura ainsi

$$2r\left(\frac{dR}{dr}\right) = 4r^2Q' - \frac{8\, k \sin 3fv}{(1+s^2)^{\frac{3}{2}}\, r^4}.$$

La caractéristique ne portant ici, que sur les termes multipliés par k,

si l'on néglige le carré de k; on aura

$$2.\delta.r\left(\frac{dR}{dr}\right) = 4.\delta.r^2Q' - \frac{8k \sin 3fv}{(1+s^2)^{\frac{3}{2}}\, r^4}.$$

Mais en n'ayant égard qu'aux inégalités à longues périodes on peut, comme on l'a dit, supposer δR nul, ce qui donne

$$\delta.r^2Q' = -\frac{k \sin 3fv}{(1+s^2)^{\frac{1}{2}}\, r^4};$$

on a donc

$$2\delta.r\left(\frac{dR}{dr}\right) = -\frac{12k \sin 3fv}{(1+s^2)^{\frac{9}{2}}\, r^4},$$

la formule précédente (a) devient ainsi

$$d.\delta v = -\frac{d(dr\delta r)}{dt} - dt\left[\frac{12\ k \sin 3fv}{(1+s^2)^{\frac{3}{2}}\, r^4} + 2Q'.\, r\delta r\right].$$

Il faut maintenant déterminer $r\delta r$. Pour cela je reprends les équations (L) du n° 1er du Livre VII En adoptant les dénominations du même Livre, la différence des deux hémisphères terrestres ajoute à la valeur de Q du numéro cité, le terme

$$-\frac{k.u^4.\sin 3fv}{(1+s^2)^{\frac{7}{2}}},$$

r étant égal à $\frac{\sqrt{1+s^2}}{u}$ Ne considérons ici que cette partie de Q, on aura

$$\left(\frac{dQ}{dv}\right); \frac{dv}{u^2} = -\frac{3k.\, u^2 \cos 3fv}{(1+s^2)^{\frac{7}{2}}}.$$

On a par le n° 4 du Livre VII

$$u = \frac{1}{h^2(1+\gamma^2)}\left[\sqrt{1+s^2} + e.\cos(cv - \varpi)\right],$$
$$s = \gamma.\sin\left(gv - \frac{1}{1}\theta\right),$$

négligeant donc les termes qui doivent rester insensibles après les

intégrations, on aura

$$2\int\left(\frac{dQ}{dv}\right)\cdot\frac{dv}{h^2u^2}=-\frac{2k}{h^6}\left\{\begin{array}{l}\sin.3fv\\ +\frac{15\gamma^2}{8}\cdot\frac{\sin(3fv-2gv+2\theta)}{3f-2g}\\ +\frac{9}{4}\cdot\frac{e\gamma^2.\sin(3fv-2gv-cv+2\theta+\varpi)}{3f-2g-c}\end{array}\right\}.$$

En substituant pour u sa valeur approchée

$$\frac{1}{h^2(1+\gamma^2)}\left[1+\tfrac{1}{4}\gamma^2-\tfrac{1}{4}\gamma^2.\cos(2gv-2\theta)\right],$$

le terme

$$\left[\left(\frac{ddu}{dv^2}\right)+u\right].2\int\left(\frac{dQ}{dv}\right).\frac{dv}{k^2u^2}$$

de la seconde des équations (L) du n° 1, donnera ceux-ci

$$-\frac{k}{h^8}\left\{\begin{array}{l}\frac{9}{2}\gamma^2.\sin(3fv-2gv+2\theta)\\ +\frac{9}{2}e\gamma^2.\sin(3fv-2gv-cv+2\theta+\varpi)\end{array}\right\},$$

on trouve de plus

$$\frac{du}{h^2u^2.dv}\left(\frac{dQ}{dv}\right)=\frac{3k\gamma^2}{4h^8}.\sin(3fv-2gv+2\theta);$$

$$-\frac{1}{h^2}\left(\frac{dQ}{du}\right)-\frac{s}{h^2u}\left(\frac{dQ}{ds}\right)=\frac{15k\gamma^2}{4h^8}.\sin(3fv-2gv+2\theta).$$

Tous ces termes réunis produisent dans le second membre de la seconde des équations (L) citées, le terme

$$-\frac{9}{2h^8}\cdot\frac{ke\gamma^2.\sin(3fv-2gv-cv+2\theta-\varpi)}{3f-2g-c}.$$

Il faut ajouter à ce membre, le terme qui résulte de la variation de u, relative à l'angle $3fv-2gv$, dans le développement de la force perturbatrice. Représentons cette variation, par

$$\frac{1}{h^2(1+\gamma^2)}.lk.\sin(3fv-2gv+2\theta);$$

en sorte que la valeur précédente de u, devienne

$$u = \frac{1}{h^2(1+\gamma^2)}\left[\sqrt{1+s^2} + e.\cos(cv - \varpi) + lk.\cos\left(3fv - 2gv + 2\theta - \frac{\pi}{2}\right)\right],$$

π étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité L'angle $3fv - 2gv$ étant très peu différent de cv; on peut considérer le terme

$$lk.\cos\left(3fv - 2gv + 2\theta - \frac{\pi}{2}\right),$$

comme étant relatif à une seconde équation du centre, ainsi de même que le terme $e.\cos(cv - \varpi)$ a produit dans le second membre de l'équation (L') du n° 9 du Livre VII, le terme

$$-(1 - c^2).e\cos(cv - \omega),$$

le terme

$$lk\cos\left(3fv - 2gv + 2\theta - \frac{\pi}{2}\right),$$

y produira le terme

$$-(1 - c'^2).lk.\cos\left(3fv - 2gv + 2\theta - \frac{\pi}{2}\right)$$

c' étant extrêmement peu différent de c Il lui serait même égal, si l'on faisait abstraction de la puissance $[e.\cos(cv - \omega)]^3$ qui provient du facteur $\frac{1}{u^3}$ qui multiplie l'action perturbatrice du Soleil, dans le mouvement lunaire, car en négligeant le carré de k et ses puissances supérieures, et ne considérant que les termes multipliés par

$$e.\cos(cv - \omega)$$

et par

$$lk.\cos\left(3fv - 2gv + 2\theta - \frac{\pi}{2}\right),$$

on a

$$\frac{1}{u^3} = h^6(1+\gamma^2)^3\left\{\begin{array}{l} -3e\left(1 + \frac{5}{2}e^2\right).\cos(cv - \varpi) \\ -3\,lk.\cos\left(3fv - 2gv + 2\theta - \frac{\pi}{2}\right) \end{array}\right\}$$

De là il est facile de conclure que l'on a à très peu près

$$1 - c'^2 = (1 - c^2)\left(1 - \frac{5}{2}e^2\right).$$

Il faut donc ajouter au second membre de l'équation (L') du n° 9 du Livre VII, le terme

$$-(1-e^2)\left(1-\tfrac{5}{2}e^2\right).lk.\sin(3fv-2gv+2\theta)$$

Le terme

$$-\frac{1}{h^2(1+s^2)^{\frac{1}{2}}},$$

que donne par son développement le second membre de la seconde des équations (L) du n° 1 du Livre VII, produit dans le second membre de l'équation (L') du même Livre, le terme $\frac{3s\delta s}{h^2}$, δs étant la variation de s, dépendante de k. La partie sensible de cette variation dépend de l'angle

$$3fv-gv-cv+\theta+\varpi,$$

parce que

$$3fv-gv-cv$$

différant très peu de gv, les termes relatifs à cet angle, acquièrent un très petit diviseur Il faut par la même raison avoir égard aux termes de δs, dépendans de l'angle $3fv-gv+\theta$. Ces termes produisent dans $\frac{3s\delta s}{h^2}$, des termes dépendans de l'angle $3fv-2gv+2\theta$, et qui acquièrent par l'intégration de l'équation (L') du n° 9 du Livre VII, un très grand diviseur

Cela posé, en n'ayant égard qu'à la partie de Q dépendante de k, on a

$$\frac{1}{h^2u^2}\cdot\frac{ds}{dv}\left(\frac{dQ}{dv}\right)-\frac{s}{h^2u}\left(\frac{dQ}{du}\right)-\frac{(1+s^2)}{h^2u^2}\left(\frac{dQ}{ds}\right)$$
$$=-\frac{3k}{h^6}\gamma e\cos(3fv-gv-cv+\theta+\varpi)$$
$$-\frac{3k}{h^6}.\gamma.\cos(3fv-gv+\theta)$$

Il faut donc ajouter ces deux derniers termes au second membre de la troisième des équations (L) du n° 1 du Livre VII Il faut ajouter encore à ce membre, le terme qui résulte de la variation de s relative à

l'angle $3fv - gv - cv$, dans le développement de la force perturbatrice Représentons cette variation par

$$ik \cos(3fv - gv - cv + \theta + \varpi)$$

$3fv - gv - cv$ différant très peu de gv; on peut considérer

$$ik \,.\, \sin\left(3fv - gv - cv + \theta + \varpi - \frac{\pi}{2}\right),$$

comme appartenant à une seconde inclinaison de l'orbite Ainsi de même que le terme $\gamma \,.\, \sin(gv - \theta)$ a produit dans l'équation (L″) du n° 13 du Livre VII, le terme

$$(g^2 - 1)\,\gamma \,.\, \sin(gv - \theta),$$

le terme

$$ik \,.\, \sin\left(3fv - gv - cv + \theta + \varpi - \frac{\pi}{2}\right),$$

y produira le terme

$$(g'^2 - 1) \,.\, ik \,.\, \sin\left(3fv - gv - cv + \theta + \varpi - \frac{\pi}{2}\right),$$

g' étant extrêmement peu différent de g On aura leur différence, en observant qu'elle vient du terme multiplié par s^3, dans le développement du second membre de la troisième des équations (L) du n° 1 du Livre VII, et spécialement de sa partie

$$-\frac{s}{h^2 u}\left(\frac{dQ}{du}\right) - \frac{(1 + s^2)}{h^2 u^2} \,.\, \left(\frac{dQ}{ds}\right),$$

et il resulte de l'expression de Q du n° 3 du Livre VII, que cette partie donne dans ce second membre, le terme $-3m^2 \,.\, h^6 \,.\, s^3$, ce qui produit dans le second membre de l'équation (L″) citée, le terme

$$-\frac{9}{4} h^6 m^2 \,.\, \gamma^2 \,.\, \gamma \,.\, \sin(gv - \theta),$$

on a donc, en observant que h est à très peu près l'unité,

$$g^2 = g'^2 - \frac{9}{4} m^2 \gamma^2,$$

il faut donc ajouter à ce second membre, le terme

$$(g^2 - 1 + \frac{9}{4} m^2\gamma^2) \,.\, ik \cos(3fv - gv - cv + \theta + \varpi)$$

La troisième des équations (L) citées donne ainsi, en ne considérant que les termes précédens dépendans de k,

$$0 = \frac{dds}{dv^2} + s + (g^2 - 1 + \frac{9}{4} m^2\gamma^2) \,.\, ik \,.\, \cos(3fv - gv - cv + \theta + \varpi)$$
$$- \frac{3k}{h^6} \,.\, \gamma e \,.\, \cos(3fv - gv - cv + \theta + \varpi)$$
$$- \frac{3}{h^6} \,.\, \gamma \,.\, \cos(3fv - gv + \theta).$$

Ayant représenté par $ik \,.\, \cos(3fv - gv - cv + \theta + \varpi)$, le terme de s, dépendant de l'angle $3fv - gv - \varpi$, l'équation précédente donnera

$$0 = ik[g^2 + \frac{9}{4} m^2\gamma^2 - (3f - g - c)^2] - \frac{3k}{h^6}\gamma e$$

Ainsi la variation de s relative à l'angle $3fv - gv - cv$, est à fort peu près

$$- \frac{3k}{h^6} \,.\, \frac{\gamma e \cos.(3fv - gv - cv + \theta + \varpi)}{2(3f - 2g - c) - \frac{9}{4} m^2\gamma^2}$$

γ et m sont des fractions du même ordre de petitesse, en sorte que $-\frac{9}{4} m^2\gamma^2$ est de l'ordre m^4, il semble donc qu'on peut le négliger par rapport à $2(3f - 2g - c)$, mais la circonstance particulière qui rend $1 - c$ presque double de $g - 1$, rend $2(3f - 2g - c)$ fort petit, et tel que, pour l'exactitude du calcul, il est nécessaire de conserver à son égard, le terme $-\frac{9}{4} m^2\gamma^2$.

La partie de s relative à l'angle $3fv - gv$, est à fort peu près

$$- \frac{k\gamma}{h^6} \,.\, \cos(3fv - gv + \theta),$$

le terme $\frac{3s\delta s}{h^2}$ donne ainsi les suivans

$$\frac{9ke\gamma^2 . \sin(3fv - 2gv - cv + 2\theta + \varpi)}{4h^8\ (3f - 2g - c - \frac{9}{8}.m^2\gamma^2)}$$

$$+ \frac{3k\gamma^2}{2h^8} . \sin(3fv - 2gv + 2\theta)$$

La seconde des équations (L) citées, deviendra ainsi, en ne considérant que les termes qui ont pour diviseurs $3f - 2g - c$, ou qui peuvent l'acquérir,

$$0 = \frac{ddu}{dv^2} + u - \frac{9ke\gamma^2}{2h^8}\left(\frac{1}{3f-2g-c} - \frac{1}{2}\,\frac{1}{3f-2g-c-\frac{9}{8}m^2\gamma^2}\right)\sin(3fv-2gv-cv+2\theta+\varpi).$$

$$+ \frac{3k\ \gamma^2}{2h^8}\ \sin(3fv - 2gv + 2\theta)$$

$$-(1-c^2).(1-\tfrac{5}{2}e^2).lk.\sin(3fv - 2gv + 2\theta)$$

Ayant représenté la partie de la variation δu de u, relative à l'angle $3fv - 2gv + 2\theta$, par

$$lk . \sin(3fv - 2gv + 2\theta),$$

l'équation précédente donne

$$lk = \frac{3k\gamma^2}{4h^8 . [3f - 2g - c - \frac{5}{4}e^2(1-c^2)]};$$

on aura donc

$$\delta u = \frac{3k\gamma^2 . \sin(3fv - 2gv + 2\theta)}{4h^8\ [3f - 2g - c - \frac{5}{4}e^2(1-c^2)]}$$

$$+ \frac{9k\ e\gamma^2}{4h^8} . \frac{3f - 2g - c - \frac{9}{4}m^2\gamma^2}{(3f-2g-c)\ (3f-2g-c-\frac{9}{8}m^2\gamma^2)}\ \sin(3fv - 2gv - cv + 2\theta + \varpi)$$

En prenant ensuite pour unité la moyenne distance de la Lune à la Terre, on pourra par le n° 6 du Livre VII, supposer $h = 1$, et alors on a à fort peu près

$$u = \sqrt{1 + s^2} + e\ \cos(cv - \varpi),$$

on a ensuite

$$r = \frac{\sqrt{1 + s^2}}{u}$$

Le terme

$$\frac{12\,kdt\,.\,\sin 3fv}{(1+s^2)^{\frac{3}{2}}\,r^4}$$

donne celui-ci, en substituant pour dt, $\frac{dv}{u^2}$,

$$9ke\gamma^2 \sin(3fv - 2gv - cv + 2\theta + \varpi)$$

On trouvera facilement

$$-2Q'dt\,.\,r\delta r = \frac{m^2}{2}\left[1 + 3\,.\cos(2v - 2mv)\right]\left(\frac{s\delta s}{u^2} - \frac{\delta u}{u^2}\right).\frac{dv}{u^2}$$

En substituant pour δu et δs, leurs valeurs précédentes, et ne conservant que les termes qui ont des diviseurs de l'ordre $3f - 2g - c$, on aura

$$\frac{m^2}{2}\left(\frac{s\delta s}{u^2} - \frac{\delta u}{u^2}\right).\frac{dv}{u^2}$$
$$= 3k\,\frac{m^2}{2}e\gamma^2 \sin(3fv - 2gv - cv + 2\theta + \varpi).\left\{\begin{array}{l} \dfrac{1}{3f - 2g - c - \frac{9}{8}m^2\gamma^2} \\ - \dfrac{\frac{3}{2}}{3f - 2g - c} \\ + \dfrac{\frac{5}{8}}{3f - 2g - c - \frac{5}{4}e^2(1 - c^2)} \end{array}\right\}$$

Les termes de l'ordre m^3 doublent à fort peu près, comme l'on sait, la valeur de c relative aux quantités de l'ordre m^2, ce qui rend très petit le diviseur $3f - 2g - c$, il est donc utile dans la présente recherche, d'avoir égard aux termes de l'ordre m^3 Pour cela, il faut considérer la fonction

$$\frac{3m^2}{2}\cos(2v - 2mv).\left(\frac{s\delta s}{u^2} - \frac{\delta u}{u^3}\right).\frac{dv}{u^2},$$

qui fait partie de l'expression de $-2Q'dt\,.\,r\delta r$.

Si l'on suppose

$$u = 1 + e\,.\cos(cv - \varpi) + A_1^{(1)}\,.\,e\,.\cos(2v - 2mv - cv + \varpi),$$
$$+ B_1^{(0)}\gamma\cos(2v - 2mv - gv + \theta).$$

$A_1^{(1)}$ et $B_1^{(0)}$ ayant les significations que je leur ai données dans le Livre VII, la fonction précédente donnera dans l'expression de

$d.\delta v$, le terme

$$\frac{3}{16}\,.\,m^2 e\gamma^2 dv\,.\,k\sin(3fv-2gv-cv+2\theta+\varpi)\,.\left\{\begin{array}{c}\dfrac{\frac{15}{2}\,A_1^{(1)}}{3f-2g-c-\frac{5}{4}e^2(1-c^2)}\\ -\dfrac{3B_1^{(0)}}{3f-2g-c-\frac{9}{8}m^2\gamma^2}\end{array}\right\}.$$

Considérons le terme $-\dfrac{d(dr\ \delta r)}{dt}$, de l'expression de $d\delta v$ on a

$$dr=e\,.\,dv\,.\,\sin(cv-\varpi),\quad \delta r=-\sqrt{1+s^2}\,.\,\frac{\delta u}{u^2}+\frac{s\ \delta s}{u\sqrt{1+s^2}},$$

le terme $-\dfrac{d\ (dr\,.\,\delta r)}{dt}$, donne ainsi le suivant

$$\frac{3k\ e\gamma^2}{8}\,.\,\frac{d\ \cos(3fv-2gv-cv+2\theta+\omega)}{3f-2g-e-\frac{5}{4}e^2\ (1-c^2)}.$$

L'expression de $d.\delta v$ se rapporte au plan de l'orbite lunaire pour la rapporter au plan même de l'écliptique, il faut, par le Chap II du Livre VII, lui ajouter ce que produit la fonction

$$\frac{1}{2}\,.\left(s^2-\frac{ds^2}{dv^2}\right).\,dv,$$

lorsqu'on y substitue pour s,

$$\gamma\,.\,\sin gv-\frac{3k}{h^6}\,.\,\frac{\gamma e\ \cos(3fv-gv-cv+\theta+\varpi)}{2\,(3f-2g-c)-\frac{9}{4}\ m^2\gamma^2},$$

ce qui produit le terme

$$\frac{3ke\gamma^2}{2}\,.\,\frac{[1-g^2-g\,(3f-2g-c)]\ \sin(3fv-2gv-cv+2\theta+\varpi)}{2\,(3f-2g-c)-\frac{9}{4}m^2\gamma^2}$$

Enfin le terme

$$-\frac{12k\ dt\ \sin\ 3fv}{(1+s^2)^{\frac{3}{2}}\ r^4}$$

de l'expression donnée ci-dessus, de $d.\delta v$, donne en le transformant dans celui-ci

$$-\frac{12\ kdv\ u^2\ \sin\ 3fv}{(1+s^2)^{\frac{7}{2}}},$$

et en y substituant pour u,

$$\sqrt{1+s^2}+e.\cos(cv-\varpi),$$

le terme

$$-9ke\gamma^2.\sin(3fv-2gv-cv+2\theta+\varpi)$$

En réunissant tous les termes de l'expression de $d.\delta v$ rapportée à l'écliptique, et en intégrant, on a

$$\delta v=-\frac{3ke\gamma^2\cos(3fv-2gv-cv+2\theta+\varpi)}{3f-2g-c}\left\{\begin{array}{l}3-\dfrac{\left\{\frac{m^2}{2}-\frac{1}{4}[g^2-1+(3f-2g-c)\,g]-\frac{3B_1^{(0)}}{16}\right\}}{3f-2g-c-\frac{9}{8}m^2\gamma^2}\\ +\dfrac{\frac{3}{4}m^2}{3f-2g-c}-\dfrac{\left(\frac{5}{16}m^2+\frac{15}{32}A_1^{(1)}\right)}{3f-2g-c-\frac{5}{4}e^2(1-c^2)}\end{array}\right\},\quad(8)$$

$$+\frac{\frac{3ke\gamma^2}{8}\cos(3fg-2gv-cv+2\theta+\varpi)}{3f-2g-c-\frac{5}{4}e^2(1-c^2)}$$

Pour réduire cette formule en nombres, on peut observer que par le n° 14 du troisième Livre, le rayon d'une couche du sphéroide terrestre étant exprimé par $a.(1+\alpha y)$, et y etant développé dans une suite de la forme $y^{(0)}+y^{(1)}+y^{(2)}+y^{(3)}+$ etc., $y^{(i)}$ étant assujetti à l'équation

$$0=\left\{\frac{d.\left[(1-\mu^2)\left(\frac{dy^{(i)}}{d\mu}\right)\right]}{d\mu}\right\}+\frac{\left(\frac{ddy^{(i)}}{d\varpi^2}\right)}{1-\mu^2}+i.\overline{i+1}.y^{(i)},$$

on aura par la formule (a) de ce même numéro,

$$H^{(3)}.D^3.U^{(3)}=\frac{4\pi}{7}\alpha.\int\rho.d\ a^6y^{(3)}$$

ρ étant la densité de la couche, la différentielle et l'intégrale étant relatives à la variable a, et cette intégrale étant prise depuis $a=0$, jusqu'à $a=D$. En prenant pour unité de distance, comme nous le faisons, la distance moyenne de la Lune à la Terre, et pour unité de vitesse, la vitesse moyenne de la Lune; la masse de la Terre devient à fort peu près l'unité de masse; or cette masse est à fort peu près $\frac{4\pi}{3}.\int\rho.d.a^3$; on aura donc

$$H^{(3)}.D^3.U^{(3)}=\frac{\frac{3}{7}\alpha\int\rho\ d\ a^6y^{(3)}}{\int\rho\ d.a^3}.$$

On peut négliger ici les termes de $\gamma^{(3)}$ qui dépendent de ϖ, et supposer ainsi

$$\gamma^{(3)} = p \cdot \left(\mu^3 - \frac{3\mu}{5}\right),$$

p étant une fonction de a, alors on a

$$H^{(3)} \cdot D^3 = \frac{\frac{3}{7}\alpha \int \rho \; d.a^6 p}{\int \rho \; d \; a^3},$$

ce qui donne

$$k = \frac{3}{28}\alpha \cdot \frac{\int \rho . d \; a^6 p}{\int \rho . d . a^3} \cdot \sin^3 . \lambda$$

Si la Terre est supposée homogène, ρ et p sont constans, et l'on a

$$3k = \frac{9}{28} . \alpha p . D^3 . \sin^3 \lambda$$

Nous sommes certains par les mesures des degrés terrestres et du pendule, que αp n'est pas $\frac{1}{300}$, $3k$ est donc au-dessous de $\frac{1}{900} . D^3 . \sin^3 \lambda$ Quelle que soit la constitution du sphéroïde terrestre, nous sommes certains que $3k$ est au-dessous de $\frac{1}{100} . D^3 . \sin^3 . \lambda$. On a à fort peu près

$$\frac{1}{3f - 2g - c} = 2445;$$

on a ensuite par le Livre VII,

$$\begin{aligned} c &= 0{,}99154801, \\ m &= 0{,}0748013, & e &= 0{,}05487293, \\ \lambda &= 0{,}0900807, & g &= 1{,}00402175, \\ A_1^{(1)} &= 0{,}201816, & B_1^{(0)} &= 0{,}0282636 \end{aligned}$$

De plus, l'obliquité de l'écliptique est à fort peu près $23^\circ\ 28'$ en degrés sexagésimaux, en supposant donc

$$3k = \frac{1}{100} . D^3 . \sin^3 \lambda,$$

et en observant que par le n° 19 du Livre VII, on a

$$D = 0{,}016655101,$$

on trouve que l'expression de δv, donnée par la formule (b) est insensible et au-dessous d'un millième de seconde

Des inégalités lunaires dépendantes de la partie elliptique du rayon terrestre.

5 J'ai déterminé ces inégalités dans le chapitre II du Livre VII je vais considérer ici quelques quantités auxquelles je n'avais point eu égard Le terme de l'expression de V donnée ci-dessus, qui dépend de la partie elliptique du rayon terrestre, est

$$H^{(2)} \frac{D^2}{r^3} . U^{(2)}$$

On peut supposer ici dans ce terme

$$U^{(2)} = \mu^2 - \tfrac{1}{3};$$

alors, en substituant pour μ, sa valeur

$$\frac{\sin\lambda \ \sin fv + s \ \cos\lambda}{(1+s^2)^{\frac{1}{2}}};$$

on aura dans V le terme

$$2H^{(2)} . \frac{D^2}{r^3} . \frac{\sin\lambda \ \cos\lambda \, . \, s \ \sin fv}{(1+s^2)^{\frac{1}{2}}}$$

Ce même terme pris avec un signe contraire fait partie de l'expression de R, en sorte que l'on pourra supposer ici

$$R = r^2 Q' - 2H^{(2)} . \frac{D^2}{r^3} . \frac{\sin\lambda \ \cos\lambda \ s \ \sin fv}{(1+s^2)^{\frac{1}{2}}},$$

ce qui donne

$$2\delta . r\left(\frac{dR}{dr}\right) = 4\delta . r^2 Q' + 12 . H^{(2)} . \frac{D^2}{r^3} . \frac{\sin\lambda \ \cos\lambda \ s \ \sin fv}{(1+s^2)^{\frac{1}{2}}}$$

En n'ayant égard qu'à l'inégalité de δv, dont la période est celle du retour du nœud lunaire au même équinoxe, on pourra supposer δR, nul, et alors on a

$$\delta . r^2 Q' = 2H^{(2)} . \frac{D^2}{r^3} . \frac{\sin\lambda \ \cos\lambda \ s . \sin fv}{(1+s^2)^{\frac{1}{2}}};$$

on a donc

$$2 \cdot \delta \cdot r\left(\frac{dR}{dr}\right) = 20 \cdot H^{(2)} \cdot \frac{D^2}{r^3} \cdot \frac{\sin\lambda \quad \cos\lambda \quad s \quad \sin fv}{(1+s^2)^{\frac{1}{2}}},$$

et la formule (a) du n° précédent, deviendra

$$d \cdot \delta v = -\frac{d(dr\delta r)}{dt} + \left\{\frac{20 \; H^{(2)} \frac{D^2}{r^3} \cdot \sin\lambda \quad \cos\lambda \cdot s \cdot \sin fv}{(1+s^2)^{\frac{1}{2}}} - 2Q' r\delta r\right\} dt.$$

Le terme

$$\frac{20 \quad H^{(2)} \frac{D^2}{r^3} \quad \sin\lambda \quad \cos\lambda \quad s \quad \sin fv}{(1+s^2)^{\frac{1}{2}}} \cdot dt$$

donne celui-ci, en substituant, comme ci-dessus, $\frac{dv}{u^2}$ ou simplement dv pour dt, et faisant $r = 1$,

$$10 \cdot H^{(2)} \cdot D^2 \cdot \sin\lambda \cdot \cos\lambda \cdot \gamma dv \quad \cos\left(\begin{matrix} gv - fv \\ -\theta \end{matrix}\right).$$

On a par ce qui précède,

$$-2Q' = \frac{m^2}{2} \cdot [1 - 3s^2 + 3(1 - s^2) \cdot \cos(2v - 2mv)],$$

le terme $-2Q' r\delta r \cdot dt$ donnera ainsi le suivant

$$\frac{m^2 dv}{2} [1 + 3 \cdot \cos(2v - 2mv)] \cdot r\delta r \qquad (o).$$

Il faut déterminer la partie de $r\delta r$ qui dépend de $\cos(gv - fv - \theta)$ et qui a pour diviseur $g - f$. Voulant ensuite avoir égard aux termes de l'ordre m^3, il faut déterminer la partie du $r\delta r$ de l'ordre m, qui dépend de $\cos(2v - 2mv - gv + fv - \theta)$, et qui a le diviseur $g - 1$, parce que cette partie étant multipliée par $\cos(2v - 2mv)$, produit un terme de l'ordre m^3, dans la fonction (o) Il faut donc avoir égard aux mêmes parties dans les développemens de $s\delta s$ et δu.

Développons d'abord δs La partie de Q relative aux forces perturbatrices étant $-R$, elle est égale à

$$-r^2 Q' + 2H^{(2)} \cdot D^2 \cdot \frac{\sin\lambda \cos\lambda \quad u^3 \quad s \quad \sin fv}{(1+s^2)^2}$$

En n'ayant égard qu'au second de ces termes, la partie utile de

$$-\frac{1}{h^2u^2}\cdot\frac{ds}{dv}\cdot\left(\frac{dQ}{dv}\right)-\frac{s}{h^2u}\cdot\left(\frac{dQ}{dv}\right)-\frac{(1+ss)}{h^2u^2}\cdot\left(\frac{dQ}{ds}\right)$$

se réduit à très peu près à

$$-2H^{(2)}.\,D^2\,.\,\sin\lambda\,.\,\cos\lambda\,.\,\sin fv.$$

La troisième des équations (L) du n° 1 du Livre VII donne ainsi, en désignant par δs le terme de s qui dépend de fv,

$$o=\frac{dd.\,\delta s}{dv^2}+g'^2\,\delta s-2H^{(2)}.\,D^2.\,\sin\lambda\,.\,\cos\lambda\,.\,\sin fv.$$

g'^2 étant comme dans le n° précédent, égal à $g^2+\frac{9}{4}m^2\gamma^2$, on a donc

$$\delta s=\frac{2H^{(2)}\,D^2\,\sin\lambda\,.\,\cos\lambda\,.\,\sin.\,fv}{g^2-f^2+\frac{9}{4}m^2\gamma^2}.$$

On a à très peu près g^2-f^2 égal à g^2-1, et g^2-1 est assez grand par rapport à $\frac{9}{4}m^2\gamma^2$, pour que l'on puisse négliger ici ce dernier terme, en sorte que l'on a aux quantités près de l'ordre m^2,

$$\delta s=\frac{k'\,.\,\sin fv}{g-1},$$

en faisant

$$k'=H^{(2)}\,.\,D^2.\,\sin\lambda\,.\,\cos\lambda.$$

Pour avoir le terme de s, dépendant de $\sin(2v-2mv-fv)$, on observera que l'on peut considérer l'expression précédente de δs, comme étant relative à une inclinaison de l'orbite lunaire, égale à $\frac{k'}{g-1}$, et dont $(1-f)v$ serait le mouvement du nœud. Or on a vu dans le n° 7 du Livre VII que l'inclinaison γ de l'orbite lunaire produit dans s, en vertu de l'action du Soleil, le terme

$$B_1^{(0)}.\,\gamma\,.\,\sin(2v-2mv-gv+\theta),$$

l'inclinaison $\frac{k'}{g-1}$ produira donc un terme semblable que nous re-

présenterons par

$$\overline{B}^{(0)}.\frac{k'}{g-1}.\sin(2v-2mv-fv);$$

et l'on voit par le n° 7 cité, que l'on peut en négligeant les quantités de l'ordre m^2, supposer $\overline{B}^{(0)}$ égal à $B_1^{(0)}$ Ce résultat auquel conduit la considération de la partie $-r^2Q'$, de l'expression de Q, nous dispense de considérer ici cette partie, nous pouvons ainsi faire

$$\delta s = \frac{k'}{g-1}\left[\sin fv + B_1^{(0)}.\sin(2v-2mv-fv)\right]$$

Déterminons maintenant δu. Pour cela, reprenons la seconde des équations (L) du n° 1 du Livre VII En faisant usage de la valeur précédente de Q, et ne considérant que le dernier terme de cette valeur ; l'intégrale

$$2\int\left(\frac{dQ}{dv}\right).\frac{dv}{u^2}$$

donnera le terme

$$-\frac{2k'\cos(gv-fv-\theta)}{g-1}$$

Ainsi la fonction

$$\left[\left(\frac{ddu}{dv^2}\right)+u\right].\left[1+\frac{2}{2}\int\left(\frac{dQ}{dv}\right)\frac{dv}{u^2}\right]$$

du second membre de la seconde des équations (L) citées, renferme le terme

$$-\frac{2k'\cos(gv-fv-\theta)}{g-1}$$

Le développement de ce second membre renferme encore, comme on l'a dit dans le numéro précédent, le terme $3s\delta s$ Il faut ici substituer pour s,

$$\gamma.\sin(gv-\theta)+B_1^{(0)}\gamma.\sin(2v-2mv-gv+\theta),$$

et pour δs

$$\frac{k'}{g-1}\left[\sin fv + B_1^{(0)}.\sin(2v-2mv-fv)\right],$$

et alors ce terme donne les suivans

$$\frac{3}{2}.\frac{\gamma k'}{g-1}.\cos(gv-fv-\theta)$$

$$-\frac{3}{2}.\frac{k\,B_1^{(0)}\gamma}{g-1}\left[\begin{array}{l}\cos(2v-2mv+gv-fv-\theta)\\ +\cos(2v-2mv-gv+fv+\theta)\end{array}\right]$$

La seconde des équations (L) citée donne donc en négligeant les termes de l'ordre m^2

$$\delta u = -\frac{\gamma k'}{2(g-1)} \cdot \cos(gv - fv - \theta)$$
$$-\tfrac{1}{2} \cdot \frac{k'\gamma}{g-1} B_1^{(0)} \left[\begin{array}{l} \cos(2v - 2mv + gv - fv - \theta) \\ + \cos(2v - 2mv - gv + fv + \theta) \end{array} \right]$$

On a à très peu près,

$$r\delta r = -\delta u + s\delta s,$$

en substituant pour δu et $s\delta s$ leurs valeurs précédentes, on aura

$$r\delta r = 0,$$

l'expression précédente de $d \cdot \delta v$, deviendra donc

$$d \cdot \delta v = -\frac{d.(dr\delta r)}{dt} + 10k'\gamma \cdot dv \cdot \sin(gv - fv - \theta)$$

Il est facile de voir que $\frac{d(dr\delta r)}{dt}$ est ici nul, et qu'ainsi l'on a

$$d \cdot \delta v = 10k'\gamma \cdot dv \cdot \sin(gv - fv - \theta).$$

Cette valeur de $d \cdot \delta v$ se rapporte à l'orbite même de la Lune, et pour la rapporter à l'écliptique, il faut, comme on l'a vu dans le numéro précédent, lui ajouter

$$\tfrac{1}{2} \cdot \delta \cdot \left(s^2 - \frac{ds^2}{dv^2}\right) \cdot dv.$$

Si l'on substitue pour s,

$$\gamma \cdot \sin(gv - \theta) + B_1^{(0)}\gamma \cdot \sin(2v - 2mv - gv + \theta)$$
$$+ \frac{k'}{g-1} \cdot \sin fv + \frac{k'B_1^{(0)}}{g-1} \cdot \sin(2v - 2mv - fv);$$

on aura

$$\tfrac{1}{2} \cdot \left(s^2 - \frac{ds^2}{dv^2}\right) = -\frac{\gamma k'}{2}\left(1 - \frac{4m \cdot B_1^{(0)2}}{g-1}\right) \cdot \cos(gv - fv - \theta)$$

On a, par le n° 14 du livre VII, aux quantités près de l'ordre m^2,

$$B_1^{(0)} = \frac{3m}{8}, \quad g - 1 = \tfrac{3}{4}m^2,$$

on aura donc

$$\tfrac{1}{2}\delta\left(s^2 - \frac{ds^2}{dv^2}\right) = -\tfrac{1}{2}\cdot\gamma k\left(1 - \frac{3m}{4}\right)\cdot\cos(gv - fv - \theta),$$

d'où l'on tire

$$d.\delta v = \frac{19}{2}\cdot\gamma k\left(1 + \frac{3m}{76}\right)\cdot dv\cdot\cos(gv - fv - \theta).$$

En considérant m, e et γ comme des quantités du premier ordre, on voit que ces expressions de δs et de $d.\delta v$ sont approchées aux quantités près de l'ordre m^2. Si l'on rapproche la valeur de δs, de celle qui résulte du second chapitre du Livre VII, on a

$$k = -(\alpha\rho - \tfrac{1}{2}\alpha\varphi)\cdot D^2\cdot\sin\lambda\cdot\cos\lambda,$$

$\alpha\rho$ étant l'ellipticité de la Terre, et $\alpha\varphi$ étant le rapport de la force centrifuge à la pesanteur à l'équateur.

CHAPITRE IV.

Sur la loi de l'attraction universelle.

6. Nommons T et L les masses de la Terre et de la Lune, r le rayon vecteur de la Lune, v sa longitude, s la tangente de sa latitude, x, y, z ses trois coordonnées rapportées au plan de l'écliptique et au centre de la Terre désignons par m' la masse du Soleil; par r' sa distance au centre de la Terre, par x' et y' ses coordonnées rapportées à ce point et à l'écliptique, et par v' sa longitude. Les forces qui sollicitent la Lune, et qui résultent des attractions de la Terre et du Soleil, décomposées parallèlement aux axes des x des y et des z, sont, comme l'on sait, exprimées par les coefficiens de dx, de dy, et de dz, dans la différentielle de la fonction

$$\frac{T}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}+\frac{m'}{\sqrt{(x'-x)^2+(y'-y)^2+z^2}},$$

mais la Terre étant supposée immobile, il faut transporter en sens contraire à la Lune, son action et celle du Soleil sur la Terre. Ces actions décomposées parallèlement aux axes des x, des y et des z, prises avec un signe contraire, sont exprimées par les coefficiens de dx, dy, dz, dans la différentielle de la fonction

$$-\frac{L}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}+\frac{m'(xx'+yy')}{r'^3}.$$

Ainsi en nommant V la fonction

$$\frac{T+L}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}+\frac{m'}{\sqrt{(x'-x)^2+(y'-y)^2+z^2}}-\frac{m^2(xx'+yy')}{r'^3},$$

les forces dont la Lune est animée dans son mouvement relatif autour de la Terre, sont

$$\left(\frac{dV}{dx}\right), \quad \left(\frac{dV}{dy}\right), \quad \left(\frac{dV}{dz}\right);$$

en sorte que les trois équations différentielles de ce mouvement, sont

$$o = \frac{ddx}{dt} - \left(\frac{dV}{dx}\right), \quad o = \frac{ddy}{dt^2} - \left(\frac{dV}{dy}\right), \quad o = \frac{ddz}{dt^2} - \left(\frac{dV}{dz}\right),$$

dt étant l'élément du temps, supposé constant.

Si l'on suppose que le Soleil attire différemment la Lune et la Terre, alors il faudra donner à m', dans le dernier terme de l'expression de V, une valeur différente de celle du second terme, en représentant donc par $\delta m'$ cette différence; il faudra ajouter à la fonction V, le terme

$$-\frac{\delta m'(xx' + yy')}{r'^3}$$

Examinons l'influence de ce terme, sur le mouvement de la Lune on a

$$x = \frac{r \cos v}{\sqrt{1 + s^2}}, \quad y = \frac{r \sin v}{\sqrt{1 + s^2}}, \quad z = \frac{rs}{\sqrt{1 + s^2}}$$

La fonction V devient ainsi, en la réduisant en série par rapport aux puissances descendantes de r',

$$V = \frac{T + L}{r} + \frac{m'}{r'} \cdot \left\{ \begin{array}{l} 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{r^2}{r'^2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{r^2 \cos^2(v - v')}{r'^2(1 + s^2)} \\ - \frac{3}{2} \cdot \frac{r^3 \cos(v - v')}{r'^3(1 + s^2)} + \frac{\frac{5}{2} r^3 \cos^3(v - v')}{r'^3 (1 + s^2)^{\frac{3}{2}}} + \text{etc.} \end{array} \right\}$$
$$- \frac{\delta m' . r \cos(v - v)}{r'^2 . \sqrt{1 + s'^2}}$$

Le terme multiplié par $\cos(v - v')$, de cette série, produit dans le mouvement lunaire, l'inégalité que l'on nomme *inégalité parallactique*. Il résulte des diverses théories de la Lune, et spécialement de celle que j'ai donnée dans le Livre VII, que le coefficient de cette inégalité est à fort peu près proportionnel au coefficient de $\cos(v - v')$ dans le développement de V, en sorte que si l'on nomme A le coefficient de cette inégalité, donné par ma théorie de la Lune; l'indéter-

minée $\delta m'$, en retranche une quantité qui est à A, à très peu près, comme

$$\delta m' \cdot \frac{r}{r'^2} \text{ est à } \frac{15}{8} \cdot \frac{m' r^3}{r'^4 (1+s^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3}{2} \cdot \frac{m' r^3}{r'^4};$$

en négligeant donc le carré de s, l'indéterminé $\delta m'$ diminuera le coefficient A, de la quantité

$$\frac{8}{3} \cdot \frac{\delta m'}{m'} \cdot \frac{r'^2}{r^2} \text{A}$$

En comparant le coefficient A, à celui que les observations donnent, on en conclut le rapport $\frac{r}{r'}$, ou le rapport de la parallaxe solaire à la parallaxe lunaire; ce qui donne la parallaxe solaire, puisque la parallaxe lunaire est bien connue. Je trouve ainsi, en secondes sexagésimales 8″,585 pour la parallaxe du Soleil, ce qui ne diffère pas d'un dixième de secondes, de la valeur de cette parallaxe, déterminée par les passages de Vénus sur le Soleil, observés en 1761 et 1769. Il est donc bien certain que le coefficient A de ma théorie de la Lune, ne diffère pas de la vérité, d'un huitième de secondes; et qu'ainsi la quantité

$$\frac{8}{3} \cdot \frac{\delta m'}{m'} \cdot \frac{r'^2}{r^2} \cdot \text{A}$$

est au-dessous de $\frac{\text{A}}{8}$, ce qui donne $\frac{\delta m'}{m'}$ moindre que $\frac{3}{64} \cdot \frac{r^2}{r'^2}$. On a, à très peu près $\frac{r}{r'} = \frac{1}{400}$, donc on a

$$\frac{\delta m'}{m'} < \frac{1}{3410000}$$

Ainsi l'égalité d'action du Soleil sur la Terre et sur la Lune, est prouvée par l'inégalité parallactique, d'une manière beaucoup plus précise encore, que l'égalité de l'attraction terrestre sur les corps placés au même point de sa surface, ne l'est par les expériences du pendule

Je vais maintenant considérer l'influence qu'une diminution de l'attraction par l'interposition des corps aurait sur les phénomènes

L'attraction d'une molécule se répand comme la lumière d'une molécule lumineuse, de manière que si l'on conçoit une sphère imma-

térielle indéfinie dont elle soit le centre, l'attraction d'un instant, en parvenant aux couches de la sphère, restera toujours la même sur chaque couche, mais elle sera pour chacun des points de la couche, affaiblie en raison du carré du rayon de cette couche. Si elle s'éteint comme la lumière, par l'interposition d'un milieu, sa quantité répandue sur chaque couche, à mesure qu'elle y parvient, diminuera sans cesse, et sur un point quelconque de la couche, elle diminuera dans un plus grand rapport que le carré de la distance à la molécule attirante

Pour avoir la loi de cette diminution, je nommerai A la quantité de l'attraction de la molécule, répandue sur la surface de la couche dont je désignerai le rayon par r. Sur la couche suivante, dont le rayon est $r+dr$, la quantité de cette attraction serait encore A, si une partie ne s'éteignait pas en passant d'une couche à l'autre Or il est visible que cette extinction est proportionnelle à A, on aura donc

$$dA = -\alpha A dr,$$

α étant une constante, si le milieu reste le même, comme nous le supposerons ici. On a ainsi en intégrant

$$A = H\ c^{-\alpha r},$$

H étant une constante arbitraire, et c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité Si l'on divise A par la surface $4\pi . r^2$ de la couche, π étant le rapport de la circonférence au diamètre, on aura l'attraction de la molécule sur un point placé à la distance r. En exprimant donc par dm, la masse de la molécule, on pourra représenter par

$$\frac{dm}{r^2} . c^{-\alpha r},$$

son action sur un point placé à la distance r

Je supposerai αr assez petit pour que l'on ait à très peu près

$$c^{-\alpha r} = 1 - \alpha r,$$

et alors l'attraction précédente devient

$$\frac{dm}{r^2} . (1 - \alpha r).$$

Je vais maintenant déterminer d'après cette loi, l'attraction d'une sphère homogène dont le rayon est R sur un point P extérieur dont r est la distance au centre de la sphère; et je supposerai r très grand par rapport à R.

Soit f la distance à P, d'une molécule dm de la sphère Soit q la partie de f, interceptée entre cette molécule et la surface de la sphère Il est facile de voir que l'attraction de la molécule dm sur P sera

$$\frac{dm}{f^2}.(1 - \alpha q)$$

Cette attraction décomposée parallèlement à r sera

$$\frac{dm \cos V}{f^2}.(1 - \alpha q),$$

V étant l'angle que f forme avec r, et qui est supposé très petit. La somme de toutes les quantités $\frac{dm.\cos V}{f^2}$, exprime l'attraction de la sphère entière sur le point P, lorsque α est nul; et cette attraction est, comme l'on sait, égale à la masse de la sphère, divisée par r^2, elle est donc

$$\frac{\frac{4}{3}\pi \ R^3}{r^2};$$

π étant la circonférence dont le diamètre est l'unité

Pour avoir la somme de toutes les quantités $-\frac{\alpha q.dm.\cos V}{f^2}$, nous observerons que α étant très petit ainsi que V, et f différant extrêmement peu de r; on peut supposer ici $\cos V = 1$, et $f = r$; ce qui réduit la quantité précédente à celle-ci :

$$-\frac{\alpha q.dm}{r^2}.$$

La ligne q peut être supposée parallèle à r; en nommant donc u la distance mutuelle de ces deux lignes, et ϖ l'angle formé par un plan fixe passant par r, et par un autre plan passant par r et par q; on aura

$$dm = udu.d\varpi.dq;$$

ce qui donne

$$-\frac{\alpha}{r^2}.\int qdm = -\frac{\alpha}{r^2}.\int udu.d\varpi.qdq.$$

Les intégrales doivent être prises depuis $\varpi = 0$, jusqu'à $\varpi = 2\pi$; depuis $q = 0$, jusqu'à $q = 2Q$, $2Q$ étant la partie de la droite f comprise dans la sphère, enfin depuis $u = 0$, jusqu'à $u = R$. Il est visible que $Q^2 = R^2 - u^2$, on aura ainsi

$$-\frac{\alpha}{r^2} \cdot \int q dm = -\frac{\alpha\pi \cdot R^4}{r^2};$$

l'attraction de la sphère sur le point P sera donc

$$\frac{4\pi}{3} \cdot \frac{R^3}{r^2}\left(1 - \frac{3}{4}\alpha R\right).$$

La réaction étant toujours égale à l'action, il est facile de voir que l'action de P sur le centre de la sphère, sera

$$\frac{P}{r^2} \cdot \left(1 - \frac{3}{4}\alpha R\right),$$

P étant la masse du point.

Imaginons maintenant que ce point soit le Soleil, et que la sphère dont nous venons de parler soit la Terre; concevons ensuite que la Lune soit une sphère homogène dont R′ soit le rayon,

$$\frac{P}{r^2} \cdot \left(1 - \frac{3}{4}\alpha' R'\right)$$

sera l'attraction du Soleil sur le centre de la Lune, à la distance r du Soleil, α' étant pour la Lune, ce qu'est α pour la Terre. La différence des actions du Soleil sur la Lune et sur la Terre sera donc

$$\frac{\frac{3}{4}P}{r^2}(\alpha R - \alpha' R')$$

En faisant $\alpha' = \alpha$, cette différence devient

$$\frac{3P}{4r^2} \cdot \alpha(R - R')$$

On ne peut pas, par ce qui précède, supposer $\alpha(R - R')$ plus grand que $\frac{1}{1000000}$; αR est donc une fraction moindre que $\frac{1}{1000000}$, c'est-à-dire que la force attractive de la molécule placée au centre de la

Terre, sur un point de sa surface, n'est pas diminuée d'un millionième, par l'interposition des couches terrestres

L'attraction d'une molécule dm d'une sphère homogène dont le rayon est R, sur un point de sa surface dont elle est distante de f, est par ce qui précède,

$$\frac{dm}{f^2}(1 - \alpha f);$$

l'attraction de la sphère entière sur ce point, est donc la même que si la loi de l'attraction était $\frac{1}{f^2} - \frac{\alpha}{f}$. Par le Livre XII on a, pour cette attraction,

$$\frac{4}{3}\pi . R\left(1 - \frac{3}{4}\alpha R\right)$$

L'attraction de la Terre que nous supposerons être la sphère dont il s'agit, sur ce point placé à la distance r du centre de la Lune, sera par ce qui précède,

$$\frac{4}{3}\pi . \frac{R^3}{r^2}\left(1 - \frac{3}{4}\alpha R\right),$$

mais relativement au centre de la Lune dont le rayon est supposé R′, l'attraction de la Terre sera par ce qui précède,

$$\frac{4}{3}\pi . \frac{R^3}{r^2}\left(1 - \frac{3}{4}\alpha R\right)\left(1 - \frac{3}{4}\alpha' R'\right),$$

elle est donc diminuée par l'interposition des couches lunaires, de sa valeur multipliée par la fraction $\frac{3}{4}\alpha' R'$. Si cette fraction n'étant pas extrêmement petite, elle deviendrait sensible dans la parallaxe lunaire

CHAPITRE V.

DU MOUVEMENT DES SATELLITES DE JUPITER.

Notice historique des travaux des Astronomes et des Géomètres sur cet objet.

7. Galilée découvrit le 7 janvier 1610, les quatre satellites de Jupiter. Il détermina ensuite au moyen de leurs configurations, leurs distances au centre de Jupiter et les durées de leurs révolutions; ce que firent également plusieurs astronomes ses contemporains. Ces élémens, quoique déterminés par ce moyen imparfait, suffirent pour faire reconnaître à Képler, que le beau rapport qu'il avait trouvé entre les carrés des temps des révolutions des planètes et les cubes de leurs distances moyennes au centre de leurs mouvemens, existe dans le système des satellites de Jupiter. Mais ce fut par les observations de leurs éclipses, que l'on découvrit les inégalités de leurs mouvemens.

Le premier résultat qu'on ait obtenu par ce moyen, est la propagation de la lumière. Roëmer observa que les éclipses du premier satellite avancent vers les oppositions de Jupiter, et retardent vers ses conjonctions. Il expliqua en 1675 cette différence, par la différence des temps que la lumière du satellite emploie à parvenir à l'observateur, dans les diverses distances de Jupiter à la Terre. Cette explication de Roëmer éprouva quelques objections fondées sur ce qu'elle ne paraissait pas indiquée par les éclipses des autres satellites, où il était difficile de la reconnaître parmi leurs nombreuses inégalités qui

n'étaient pas encore connues, mais ensuite elle fut généralement admise, et Bradley fonda sur elle, sa théorie de l'aberration des astres.

Bradley indiqua le premier la principale inégalité du retour des éclipses du premier satellite, dont la période est de 437 jours. Il reconnut qu'il existe dans les retours des éclipses du second satellite, une inégalité dont la période est la même

Wargentin, dans les Mémoires d'Upsal pour l'année 1743, a développé ces inégalités, et il en a reconnu une pareille dans le mouvement du troisième satellite. Il avait encore remarqué dans le mouvement de ce dernier astre, deux équations du centre; mais ensuite il les a réduites à une seule équation d'une excentricité variable. Enfin Bradley reconnut en 1717, l'ellipticité de l'orbe du quatrième satellite. Telles sont les inégalités des satellites que les astronomes ont déterminées par les observations, avant que le principe de la pesanteur universelle eût été appliqué à leurs mouvemens.

Le retour des éclipses et leurs durées dépendant surtout de la position des orbites des satellites sur celle de Jupiter, les astronomes se sont spécialement occupés de l'inclinaison de ces orbites, et du mouvement de leurs nœuds, mais les variations de ces élémens sont si compliquées, qu'ils n'ont donné que des moyens empiriques et très imparfaits, pour les représenter Ils ont trouvé que l'on pouvait supposer fixes à très peu près, l'inclinaison et le nœud de l'orbite du premier satellite. L'inclinaison de l'orbite du second satellite leur a paru variable, dans une période de 30 ans environ le nœud leur a paru fixe, ou n'avoir qu'un très petit mouvement. Ils ont supposé l'inclinaison de l'orbite du troisième satellite, variable dans une période d'environ 132 ans, et le nœud fixe. Enfin, ils ont supposé fixe l'inclinaison de l'orbite du quatrième satellite, et le mouvement du nœud, direct et d'environ quatre minutes sexagésimales par année. L'incertitude de ces suppositions que les observations ultérieures ont obligé de modifier, faisait sentir la nécessité d'éclairer tous ces phénomènes, par l'application du principe de la pesanteur universelle qui devait en recevoir une grande confirmation. Déjà Bradley et Wargentin avaient attribué l'inégalité de 437 jours, aux attractions mutuelles des trois premiers satellites, mais ce n'était de leur part qu'un simple aperçu dénué de tout calcul. Dans la proposition 66 du premier Livre des

Principes, Newton s'est occupé des perturbations du mouvement de plusieurs petits corps qui circulent autour d'un grand corps. Il trouve que le corps le plus intérieur se meut plus vite dans sa conjonction et dans son opposition au corps extérieur, que dans les quadratures. Il a de plus étendu aux satellites, dans le troisième Livre, quelques-uns des résultats de sa théorie lunaire Mais ce ne fut qu'en 1766 que l'on appliqua l'analyse au mouvement des satellites de Jupiter, l'Académie des Sciences ayant proposé la théorie de ces mouvemens, pour le sujet du prix de Mathématiques de cette année

Lagrange auteur de la pièce couronnée, y donne les équations différentielles du mouvement de ces astres, en ayant égard à leur action mutuelle, à l'attraction du Soleil et à l'ellipticité du sphéroide de Jupiter Il les intègre d'abord, en négligeant les excentricités et les inclinaisons des orbites, et il parvient aux inégalités dépendantes de l'élongation mutuelle des satellites, et d'où résultent dans le retour des éclipses des trois premiers, les inégalités dont la période est de 437^{jours}, et que Bradley et Wargentin avaient découvertes Lagrange considère ensuite les inégalités dépendantes des excentricités et des inclinaisons des orbites Ici se présentait à l'analyste, une grande difficulté dont le dénoûment donne l'explication des phénomènes singuliers observés par les astronomes, sans qu'ils en aient pu reconnaître les lois Cette difficulté s'était déjà présentée à Euler et à Lagrange dans la théorie de Jupiter et de Saturne. J'ai développé dans le premier chapitre du livre précédent, la manière dont ces deux grands géomètres l'avaient résolue. La méthode dont Lagrange a fait usage pour cet objet, dans la théorie des satellites de Jupiter, est celle qu'il avait employée dans sa théorie de Jupiter et de Saturne. Elle consiste à regarder comme autant de variables, les termes des équations différentielles, qui par l'intégration acquièrent des diviseurs de l'ordre des forces perturbatrices, et à former entre les termes correspondans du rayon vecteur, de la longitude, et ces nouvelles variables, autant d'équations différentielles linéaires à coefficiens constans. En les intégrant, Lagrange obtient pour chaque satellite, quatre équations du centre En appliquant la même analyse, aux équations différentielles de la latitude, il obtient pour chaque satellite, quatre équations principales de la latitude, et pour les représenter, il imagine quatre plans dont le premier se meut sur l'orbite de Jupiter, le second se meut sur

le premier, le troisième sur le second, enfin le quatrième qui est celui de l'orbite du satellite, se meut sur le troisième. Mais ce grand géomètre ayant supposé que l'équateur de Jupiter est dans le plan de l'orbite de Jupiter, a fait disparaître par cette supposition, les termes dus à l'inclinaison de cet équateur sur l'orbite de la planète, et dont dépendent principalement les singuliers phénomènes aperçus par les astronomes dans le mouvement des orbites des satellites

Lorsque Lagrange s'occupait de ces recherches, Bailli appliquait au mouvement des satellites de Jupiter les formules que Clairaut avait données dans sa Théorie de la Lune Il reconnut les inégalités dont la période était de 437 jours, mais cette théorie ne pouvait pas lui donner les quatre équations du centre que Lagrange avait obtenues par son analyse.

Mes premières recherches sur les satellites de Jupiter ont eu pour objet, les rapports que présentent les trois premiers satellites de Jupiter, et qui consistent en ce que 1°. le moyen mouvement du premier satellite, plus deux fois celui du troisième est égal à trois fois celui du second, 2° la longitude moyenne du premier satellite, plus deux fois celle du troisième, est égale à trois fois la longitude du second, plus la demi-circonférence. L'approximation avec laquelle les mouvemens observés de ces astres satisfont à ces lois, depuis leur découverte, en indiquait l'existence avec une vraisemblance extrême. J'en cherchai donc la cause dans l'action mutuelle des trois satellites. L'examen approfondi de cette action me fit voir qu'il a suffi qu'à l'origine, les rapports des moyens mouvemens séculaires aient approché de la première de ces lois dans de certaines limites, pour que cette action ait établi ces deux lois et les maintienne en vigueur. Si par exemple, à un instant quelconque que l'on peut toujours prendre pour l'origine des mouvemens, l'angle formé par le moyen mouvement séculaire du premier satellite, moins trois fois celui du second, plus deux fois celui du troisième, a été compris entre les limites, plus ou moins vingt circonférences, l'action mutuelle des trois satellites a fini par rendre cet angle nul Or on voit dans le n° 29 du livre VIII, que Delambre a trouvé par un très grand nombre d'éclipses observées, qu'en 1700, ce même angle n'a pas excédé deux secondes sexagésimales; la première des deux lois précédentes est donc

rigoureuse. Il en résulte, suivant la théorie, que l'angle formé par la longitude moyenne du premier satellite, moins trois fois celle du second, plus deux fois celle du troisième, est ou nul ou égal à la demi-circonférence, et l'on conclut des distances moyennes de ces trois corps au centre de Jupiter, que le second cas est celui qui a lieu dans la nature. C'est, en effet, ce que l'observation confirme; car on voit par le numéro cité du Livre VIII, que Delambre a trouvé qu'en 1750, cet angle était au-dessous de soixante-quatre secondes sexagésimales Ce savant astronome a donc assujetti ses tables aux deux lois précédentes qui ne sont altérées ni par les equations séculaires des satellites, ni par la résistance des milieux éthérés Ces équations séculaires se modifient par l'action mutuelle de ces astres, de manière que l'équation séculaire du premier satellite, plus deux fois celle du troisième est égale à trois fois celle du second. En vertu de ces lois, les inégalités du retour des éclipses, dont la période est de 437^{jours}, seront toujours les mêmes

Ces lois déterminent deux des dix-huit constantes arbitraires que renferme nécessairement la théorie du mouvement des trois premiers satellites; il faut donc qu'elles soient remplacées par deux autres arbitraires Elles le sont en effet, par une oscillation de l'angle formé par la longitude du premier satellite, moins trois fois celle du second, plus deux fois celle du troisième, angle que je nomme par cette raison, *libration* des trois premiers satellites. Cette oscillation est analogue à celle d'un pendule qui ferait une oscillation en 1135^{jours}. L'étendue de l'oscillation et l'instant où elle commence sont les deux arbitraires qui remplacent celles que les lois précédentes font disparaître Mais Delambre n'a pu reconnaître par les observations, l'existence de cette oscillation; ce qui prouve qu'elle est insensible. Il est vraisemblable qu'à l'origine, des causes particulières l'ont anéantie, ainsi que la libration du grand axe du sphéroïde lunaire, qui remplace les deux arbitraires que l'égalité des mouvemens moyens de rotation et de révolution de la Lune fait disparaître

Les recherches précédentes ont paru dans le volume des Mémoires de l'Académie des Sciences, de l'année 1784, et qui a été publié en 1787; elles m'ont fait reprendre toute la théorie des satellites de Jupiter, que les travaux des astronomes et des géomètres laissaient, comme on l'a vu, très imparfaite. Il était nécessaire pour en tirer des

es exactes de leurs mouvemens, d'y faire entrer un grand nombre considérations nouvelles, soit pour démêler toutes les inégalités qui ennent sensibles par les intégrations, soit pour reconnaître l'inance réciproque de ces diverses inégalités C'est ainsi qu'en appliit à ces astres, les formules très simples des variations séculaires élémens elliptiques, que j'avais trouvées auparavant; j'ai reconnu uence qu'avaient sur ces variations les grandes inégalités dont la période dans le retour des éclipses est de 437 jours J'ai reconnu pareillement l'influence de la libration des trois premiers satellites, sur leurs inégalités à longues périodes, telles que l'inégalité dépendante de l'équation du centre de Jupiter

Un des élémens les plus importans de la théorie des éclipses des satellites, est la position de leurs orbites sur celle de Jupiter Il est indispensable pour la déterminer, d'avoir égard à l'inclinaison de l'équateur de cette planète, inclinaison dont les phénomènes singuliers observés par les astronomes dépendent principalement. L'analyse m'a conduit à ce résultat remarquable. Pour avoir la position de l'orbite d'un satellite sur celle de Jupiter, on doit imaginer cinq plans dont le premier fixe à très peu près, passe entre l'équateur et l'orbe de Jupiter, par leur intersection, et en conservant sur eux, une inclinaison à très peu près constante; le second plan se meut uniformément sur le premier auquel il est toujours incliné d'une quantité constante; le troisième plan se meut de la même manière sur le second, le quatrième plan se meut semblablement sur le troisième; enfin le cinquième plan qui est celui de l'orbite même du satellite se meut de la même manière sur le quatrième. Ces plans fixes ne sont pas les mêmes pour les quatre satellites celui de chaque satellite est d'autant moins incliné à l'équateur, que le satellite est plus près de la planète. La même chose a lieu pour la Lune Son inégalité en latitude dépendante de l'aplatissement de la Terre, vient de ce que le plan de son orbite, au lieu de se mouvoir uniformément sur l'écliptique, se meut uniformément sur un plan incliné d'environ huit secondes sexagésimales sur l'écliptique et qui passe constamment par les équinoxes, entre l'écliptique et l'équateur. C'est encore ainsi que l'anneau de Saturne et ses premiers satellites sont retenus à fort peu près dans le plan de l'équateur de cette planète.

L'axe du cône d'ombre dans lequel les satellites de Jupiter sont

plongés pendant leurs éclipses, étant le prolongement du rayon vecteur de cette planète ; il est visible que pour calculer ces éclipses, il faut connaître la position de ce rayon et par conséquent le mouvement de Jupiter. Delambre a construit d'après ma théorie de Jupiter et de Saturne, des tables de ce mouvement, que M Bouvard a encore perfectionnées.

Après avoir formé les expressions analytiques des mouvemens des satellites de Jupiter, il restait à déterminer par les observations, trente-une inconnues, savoir les vingt-quatre constantes arbitraires introduites par les intégrations, les masses de ces astres, l'aplatissement de Jupiter, l'inclinaison de l'équateur de Jupiter à l'orbite de cette planète et la position des nœuds de cet équateur Ce travail immense a été exécuté par Delambre qui a discuté pour cet objet, toutes les observations d'éclipses des satellites de Jupiter, et dont le nombre était d'environ six mille. Il a construit de nouvelles tables de ces astres, dont tout empirisme est banni leur exactitude les a fait généralement adopter, et elles sont un des principaux titres de ce savant illustre à la reconnaissance des astronomes.

Depuis la publication de ces tables, j'ai recherché l'influence que les grandes inégalités de Jupiter ont sur le mouvement de ses satellites. Je vais présenter ici l'analyse que j'ai employée, et les résultats que j'ai obtenus.

CHAPITRE VI.

De l'influence des grandes inégalités de Jupiter sur les mouvemens de ses satellites.

8. Pour déterminer cette influence, je reprends l'expression des perturbations en longitude, donnée par la formule (2) du n° 2 du Livre VIII. Il est facile de voir que dans cette expression, le terme

$$\frac{2a}{\mu} \cdot \int ndt \cdot r\left(\frac{dR}{dr}\right)$$

est le seul qui puisse donner une inégalité sensible, dépendante de la grande inégalité de Jupiter. Dans ce terme, a est la distance moyenne du satellite à Jupiter, nt est son moyen mouvement; r est son rayon vecteur, et μ est la masse de Jupiter. Par le n° 1 du même Livre, l'expression de R contient le terme $\frac{-Sr^2}{4r'^3}$, S étant la masse du Soleil, et r' étant le rayon vecteur de Jupiter. C'est le seul terme à considérer ici, on a donc

$$\frac{2a}{\mu} \cdot \int ndt \cdot r\left(\frac{dR}{dr}\right) = \frac{-aS}{\mu} \cdot \int \frac{ndt \cdot r^2}{r'^3}.$$

La partie de la variation de r', dépendante de la grande inégalité de Jupiter, est par le n° 23 du Livre X,

$$-0{,}002008 \cdot \cos(n't + \varepsilon' - x)$$
$$-0{,}000264 \cdot \cos(x + 48^\circ{,}27);$$

$n't + \varepsilon'$ est la longitude moyenne de Jupiter, et l'on a

$$x = 5n't + 5\varepsilon' - 2n't - 2\varepsilon - 61^\circ{,}77$$

$n^{v}t + \varepsilon^{v}$ est la longitude moyenne de Saturne, et les degrés sont centésimaux Nous pouvons donc ici réduire l'expression du rayon vecteur de Jupiter du n° 23 du Livre cité, à la suivante,

$$\begin{aligned} r^{iv} = 5{,}208735 &- 0{,}249994 \,.\, \cos(n^{iv}t + \varepsilon^{iv} - \varpi^{iv}) \\ &- 0{,}002008 \,.\, \cos(n^{iv}t + \varepsilon^{iv} - x) \\ &- 0{,}000264 \,.\, \cos(x + 48^{\circ},27). \end{aligned}$$

Or on a

$$\frac{\mu}{a^3} = n^2$$

$$\frac{S}{a^{iv3}} = n^{iv};$$

le terme $-\frac{a}{\mu} \cdot \int \frac{ndt.r^2}{r^{iv3}}$, donne donc le suivant

$$\frac{-3n^{iv2}}{n\,.\,(5n^{v} - 2n^{iv})} \left\{ \begin{aligned} &\frac{0{,}000264}{5{,}208731} \,.\, \sin.(x + 48^{\circ},27) \\ &+ \frac{2.0{,}249994\ 0{,}002008}{(5{,}208735)^2} \,.\, \sin(x - \varpi^{iv}) \end{aligned} \right\};$$

ce qui donne relativement au quatrième satellite, l'inégalité

$$-44'',334 \,.\, \sin(x + 23^{\circ},41)$$

Les trois premiers satellites sont assujettis à des inégalités semblables; mais leur période étant fort longue, leurs coefficiens sont modifiés par l'action mutuelle de ces corps, et ils deviennent relativement au premier, au second et au troisième

$$-0'',994, \quad -12'',847, \quad -18'',774$$

CHAPITRE VII.

DES SATELLITES DE SATURNE ET D'URANUS

9. Huygens découvrit en 1655, le sixième des satellites de Saturne. Quelques années après, Dominique Cassini découvrit successivement le troisième, le quatrième, le cinquième et le septième Enfin Herschel découvrit en 1789, le premier et le second. On a déterminé les moyens mouvemens de ces astres et leurs distances moyennes au centre de Saturne, et l'on a reconnu entre les cubes de ces distances et les carrés des temps des révolutions, le beau rapport que Képler avait trouvé entre les mêmes quantités relatives aux planètes Mais comme on n'a pas à l'égard de ces astres, le secours des observations de leurs éclipses, on est loin de connaître toutes les inégalités de leurs mouvemens : seulement, on a reconnu que l'orbe du sixième satellite est elliptique M. Bessel dans le Journal de Gotha pour l'année 1811. a trouvé son excentricité égale à 0,0488759. Tous ces corps ont paru se mouvoir dans le plan de l'anneau, à l'exception du sixième et principalement du septième. Jacques Cassini a observé que l'orbite du septième s'écarte très sensiblement de ce plan. Il a publié dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour l'année 1714, ses observations d'après lesquelles il a estimé que cette orbite est inclinée au plan de l'anneau, d'environ 15 à 16 degrés sexagésimaux, et que ses nœuds avec l'écliptique s'écartent vers l'Occident de 17 degrés, des nœuds de l'anneau. Il a terminé son Mémoire par le passage suivant que je rapporte à cause de son analogie avec la véritable explication de ce phénomène.

« La situation des nœuds du cinquième satellite (*), et l'inclinaison

(*) Maintenant le septième.

» de son orbe qui sont si différentes de celles des autres, semblent dé-
» ranger l'économie du système des satellites qu'on avait cru jusqu'à
» présent avoir tous, les mêmes nœuds et être à peu près dans un
» même plan Cependant, il paraît qu'on peut en rendre aisément la
» raison physique, si l'on fait attention à la grande distance de ce sa-
» tellite au centre de Saturne, car l'effort qui entraîne les satellites
» suivant la direction du plan de l'anneau s'affaiblit en s'éloignant
» de Saturne, et est obligé de céder à un autre effort qui emporte
» Saturne et toutes les planètes suivant l'écliptique. Ces deux efforts
» agissant sur le cinquième satellite suivant des directions inclinées
» l'une à l'autre de 31 degrés, il résulte qu'il doit faire son cours
» suivant une direction moyenne entre le plan de l'anneau et celui
» de l'écliptique. Il paraît même que selon ce raisonnement, les plans
» des orbes des autres satellites doivent un peu décliner du plan de
» l'anneau, quoique beaucoup moins que celui du cinquième satellite,
» ce qui nous a paru s'accorder à quelques observations »

Cassini n'assigne point les causes des deux efforts qu'il suppose, mais la théorie de la pesanteur universelle donne ces deux causes. La première est l'attraction de la protubérance de l'équateur de Saturne, produite par la rotation de cette planète. Cette attraction maintient l'anneau et les premiers satellites à peu près dans le plan de cet équateur, et s'affaiblit très rapidement, quand les distances moyennes des satellites sont plus grandes La seconde cause est l'attraction du Soleil sur les satellites, qui tend à les abaisser sur le plan de l'orbite de leur planète En vertu de ces causes, l'orbite de chaque satellite se meut sur un plan qui passe entre l'équateur et l'orbite de Saturne par leur intersection, et qui s'écarte d'autant plus du plan de l'anneau, que le satellite est plus éloigné

M Bessel dans le Journal cité, a trouvé l'inclinaison de l'orbite du sixième satellite, plus petite que celle de l'anneau, d'environ deux degrés J'ai déterminé dans le huitième Livre, l'inclinaison et le mouvement du nœud de l'orbe du septième satellite, en employant principalement les observations faites par Bernard à Marseille, en 1787 Mais ces observations et toutes celles que l'on à faites sur ces satellites sont imparfaites et peu nombreuses. Les astronomes se sont peu occupés de ce genre d'observations qui cependant offrent beaucoup d'intérêt par elles-mêmes, et par la lumière qu'elles doivent répandre

sur les masses de l'anneau et des satellites, et sur l'aplatissement du sphéroide de Saturne

Herschel découvrit en 1787 six satellites à la planète Uranus qu'il avait découverte en 1781. Les deux premiers qu'il ait vus, sont dans l'ordre des distances, le second et le quatrième. Ces deux satellites ont été aperçus par d'autres astronomes, ainsi leur existence ne doit laisser aucun doute L'existence de quatre autres ne paraît pas aussi certaine Les heureux essais que l'on vient de faire pour augmenter le pouvoir des lunettes astronomiques, donnent lieu d'espérer que l'on aura bientôt les moyens de suivre avec autant d'exactitude que de facilité, les mouvemens de ces astres. Ils paraissent se mouvoir dans un plan presque perpendiculaire à l'écliptique, ce qui indique dans la planète, un mouvement rapide de rotation autour d'un axe presque parallèle à l'écliptique.

Ces satellites obéissent à la loi de Képler, suivant laquelle les carrés des temps des révolutions sont proportionnels aux cubes des moyennes distances C'est ce que l'on a vérifié par l'observation à l'égard des deux satellites premièrement découverts. On en a conclu la masse d'Uranus égale à $\frac{1}{19504}$, de celle du Soleil M Bouvard a trouvé cette masse égale à $\frac{1}{17918}$, au moyen des perturbations du mouvement de Saturne par l'action d'Uranus La différence de ces deux valeurs paraîtra bien peu considérable, si d'une part, on considère l'incertitude des mesures des plus grandes élongations de ces satellites, et l'ignorance où nous sommes des excentricités de leurs orbites; et si d'une autre part, on considère la petitesse des perturbations dues à l'action d'Uranus.

FIN DU XVIe ET DERNIER LIVRE.

Errata du cinquième volume

Page 248, avant-dernière ligne, après le mot facteur, *ajoutez* l'unité divisée p

250, ligne 7, au lieu de Méchin *lisez* Machin

251, ligne 2, même correction.

252, ligne 1, *effacez ces mots* par rapport à l'équinoxe

278, ligne 13, *effacez les mots* parallélisme de

289, ligne 4, au lieu de seconde *lisez* minute

318, ligne 5 en remontant, au lieu de molécule attirante *lisez* molecule perturbatrice attirante

350, dans la note, au lieu de Hooek *lisez* Hook

368, ligne 12, au lieu de somme produit *lisez* somme des produits

369, ligne 4 en remontant, au lieu de vecteurs *lisez* osculateurs

387, ligne 19, au lieu de grand *lisez* petit

SUPPLÉMENT

AU 5e VOLUME

DU

TRAITÉ DE MÉCANIQUE CÉLESTE;

PAR M. LE MARQUIS DE LAPLACE.

[IMPRIMÉ SUR LE MANUSCRIT TROUVÉ DANS SES PAPIERS]

1827.

SUPPLÉMENT

AU 5e VOLUME

DU

TRAITÉ DE MÉCANIQUE CÉLESTE;

PAR L'AUTEUR.

[IMPRIMÉ SUR LE MANUSCRIT TROUVÉ DANS SES PAPIERS]

En publiant mon Traité de Mécanique céleste, j'ai désiré que les Géomètres en vérifiassent les résultats, et spécialement ceux qui me sont propres. Les résultats de la théorie du Système du Monde sont, pour la plupart, si distans des premiers principes, que leur vérification est nécessaire pour en assurer l'exactitude. Les Géomètres qui s'en occupent font donc une chose utile à l'Astronomie. Je dois, comme savant et comme auteur, beaucoup de reconnaissance à ceux qui ont bien voulu prendre mon Ouvrage pour texte de leurs discussions, et qui par là m'ont fourni l'occasion d'éclaircir quelques points délicats traités dans cet Ouvrage. Ce sont ces éclaircissemens et quelques recherches nouvelles qui sont l'objet de ce Supplément.

Sur le développement en série du radical qui exprime la distance mutuelle de deux planètes.

1. En considérant cet objet dans les nos 3 du livre XI et du livre XV de la Mécanique céleste, je me suis spécialement proposé de faire voir, par un exemple intéressant, l'utilité des méthodes que j'ai exposées

avec étendue dans ma Théorie analytique des Probabilités; l'une, pour obtenir en intégrales définies les variables données par des équations linéaires aux différences finies à coefficiens variables, l'autre, pour avoir, par des approximations rapides et convergentes, les intégrales définies, fonctions de très grands nombres. C'est surtout dans le développement des fonctions en séries que ces méthodes sont utiles pour avoir les *limites* des termes de ces développemens, et pour reconnaître si les séries qui en résultent sont convergentes. Je nomme *limites*, les valeurs dont les termes du développement approchent sans cesse à mesure que leur rang est plus considérable, et qui coïncident avec elles dans l'infini. Si l'on nomme r et r' les distances mutuelles de deux corps qui s'attirent, à un même point fixe, et θ l'angle compris entre ces distances, la distance mutuelle de ces deux corps sera $\sqrt{r^2 - 2rr'\cos\theta + r'^2}$. On sait combien le développement du radical

$$\frac{1}{\sqrt{r^2 - 2rr'\cos\theta + r'^2}}$$

est important dans les théories de la figure et des perturbations des planètes.

Or, supposant $r' > r$, et faisant $\frac{r}{r'} = \alpha$, on peut développer le radical $(1 - 2\alpha.\cos\theta + \alpha^2)^{-\frac{1}{2}}$, soit par rapport aux puissances de α, soit par rapport aux cosinus de l'angle θ et de ses multiples. Le premier de ces développemens est nécessaire dans la théorie de la figure des planètes, et le second, dans la théorie des perturbations. Dans le n° 3 du livre XI cité, j'ai exprimé par une intégrale définie, le terme général du premier développement, et j'ai donné une limite de cette expression, qui devient de plus en plus compliquée, à mesure que le nombre des termes augmente. Dans le n° 3 du livre XV, j'ai cherché à exprimer pareillement par une intégrale définie, le terme général du second développement.

Si l'on désigne par $\alpha^i p^{(i)}$, le terme général du radical $(1 - \alpha.\cos.\theta + \alpha^2)^{-\frac{1}{2}}$ développé suivant les puissances de α, on a, par le n° 23 du troisième livre de la Mécanique céleste,

$$p^{(i)} = \frac{1\,3\,5\,\overline{2i-1}}{1\,2.3.\,i}.\left\{\cos^i\theta - \frac{i\,\overline{i-1}}{2\,\overline{2i-1}}.\cos^{i-2}.\theta + \frac{i\,\overline{i-1}\,\overline{i-2}.\overline{i-3}}{2.\overline{2i-1}.\overline{2i-3}}.\cos^{i-4}.\theta - \text{etc}\right\}, \quad (1)$$

lorsque ι est un grand nombre, cette expression contient un grand nombre de termes, mais j'ai prouvé, dans le n° cité du livre XI, qu'alors elle se réduit à très peu près à

$$\frac{\cos\left[(\iota+\frac{1}{2})\,\theta-\frac{1}{4}\pi\right]}{\sqrt{\frac{1}{2}\pi\iota.\sin\theta}},$$

π étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité. Je vais ici confirmer ce résultat singulier par une autre méthode.

On a par les n°s 8 et 9 du troisième livre de la Mécanique céleste,

$$0=i.\overline{\iota+1}.p^{(\iota)}+\left(\frac{ddp^{(\iota)}}{d\theta^2}\right)+\frac{dp^{(\iota)}}{d\theta}.\frac{\cos.\theta}{\sin\theta};\quad (2)$$

exprimons l'intégrale de cette équation par

$$p^{(\iota)}=u.\cos.a\theta+u'.\sin.a\theta,$$

u et u' étant fonctions de θ, et a étant supposé égal à $\iota.\overline{\iota+1}$. En substituant cette valeur dans l'équation (2), et comparant séparément les coefficiens de sin. $a\theta$ et de cos. $a\theta$, on aura

$$2\frac{du}{d\theta}+u.\frac{\cos.\theta}{\sin\theta}=\frac{\frac{ddu'}{d\theta^2}+\frac{du'}{d\theta}\cos.\theta}{a};$$

$$2\frac{du'}{d\theta}+u'.\frac{\cos.\theta}{\sin.\theta}=\frac{-\frac{ddu'}{d\theta^2}-\frac{du}{d\theta}.\cos.\theta}{a}.$$

Ces équations donnent, en négligeant les termes divisés par a, et en les intégrant,

$$u=\mathrm{H}.\sin^{-\frac{1}{2}}\theta,\quad u'=\mathrm{H}'.\sin^{-\frac{1}{2}}\theta;$$

H et H′ étant deux constantes arbitraires.

Si l'on fait

$$u=\mathrm{H}.\sin.^{-\frac{1}{2}}\theta+\frac{\mathrm{X}}{a};\quad u'=\mathrm{H}'.\sin.^{-\frac{1}{2}}\theta+\frac{\mathrm{X}'}{a},$$

les équations différentielles précédentes donneront les valeurs de X et de X′. En continuant ainsi, on aura les valeurs de u et de u', et par conséquent celle de $p^{(\iota)}$ développée suivant les puissances de $\frac{1}{a}$. Nous ne considérerons ici que les termes indépendans de $\frac{1}{a}$; et alors on

aura

$$p^{(i)} = C.\sin^{-\frac{1}{2}}.\theta.\cos.(a\theta + \varepsilon),$$

C et ε étant deux constantes arbitraires qu'il faut déterminer. Pour cela, je suppose $\theta = \frac{\pi}{2}$, π étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité j'observe ensuite que si l'on néglige les termes de l'ordre $\frac{1}{i}$, on a $a = i + \frac{1}{2}$, on a donc alors

$$p^{(i)} = C.\cos.\left\{(i + \tfrac{1}{2}).\frac{\pi}{2} + \varepsilon\right\}.$$

On voit par l'équation (1) que i étant impair, et θ étant $\frac{\pi}{2}$, la valeur de $p^{(i)}$ est nulle, on a donc $\varepsilon = -\frac{1}{4}\pi$, et par conséquent on a, quel que soit θ,

$$p^{(i)} = C.\sin.^{-\frac{1}{2}}\theta.\cos\left\{(i + \tfrac{1}{2})\theta - \frac{\pi}{4}\right\}.$$

Pour déterminer la constante C, j'observe que si l'on suppose i pair et égal à $2s$, l'équation (1) donne, lorsque $\theta = \frac{\pi}{2}$,

$$p^{(i)} = \pm\frac{1.3.5.\ \ \overline{2s-1}}{2\ 4.\ \ .\ 2s} = \pm\frac{1.2\ 3.\ \ .\ 2s}{2^{2s}\,(1\ 2\ 3.\ \ s)^2},$$

le signe supérieur ayant lieu si s est pair, et l'inférieur si s est impair On a à très peu près, par les formules connues, lorsque s est un grand nombre,

$$1.2.3....\ s = s^{s+\frac{1}{2}}.c^{-s}.\sqrt{2\pi},$$
$$1.2.3....2s = (2s)^{2s+\frac{1}{2}}.c^{-2s}.\sqrt{2\pi}$$

On aura ainsi

$$p^{(i)} = \pm\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}i\pi}},$$

ce qui donne

$$C = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}i\pi}}$$

L'expression générale de $p^{(i)}$ est donc

$$\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2}i\pi.\sin\theta}}.\cos.\left\{(i + \tfrac{1}{2}).\theta - \tfrac{1}{4}\pi\right\}$$

2. Je passe maintenant au développement du radical $(1-2\alpha.\cos.\theta+\alpha^2)^{-\frac{1}{2}}$, suivant les puissances de α. En désignant par

$$\tfrac{1}{4}\, b^{(0)}_{\frac{1}{2}} + b^{(1)}_{\frac{1}{2}}.\cos.\theta + b^{(2)}_{\frac{1}{2}}.\cos.2\theta \ldots\ldots + b^{(i)}_{\frac{1}{2}}.\cos.i\theta + \text{etc},$$

le développement de ce radical, on parvient fort simplement, par l'analyse du n° 3 du livre XV de la Mécanique céleste, à cette expression de $b^{(i)}_{\frac{1}{2}}$,

$$b^{(i)}_{\frac{1}{2}} = \frac{4\alpha^i}{\pi}.\int_0^1 \frac{(1-t^2)^i dt}{\sqrt{(1-t^2).(1-\alpha^2+\alpha^2 t^2)}},$$

qui, lorsque i est très grand, se réduit à fort peu près à

$$\frac{2\alpha^i}{\sqrt{i\pi.(1-\alpha^2)}}.$$

Dans le n° cité, je n'ai trouvé que le quart de cette valeur, parce que j'ai supposé par inadvertance, que la série

$$\frac{1.3.5\ldots\ldots\overline{2i-1}}{2.4.6\ldots\ldots 2i}.\left\{1+\frac{2i+1}{2i+2}.\alpha^2+\text{etc.}\right\}$$

est l'expression de $2b^{(i)}_{\frac{1}{2}}$, tandis qu'elle n'exprime que $\frac{1}{2}\, b^{(i)}_{\frac{1}{2}}$, comme il est facile de le voir. Il faut donc, à la page 338 du tome V de la Mécanique céleste, ligne 8, écrire $\frac{1}{2}\, b^{(i)}_{\frac{1}{2}}$, au lieu de $2b^{(i)}_{\frac{1}{2}}$, à la page 339, ligne 4, il faut écrire $\frac{1}{4}\, b^{(i)}_{\frac{1}{2}}$ au lieu de $b^{(i)}_{\frac{1}{1}}$; ligne 10, il faut changer $\frac{1}{2\pi}$ dans $\frac{2}{\pi}$; et ligne 12, il faut changer α^i dans $4\alpha^i$, et $(1-t^2)^{i-\frac{1}{2}}$ dans $(1-t^2)^i$

Sur le développement des coordonnées elliptiques.

3 L'excentricité des orbes elliptiques planétaires étant peu considérable, on développe le plus souvent le rayon vecteur et l'anomalie vraie en séries ordonnées suivant ses puissances. Mais si l'excentricité, qui dans les orbes elliptiques ne surpasse jamais l'unité, en devenait fort approchante; on conçoit que les séries pourraient cesser

d'être convergentes Il importe donc de connaître si parmi les valeurs comprises entre zéro et l'unité, que l'excentricité peut avoir, il en est une au-dessus de laquelle ces séries seraient divergentes, et dans ce cas, de la déterminer Prenons pour unité le demi grand axe de l'ellipse désignons par e son excentricité, par t l'anomalie moyenne comptée du périgée, et par R le rayon vecteur, on aura par le n° 22 du second livre de la Mécanique céleste,

$$
\begin{aligned}
R = 1 + \frac{e^2}{2} - e.\cos.t \\
- \frac{e^2}{1.2}.\cos.2t \\
- \frac{e^3}{1\ 2.2^2}.(3.\cos.3t - 3\ \cos.t) \\
- \frac{e^4}{1.2\ 3.2^3}.(4^2.\cos.4t - 4.2^2.\cos.2t) \\
- \frac{e^5}{1.2\ 3\ 4\ 2^4}.\left(5^3.\cos 5t - 5.3^3.\cos 3t + \frac{5\ 4}{1\ 2}\cos\ t\right) \\
- \frac{e^6}{1\ 2.3.4.5\ 2^5}.\left(6^4.\cos.6t - 6.4^4.\cos.4t + \frac{6\ 5}{1.2}.\cos\ 2t\right) \\
- \text{etc.}
\end{aligned}
$$

Le terme général de cette expression est

$$
-\frac{e^i}{1.2.3\ \ \overline{i-1}.2^{i-1}}.\left\{\begin{aligned}
& i^{i-2}.\cos\ it - i.(i-2)^{i-2}.\cos.(i-2)t \\
& + \frac{i\ \overline{i-1}}{1.2}.(i-4)^{i-2}.\cos\ (i-4)t \\
& - \frac{i\ \overline{i-1}\ \overline{i-2}}{1.2.3}.(i-6)^{i-2}\cos.(i-6)t \\
& + \text{etc.}
\end{aligned}\right\},
$$

la série étant continuée jusqu'à ce que l'on arrive à un facteur $(i-2r)^{i-2}$ dans lequel $i-2r$ soit négatif Si l'on fait t égal à un angle droit, ce terme devient nul lorsque i est impair; et dans le cas de i pair, il devient, abstraction faite du signe, égal à

$$
\frac{e^i}{1.2.3.\ \ \overline{i-1}\ 2^{i-2}}.\left[i^{i-2} + \frac{i}{1}.(i-2)^{i-2} + \frac{i\ \overline{i-1}}{1\ 2}.(i-4)^{i-2} + \text{etc}\right]; \quad (a)
$$

et il est alors le plus grand possible. Déterminons sa valeur, lorsque i est un très grand nombre.

Il est facile de voir que les termes de la série

$$i^{i-2} + \frac{i}{1}.(i-2) + \frac{i.\overline{i-1}}{1.2}.(i-4)^{i-2} + \text{etc.}, \quad (a')$$

vont d'abord en croissant, et qu'ils ont un *maximum* après lequel ils diminuent. A ce *maximum*, deux termes consécutifs sont à très peu près égaux. Soit

$$\frac{i\,\overline{i-1}\,\overline{i-2}\,.\overline{i-r+1}}{1\,2.3\,.\,r}.(i-2r)^{i-2}$$

le terme *maximum*. Le terme qui le précède, sera

$$\frac{i\,\overline{i-1}\,\overline{i-r+2}}{1\,2\,3\,\overline{r-1}}.(i-2r+2)^{i-2},$$

en égalant donc ces deux termes, on aura

$$\frac{i-r+1}{r}.(i-2r)^{i-2} = (i-2r+2)^{i-2}.$$

Cette équation donne la valeur de r, et par conséquent, le rang que le terme le plus grand occupe dans la série. Si l'on prend les logarithmes des deux membres, on a

$$\log\left(\frac{i-r+1}{r}\right) = (i-2).\log\left(1+\frac{2}{i-2r}\right),$$

ou

$$\log.\left(\frac{i-1}{r}\right) + \log.\left(1+\frac{1}{i-r}\right) = (i-2).\log\left(1+\frac{2}{i-2r}\right), \quad (b)$$

or on a, lorsque i et r sont de très grands nombres,

$$\log.\left(1+\frac{1}{i-r}\right) = \frac{1}{i-r} - \frac{1}{2\,(i-r)^2} + \text{etc},$$

$$\log\left(1+\frac{2}{i-2r}\right) = \frac{2}{i-2r} - \frac{2}{(i-2r)^2} + \text{etc},$$

l'équation (b) deviendra donc, en négligeant les termes de l'ordre $\frac{1}{i}$,

$$\log.\left(\frac{i-r}{r}\right) = \frac{2i}{i-2r},$$

ce qui donne

$$\frac{i-r}{r} = c^{\frac{2i}{i-2r}},$$

c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité. En faisant $r = \omega i$, on aura

$$\frac{1-\omega}{\omega} = c^{\frac{2}{1-2\omega}}, \quad (c)$$

si l'on nomme p le terme *maximum*

$$\frac{i.\overline{i-1}\ \ \overline{i-r+1}}{1\ 2\ 3.\ .r}.(i-2r)^{i-2},$$

le terme qui en est éloigné du rang t, sera

$$p.\frac{\overline{i-r}\ \overline{i-r-1}\ \ .\overline{i-r-t+1}}{\overline{r+1}\ \overline{r+2}.\ \ \overline{r+t}}.\left(\frac{i-2r-2t}{i-2r}\right)^{i-2}.$$

Son logarithme sera donc

$$\log.p + t\log(i-r) + \log\left(1-\frac{1}{i-r}\right) + \log\left(1-\frac{2}{i-r}\right)\ldots + \log.\left[1-\frac{(t-1)}{i-r}\right]$$
$$-t\log r - \log.\left(1+\frac{1}{r}\right) - \log.\left(1+\frac{2}{r}\right)\ldots - \log\left(1+\frac{t}{r}\right)$$
$$+(i-2).\log\left(1-\frac{2t}{i-2r}\right).$$

En développant en séries ces logarithmes, et négligeant les termes de l'ordre $\frac{1}{i^2}$, on aura

$$\log p + t.\log.\left(\frac{i-r}{r}\right) - \frac{(1+2+3\ \ +\overline{t-1})}{i-r} - \frac{(1+2+3.\ \ +t)}{r}$$
$$-(i-2).\left[\frac{2t}{i-2r} + \frac{2t^2}{(i-2r)^2}\right].$$

Par la nature de r, on a à très peu près, par ce qui précède,

$$\log\left(\frac{i-r}{r}\right) + \frac{1}{i-r} = (i-2).\left[\frac{2}{i-2r} - \frac{2}{(i-2r)^2}\right],$$

la fonction précédente deviendra donc

$$\log.p - (1+2+3\ldots+t).\frac{i}{r.(i-r)} - \frac{(i-2).2t\,(t+1)}{(i+2r)^2}.$$

En ne conservant ainsi parmi les termes de l'ordre $\frac{1}{i}$, que ceux qui sont multipliés par t^2, et observant que

$$1+2+3\ldots+t = \frac{t^2+t}{2},$$

cette fonction prendra la forme

$$\log p - \frac{v^3 t^2}{2r\,\overline{i-r}.(i-2r)^2},$$

ce qui donne pour le terme placé à la distance t, du terme p,

$$p.c^{-\frac{v^3 t^2}{2r\,\overline{i-r}(i-2r)^2}}$$

Il est facile de s'assurer que cette même valeur a lieu à très peu près pour le terme placé avant p à la même distance La somme de tous ces termes sera la série entière (a') On aura, comme on sait, cette somme à très peu près égale à

$$p\int dt.c^{-\frac{v^3 t^2}{2r\,\overline{i-r}.(i-2r)^2}},$$

l'intégrale étant prise depuis $t = -\infty$, jusqu'à $t = \infty$, ce qui donne, par les méthodes connues, la série (a') égale à

$$p\ \sqrt{\pi}.\left(\frac{i-2r}{i}\right).\sqrt{\frac{2r\,\overline{i-r}}{i}},$$

π étant la circonférence dont le diamètre est l'unité On a

$$p = \frac{1\ 2\ 3\ \ i\,(i-2r)^{i-2}}{1\ 2\ 3.\ .\overline{i-r}.1\ 2.3\ .\ r}.$$

La série (a) devient ainsi, abstraction faite du signe,

$$\frac{i\,(i-2r)^{i-2}.\sqrt{\pi}}{1\ 2.3\ \ \overline{i-r}\ 1\ 2\ 3\ .\ r}\ \frac{\overline{i-2r}}{i}\ \sqrt{\frac{2r.\overline{i-r}}{i}}.\frac{e^i}{2^{i-1}}.$$

On a à très peu près, par les théorèmes connus,

$$1.2.3\ldots\overline{i-r} = (i-r)^{i-r+\frac{1}{2}}.c^{-(i-r)}.\sqrt{2\pi},$$

$$1.2.3.\ \ r = r^{r+\frac{1}{2}}.c^{-r}.\ \sqrt{2\pi}$$

La série (a) devient donc

$$\frac{\frac{2}{\sqrt{i}}.(i-2r)^{i-1}.\left(\frac{ec}{2}\right)^i}{r^r.(i-r)^{i-r}.\sqrt{2\pi}},$$

ou

$$\frac{2}{i\sqrt{i}.(1-2\omega).\sqrt{2\pi}}.\left[\frac{ec.(1-2\omega)}{2\omega^{\omega}\,(1-\omega)^{1-\omega}}\right]^{i};\quad (d)$$

ω étant donné par l'équation (c)

On doit observer ici que la valeur de ω donnée par cette équation n'est pas rigoureuse Nous avons négligé, pour former cette équation, les quantités de l'ordre $\frac{1}{i}$, et de plus nous avons supposé que le terme *maximum p*, était égal à celui qui le précède, ce qui n'est qu'approché De là il suit que la valeur exacte de ω, est celle que donne l'équation (c), plus une correction de l'ordre $\frac{1}{i}$, que nous désignerons par $\frac{q}{i}$. Mais cette correction disparaît d'elle-même par la condition de *p maximum* En effet, si l'on nomme D la fonction

$$\frac{ec\,(1-2\omega)}{2\omega^{\omega}.(1-\omega)^{1-\omega}},$$

et D′ cette même fonction, lorsqu'on y change ω dans $\omega+\frac{q}{i}$, on aura

$$\log D'^{i}=i.\log.\left[\left(1+\frac{q}{i}.\frac{dD}{D.d\omega}+\frac{q^2}{2i^2}.\frac{d^2D}{D\,d\omega^2}+\text{etc}\right).D\right].$$

En repassant des logarithmes aux nombres, et négligeant ensuite les quantités de l'ordre $\frac{1}{i}$, on aura

$$D'^{i}=D^{i}.c^{q.\frac{dD}{Dd\omega}}$$

On a

$$\frac{dD}{D\,d\omega}=-\frac{2}{1-2\omega}+\log\frac{1-\omega}{\omega};$$

et l'équation (c) donne $\log\frac{1-\omega}{\omega}=\frac{2}{1-2\omega}$, on a donc aux quantités près de l'ordre $\frac{1}{i}$, $D'^{i}=D^{i}$, d'où il est facile de conclure que, par le changement de ω dans $\omega+\frac{q}{i}$, la formule (d) reste la même. Si la quantité

$$\frac{ec\,(1-2\omega)}{2\omega^{\omega}\,(1-\omega)^{1-\omega}}$$

surpasse l'unité, la fonction (d) devient infinie, lorsque i est infini; l'expression du rayon vecteur devient donc alors divergente. La valeur de l'excentricité, déduite de l'équation

$$e = \frac{2\omega^{\omega}.(1-\omega)^{1-\omega}}{(1-2\omega)\ c}$$

est par conséquent la limite des valeurs de l'excentricité, qui font converger l'expression du rayon vecteur développé suivant les puissances de l'excentricité En substituant au lieu de $\frac{1}{c}$ sa valeur $\left(\frac{1-\omega}{\omega}\right)^{\frac{1-2\omega}{2}}$ donnée par l'équation (c), cette expression de e devient

$$e = \frac{2\sqrt{\omega(1-\omega)}}{1-2\omega}.$$

L'équation (c) donne à peu près

$$\omega = 0{,}08307;$$

d'où l'on tire

$$e = 0{,}66195$$

L'équation précédente de la limite de l'excentricité e, donne à cette limite

$$1 - 2\omega = \frac{1}{\sqrt{1+e^2}},$$

d'où il est facile de conclure

$$\frac{1-\omega}{\omega} = \frac{(1+\sqrt{1+e^2})}{e^2},$$

l'équation (c) donnera donc

$$1 + \sqrt{1+e^2} = e.c^{\sqrt{1+e^2}}; \quad (m)$$

les valeurs de e supérieures à celle que cette équation donne, rendent l'expression en série du rayon vecteur R, divergente lorsque t est un angle droit. Pour toutes les valeurs inférieures, cette série est convergente quel que soit t. En effet, le terme général de l'expression de R développée en série ordonnée par rapport aux puissances de l'excentricité, est, comme on l'a vu,

$$-\frac{e^i}{1.2.3\ldots\overline{i-1}.2^{i-1}}.\left[i^{i-2}.\cos.it - i.(i-2)^{i-2}.\cos.(i-2).t + \text{etc.}\right].$$

La plus grande valeur de ce terme, abstraction faite du signe, ne peut surpasser

$$\frac{e^i}{1\ 2\ 3\ \ldots i-1 . 2^{i-1}} . \left[i^{i-2} + i.(i-2)^{i-2} + \frac{i\ \overline{i-1}}{1\ 2} . (i-4)^{i-2} + \text{etc} \right].$$

On vient de voir que cette valeur, lorsque i est infini, devient nulle par un facteur moindre que l'unité, élevé à la puissance i, lorsque l'excentricité e est au-dessous de celle qui résulte de l'équation aux limites, la série est donc convergente, quel que soit t. Je vais maintenant établir qu'alors la série de l'expression de l'anomalie vraie développée de la même manière, est pareillement convergente.

4 L'anomalie excentrique étant u, et v l'anomalie vraie, on a, par le n° 20 du second livre de la Mécanique céleste,

$$t = u - e \sin u,$$
$$R = 1 - e \cos . u,$$

ce qui donne

$$\frac{du}{dt} = \frac{1}{R},$$

or, on a, par la loi des aires proportionnelles aux temps,

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\sqrt{1-e^2}}{R^2},$$

on a donc

$$\frac{dv}{dt} = \left(\frac{du}{dt}\right)^2 . \sqrt{1+e^2}.$$

L'expression en série de u, du n° 22 du livre cité, donne

$$\frac{du}{dt} = 1 + e . \cos t + \frac{e^2}{1\ 2 . 2} . 2^2 . \cos . 2t + \frac{e^3}{1\ 2\ 3 . 2^2} . (3^3 \cos 3t - 3 . \cos t) + \text{etc.}$$

Le terme général de cette série est

$$\frac{e^i}{1\ 2 . 3 . \ldots i . 2^{i-1}} . \left[i^i . \cos it - i.(i-2)^i . \cos . (i-2)t \right.$$
$$\left. + \frac{i\ \overline{i-1}}{1\ 2} . (i-4)^i . \cos (i-4)t - \text{etc.} \right],$$

et dans aucun cas il ne peut surpasser

$$\frac{e^i}{1\ 2\ 3 . \ldots i . 2^{i-1}} . \left[i^i + i.(i-2)^i + \frac{i\ \overline{i-1}}{1\ 2} . (i-4)^i + \text{etc.} \right].$$

En suivant exactement l'analyse de l'article précédent, on trouve ce dernier terme égal à

$$\frac{2}{\sqrt{i}} \cdot \frac{(1-2\omega)}{\sqrt{2\pi}} \cdot \left[\frac{ec\,(1-2\omega)}{2\omega^{\omega}\,(1-\omega)^{1-\omega}}\right]^{i}, \quad (e)$$

ω étant donné par l'équation (c) de l'article précédent

Maintenant, si l'on désigne par A la série

$$1 + e + \frac{2^2\,e^2}{1.2\,2} \ldots + \frac{e^{i'}}{1\,2\,3 \quad i'\,2^{i'-1}} \cdot \left[i'^{i'} + i'\,(i'-2)^{i'} + \frac{i'.\overline{i'-1}}{1-2} \cdot (i'-4)^{i'} + \text{etc}\right] + \text{etc},$$

la série étant continuée jusqu'à $i' = i$, il est facile de voir que l'expression en série, de $\frac{du}{dt}$, sera moindre que le développement en série, de la fonction

$$A + \frac{2\,(1-2\omega)}{\sqrt{2\pi}.(1-qe)}\,q^{i}e^{i}; \quad (o)$$

en désignant par q la quantité

$$\frac{(1-2\omega)\,c}{2\omega^{\omega}\,(1-\omega)^{1-\omega}}$$

Car il est visible que le coefficient d'une puissance quelconque e dans le développement de la fonction (o) est positif, et qu'il est plus grand, abstraction faite du signe, que le coefficient de la même puissance, dans le développement de $\frac{du}{dt}$ L'expression de $\frac{dv}{dt}$, ou de $\left(\frac{du}{dt}\right)^2 \sqrt{1-e^2}$, est donc moindre

$$\left[A + \frac{2\,(1-2\omega)\,q^{i}e^{i}}{\sqrt{2\pi}\,(1-qe)}\right]^2 \cdot \sqrt{1-e^2},$$

or, le développement de $\sqrt{1-e^2}$ est moindre que celui de $\frac{1}{1-e^2}$, le développement de $\frac{dv}{dt}$ est donc moindre que celui de

$$\frac{\left[A + \frac{2\,(1-2\omega)\,q^{i}e^{i}}{\sqrt{2\pi}\,(1-qe)}\right]^2}{1-e^2}, \quad (p)$$

c'est-à-dire que le coefficient d'une puissance quelconque de e^{i} dans le développement de cette fonction, est positif et plus grand, abstraction

faite du signe, que le coefficient de la même puissance dans le développement de $\frac{dv}{dt}$.

Donnons à la fonction (p) cette forme

$$\frac{A^2}{1-e^2}+\frac{4A\,(1-2\omega).q^i e^i}{\sqrt{2\pi}\,(1-qe)\,(1-e^2)}+\frac{2\,(1-2\omega)^2 q^{2i} e^{2i}}{\pi.(1-qe)^2\,(1-e^2)}.$$

Le terme $\frac{A^2}{1-e^2}$ développé en série, donne une série convergente. Car, quelque grand que l'on suppose i, pourvu qu'il soit fini, A^2 sera composé d'un nombre fini de termes En désignant par $me^{i'}$ l'un de ces termes, $\frac{me^{i'}}{1-e^2}$ développé en séries donnera une série convergente, e étant supposé moindre que l'unité. Ainsi $\frac{A^2}{1-e^2}$ donnera un nombre fini de séries convergentes, et dans leur somme le terme dépendant de e^i deviendra nul lorsque s est infini.

Le terme

$$\frac{4A\,(1-2\omega)\,q^i e^i}{\sqrt{2\pi}\,(1-qe)\,(1-e^2)}$$

donnera un nombre fini de termes de la forme

$$\frac{ne^i}{(1-qe)\,(1-e^2)},$$

or la fraction

$$\frac{1}{(1-qe)\,(1-e^2)}$$

se décompose dans les trois suivantes

$$\frac{1}{2(1-q)}\cdot\frac{1}{1-e}+\frac{1}{2(1+q)}\cdot\frac{1}{1+e}-\frac{q^2}{1-q^2}\cdot\frac{1}{1-qe}.$$

Chacune d'elles développée en série, donne une série convergente, car, par la supposition, qe est moindre que l'unité On voit donc que le terme

$$\frac{4A.(1-2\omega)\,q^i e^i}{\sqrt{2\pi}.(1-qe).(1-e^2)}$$

donne une série convergente. Pareillement le terme

$$\frac{2.(1-2\omega)^2\,q^{2i}e^{2i}}{\pi.(1-qe)^2.(1-e^2)}$$

donne une série convergente; comme il est facile de le voir, en décomposant la fraction

$$\frac{1}{(1-qe)^2.(1-e^2)}$$

en fractions partielles; $\frac{dv}{dt}$ développé en série ordonnée par rapport aux puissances de l'excentricité, donne par conséquent une série convergente, lorsque qe est moindre que l'unité Il est facile d'en conclure que l'expression de $(v-t)$ ainsi développée forme une série convergente; car l'intégration de dv, faisant acquérir des diviseurs à ses termes, on voit que, quel que soit t, $v-t$ sera moindre que

$$\frac{\left[A+\frac{2.(1-2\omega).q^t e^t}{\sqrt{2\pi}\,(1-qe}\right]}{1-e^2}$$

qui, comme on vient de le voir, forme une série convergente.

Il résulte de ce qui précède, que la condition nécessaire pour la convergence des séries qui expriment le rayon vecteur et l'anomalie vraie, développés suivant les puissances de l'excentricité, est que l'excentricité soit moindre que

$$\frac{2.\sqrt{\omega.(1-\omega)}}{1-2\omega},$$

ω étant donné par l'équation

$$\frac{1-\omega}{\omega}=c^{\frac{2}{1-2\omega}}.$$

Les deux séries sont alors convergentes; c'est ce qui a lieu pour toutes les planètes, même pour les planètes télescopiques. Les valeurs supérieures de l'excentricité font diverger la série du rayon vecteur, et alors il faut recourir à d'autres développemens. Tel est le cas de la comète à courte période.

5. On développe encore les expressions de l'anomalie vraie et du rayon vecteur, suivant les sinus et cosinus multiples de l'anomalie moyenne. Soit alors

$$v=t+a^{(1)}.\sin.t+a^{(2)}.\sin 2t\ldots+a^{(i)}.\sin.it+\text{etc}$$

$a^{(1)}$, $a^{(2)}$, etc., étant des fonctions de l'excentricité. On peut facilement démontrer que la série est toujours convergente En effet,

on a

$$\int (v - t).dt.\sin.it = \pi.a^{(i)},$$

l'intégrale étant prise depuis t nul, jusqu'à t égale 2π Or, on a dans ces limites, en intégrant par parties,

$$dt.(v - t).\sin\ it = \frac{1}{i}.\int dt\left(\frac{dv}{dt} - 1\right).\cos.it = -\frac{1}{i^2}.\int dt \sin.it.\frac{ddv}{dt^2},$$

on aura donc

$$a^{(i)} = -\frac{1}{i^2\pi}.\int dt.\sin\ it.\frac{ddv}{dt^2}.$$

l'équation

$$\frac{dv}{dt} = \frac{\sqrt{1 - e^2}}{R^2}$$

donne

$$\frac{ddv}{dt^2} = -\frac{2\sqrt{1 - e^2}}{R^3}.\frac{dR}{dt}$$

Au périhélie et à l'aphélie, $\frac{dR}{dt}$ est nul $\frac{dR}{R^3}dt$ est positif, en allant du premier de ces points au second, et négatif, du second au premier Soit k sa plus grande valeur positive, $-k$ sera sa plus grande valeur négative. En supposant donc que les valeurs de sin. it soient positives et égales à l'unité, depuis le périhélie jusqu'à l'aphélie, et négatives et égales à -1, depuis l'aphélie jusqu'au périhélie, on voit que l'intégrale $\int dt \sin\ it.\frac{\frac{dR}{dt}}{R^3}$ prise depuis le périhélie jusqu'à l'aphélie, sera moindre, abstraction faite du signe, que $2k\pi$. De là il suit que $a^{(i)}$, abstraction faite du signe, est moindre que

$$\frac{4\pi.k.\sqrt{1 - e^2}}{i^2}.$$

Ce terme devient nul, lorsque i est infini De plus, la série de l'expression précédente de v, à partir de i supposé très grand, est moindre que

$$\frac{4\pi\ k.\sqrt{1 - e^2}}{i},$$

quantité qui devient nulle, lorsque i est infini. Cette série est donc convergente

Considérons de la même manière l'expression de R développée dans

une série ordonnée par rapport aux cosinus de t et de ses multiples. Soit

$$R = b^{(0)} + b^{(1)}.\cos.t \ldots + b^{(i)}.\cos.it + \text{etc}$$

on aura

$$\pi.b^{(i)} = \int R dt.\cos.it$$

l'intégrale étant prise depuis t nul jusqu'à t égal à 2π, ce qui donne

$$\pi.b^{(i)} = -\frac{1}{i^2}.\int dt.\cos it.\frac{ddR}{dt^2}$$

Les formules du mouvement elliptique donnent

$$\frac{ddR}{dt^2} = \frac{1 - e^2 - R}{R^3}$$

Cette dernière quantité est toujours négative Désignons par $-k'$ son *maximum*, et supposons $\cos it$ égal à l'unité; on aura, abstraction faite du signe, $\pi b^{(i)}$ moindre que $\frac{2k'\pi}{i^2}$; d'où il suit que la série de l'expression de R est convergente.

On peut, en suivant la méthode exposée dans le n° précédent, déterminer la valeur approchée de $b^{(i)}$, lorsque i est un grand nombre Pour cela j'observe que l'expression de R développée en série par rapport aux puissances de l'excentricité, et que nous avons rapportée dans l'article premier, donne

$$b^{(i)} = -\frac{e^i.i^{i-2}}{1.2.3..i\,2^{i-1}}.\left[i - \frac{\overline{i+2}}{1.\overline{i+1}}\left(\frac{ei}{2}\right)^2 + \frac{\overline{i+4}}{1.2.\overline{i+1}\,\overline{i+2}}.\left(\frac{ei}{2}\right)^4 - \frac{\overline{i+6}}{1.2.3.\overline{i+1}\,\overline{i+2}\,\overline{i+3}}.\left(\frac{ei}{2}\right)^6 + \text{etc}\right]$$

Le terme général de cette expression est

$$\pm\frac{e^i.i^{i-2}}{1.2.3..i\,2^{i-1}}.\frac{(i+2r)\left(\frac{ie}{2}\right)^{2r}}{1.2.3..r\,\overline{i+1}.\overline{i+2}\ldots\overline{i+r}}.$$

Si l'on observe que r étant un très grand nombre, on a à fort peu près

$$1.2.3\ldots r.1.2.3..\overline{i+r} = r^{r+\frac{1}{2}}.(i+r)^{i+r+\frac{1}{2}}.c^{-i-2r}.2\pi,$$

on peut donner à ce terme, la forme

$$\pm \frac{e^i\, c^i\, i^{i-2}.(i+2i)}{2^i.\pi\,(i+r)^i.\sqrt{r\,\overline{i+r}}}\cdot\left(\frac{e^2 i^2}{4i}\frac{c}{\overline{i+r}}\right)^i,$$

quantité qui devient nulle, lorsque r est infini. La série de l'expression de $b^{(i)}$ est donc convergente.

Pour avoir sa valeur approchée, je considère la série

$$i+\frac{\overline{i+2}}{1.\overline{i+1}}\cdot\left(\frac{ei}{2}\right)^2+\frac{\overline{i+4}}{1\;2\;\overline{i+1}\;\overline{i+2}}\cdot\left(\frac{ei}{2}\right)^4+\text{etc}\;;\;(m)$$

dont le terme général est

$$\frac{(i+2r)\;\left(\frac{ie}{2}\right)^{2r}}{1\;2\;3.\;\;r\,\overline{i+1}.\overline{i+2}\;.\;\overline{i+r}}.$$

On aura, par la méthode exposée dans l'article premier, la somme de cette série, fort approchée lorsque i est un très grand nombre. Nommons p le terme précédent, et supposons qu'il soit le plus grand des termes de la série. Pour avoir le rang qu'il y occupe, on l'égalera, suivant la méthode citée, au terme qui le précède, ce qui donne

$$(i+2r-2).r.\overline{i+r}=(i+2r).\frac{i^2e^2}{4},$$

d'où l'on tire à fort peu près

$$r=\frac{i.\sqrt{1+e^2}-i}{2}$$

Le terme qui suit p, d'un rang supérieur de t, est

$$\frac{p.\frac{i+2r-t}{i+2i}.\left(\frac{ei}{2}\right)^{2t}}{\overline{r+1}\;\overline{r+2}\;\;.\overline{r+t}.\overline{i+r+1}\;\;\overline{i+i+2}\ldots\overline{i+i+t}}$$

En appliquant ici l'analyse de l'article premier, il est facile de voir que le logarithme de ce terme est à très peu près,

$$\log p-\frac{t}{i+2r}+2t.\log\frac{ei}{2}-t.\log r-\frac{(1+2+3.\;.+t)}{r}$$
$$-t.\log.\overline{i+r}-\frac{(1+2+3\;\;+t)}{i+i}.$$

Mais on a à très peu près

$$\log.(r.\overline{i+r})=2\log\frac{ei}{2},$$

en ne conservant donc, conformément à la méthode citée, parmi les termes de l'ordre $\frac{1}{z}$, que ceux qui sont multipliés par t^2, et observant que

$$1+2+3\ldots+t=\frac{t^2+t}{2};$$

le logarithme du terme placé à la distance t du terme *maximum* sera

$$\log p-\frac{\overline{z+2r}\ t^2}{2r\ \overline{z+r}};$$

ce terme sera donc

$$p.c^{-\frac{\overline{z+2r}.t^2}{2r.\overline{z+r}}}$$

Il est facile de voir que ce sera aussi l'expression du terme qui précède p, du même intervalle t La somme de la série (m) sera donc à très peu près

$$p.\int dt.c^{-\frac{(z+2r)\ t^2}{2r\ \overline{z+r}}},$$

l'intégrale étant prise depuis $t=-\infty$ jusqu'à $t=\infty$, ce qui donne cette somme égale à

$$p.\sqrt{2\pi}.\sqrt{\frac{r\ \overline{z+r}}{z+2r}}$$

Si dans l'expression précédente de p, on substitue au lieu du produit

$$1.2.3\ldots r.\overline{z+1}.\overline{z+2}\ldots\overline{z+r}$$

sa valeur très rapprochée

$$\frac{(r\ \overline{z+1})^r.(z+r)^z\ 2\pi.c^{-z-2r}.\sqrt{r.\overline{z+r}}}{1\ 2\ 3.\ z}$$

on aura

$$p=\frac{1\ 2\ 3\quad z\ (z+2r).c^{z+2r}}{2\pi\ \sqrt{r\ \overline{z+r}}\ (z+r)^z};$$

ce qui, en observant que $z+2r$ est egal à $z.\sqrt{1+e^2}$, et que $z+r$ est égal à

$$\frac{z\sqrt{1+e^2}+z}{2},$$

donne pour la somme de la série (m),

$$\frac{1\ 2\ 3.\ \ldots i.(1+e^2)^{\frac{i}{4}}\ 2^i\ c^i\sqrt{1+e^2}.\sqrt{i}}{\sqrt{2\pi}\ i^i.(\sqrt{1+e^2}+1)^i}$$

En changeant e^2 dans $-e^2$, dans cette expression, on aura la valeur fort approchée de la série

$$i-\frac{\overline{i+2}}{1\ \overline{i+1}}.\left(\frac{ei}{2}\right)^2+\frac{\overline{i+4}.\left(\frac{ei}{2}\right)^4}{1\ 2.\overline{i+1}\ \overline{i+2}}-\frac{\overline{i+6}.\left(\frac{ei}{2}\right)^6}{1\ 2\ 3.\overline{i+1}\ \overline{i+2}\ \overline{i+3}}+\text{etc}$$

Ces passages du positif au négatif, comme du réel à l'imaginaire, ne doivent être employés qu'avec une grande circonspection. Mais ici, e^2 étant indéterminé, on peut les employer sans crainte. J'en ai reconnu d'ailleurs l'exactitude, par une autre analyse. On a ainsi

$$b^{(i)}=-\frac{2\ (1-e^2)^{\frac{1}{4}}}{i\sqrt{i}\ \sqrt{2\pi}}.\frac{c^i\sqrt{1-c^2}\ e^i}{(1+\sqrt{1-e^2})^i}$$

Lorsque i est infini, cette valeur de $b^{(i)}$ reste toujours infiniment petite, quel que soit e, pourvu qu'il n'excède pas l'unité.

Sur le Flux et Reflux lunaire atmosphérique

6. J'ai donné à la fin du livre XIII de mon *Traité de Mécanique céleste*, la théorie du flux et reflux lunaire atmosphérique. J'ai conclu les élémens de ce phénomène, d'une longue suite d'observations du baromètre faites à l'Observatoire royal pendant sept années consécutives, chaque jour à neuf heures du matin, à midi, et le soir, à trois heures et à neuf heures. L'ensemble de ces observations réduites par M. Bouvard à zéro de température, a donné cinquante-cinq millièmes de millimètre pour l'étendue entière du flux lunaire, depuis son *maximum* jusqu'à son *minimum*, et trois heures dix-neuf minutes sexagésimales, pour l'heure de son *maximum* du soir, le jour de la syzygie. Mais j'ai reconnu par le calcul des probabilités, que cette heure, et l'existence même du phénomène sensible à Paris, n'ont qu'un faible degré de probabilité. Le système d'observations, suivi à l'Observatoire royal, déjà adopté dans quelques autres Observatoires, et que l'on doit désirer de voir répandu généralement, est dû à M. Ramond qui l'a employé dans les nombreuses observations qu'il a faites à Clermont, chef-lieu du département du

Puy-de-Dôme. Il l'a exposé, ainsi que les résultats qu'il en a déduits sur la variation diurne du baromètre, dans plusieurs mémoires lus à l'Institut, et qui peuvent être regardés comme une des choses les plus intéressantes que l'on ait faites en Météorologie M. Bouvard a confirmé ces résultats, dans ses recherches qu'il vient de perfectionner en ajoutant quatre années d'observations à celles des sept années qu'il avait considérées, et en discutant avec une attention scrupuleuse, les observations de ces onze années, dans la réduction desquelles il a eu égard à la dilatation de l'échelle du baromètre.

Ce travail immense m'a fait reprendre ma théorie du flux lunaire atmosphérique. J'ai déterminé avec un soin spécial, les facteurs par lesquels on doit multiplier les diverses équations de condition, pour obtenir les résultats les plus avantageux, dans lesquels l'erreur moyenne à craindre en plus ou en moins, est un *minimum* Ces facteurs ne sont point ceux que donne le procédé connu sous le nom *Méthode des moindres carrés*, procédé qui n'est qu'un cas particulier de la méthode la plus avantageuse, et dont il diffère dans la plupart des questions où il a été employé. En effet, lorsqu'il s'agit, par exemple, de corriger les élémens elliptiques du mouvement des planètes, on forme des équations de condition, en égalant chaque longitude observée, à la longitude calculée par ces élémens augmentés, chacun, de sa correction. On forme ainsi un grand nombre d'équations de condition Ensuite on multiplie chacune d'elles par le coefficient de la première correction, et l'on ajoute toutes ces équations ainsi multipliées, ce qui donne une première équation finale En opérant de la même manière, relativement à la seconde correction, à la troisième, etc., on forme autant d'équations finales, qu'il y a de corrections que l'on détermine en résolvant ces équations. Mais la longitude n'est point le résultat d'une observation directe, elle est déduite de deux observations faites avec des instrumens différens, dont l'un donne l'ascension droite de l'astre, et dont l'autre donne sa déclinaison. La loi de probabilité des erreurs de chacun de ces instrumens peut n'être pas la même de plus ces erreurs ont, suivant la position de l'astre, une influence différente sur la longitude La méthode des moindres carrés, dont plusieurs géomètres ont donné des preuves très peu satisfaisantes, ne donne point ici les facteurs les plus avantageux, elle n'a plus que l'avantage d'offrir un moyen régulier de former les équations finales J'ai présenté dans le troisième Supplément à ma

Théorie analytique des Probabilités, l'expression générale des facteurs les plus avantageux

M. Bouvard ayant appliqué mes formules à toutes les observations qu'il a considérées, en a conclu que l'étendue entière du flux lunaire est de dix-huit millièmes de millimètre, et que l'heure du plein flux lunaire, le soir du jour de la syzygie, est deux heures huit minutes. Ces nouveaux résultats sont différens des premiers, mais quoiqu'ils soient fondés sur 298 syzygies et autant de quadratures, dans chacune desquelles on a considéré le second et le premier jour avant la phase, le jour même de la phase et les deux jours suivans, ils n'ont cependant qu'un faible degré de probabilité, en sorte que l'on doit jusqu'ici regarder comme incertaine, l'existence sensible à Paris, du flux lunaire atmosphérique. Le même nombre d'observations faites avec le même soin à l'équateur, et discuté de la même manière, indiquerait ce phénomène avec une grande probabilité. Il est vraisemblable que de pareilles observations faites dans un port où les marées sont très grandes, tel que celui de Saint-Malo, manifesteraient le flux atmosphérique produit par l'élévation et par la dépression de l'atmosphère, due à l'élévation et à la dépression alternatives de la surface de la mer.

M. Ramond a remarqué le premier, que la variation diurne du baromètre, de neuf heures du matin à trois heures du soir n'était pas la même dans toutes les saisons; M Bouvard a confirmé ce résultat. Il a trouvé 1° la variation moyenne des trois mois de novembre, décembre et janvier, égale à $0^{mil},557$, 2° celle des trois mois suivans égale à $0^{mil},940$, 3° celle des trois mois de mai, juin et juillet, égale à $0^{mil},752$, 4° celle des trois autres mois, égale à $0^{mil},802$, ce qui donne $0^{mil},762$ pour la variation moyenne de l'année entière. Ces différences dépendent-elles des anomalies du hasard, ou indiquent-elles des causes régulières? c'est ce que le calcul des probabilités peut seul faire connaître. Il était donc intéressant de l'appliquer à cet objet J'ai trouvé qu'il y a une très grande probabilité que des causes régulières ont produit le *minimum* $0^{mil},557$ de la variation, et son *maximum* $0^{mil},940$, mais que les différences entre les variations $0^{mil},752$, $0^{mil},802$ et la moyenne $0^{mil},762$ de l'année, peuvent sans invraisemblance être attribuées aux anomalies du hasard

Les 132 mois d'observations que M Bouvard a discutées pour avoir la variation diurne du baromètre, présentent ce phénomène remarquable, savoir, que la variation moyenne de neuf heures du matin à trois heures

du soir a été positive pour chacun de ces mois Je trouve par le calcul des probabilités, que ce phénomène, loin d'être extraordinaire, est *à priori* vraisemblable

7 Je nomme λ, l'heure sexagésimale du flux et reflux lunaire atmosphérique du soir, le jour de la syzygie supposée arriver à midi, cette heure étant convertie en arc, à raison de la circonférence pour un jour Je nomme R la hauteur du baromètre au-dessus de sa hauteur moyenne, au moment du flux, produite par l'action de la Lune sur l'atmosphère. Je fais

$$4R.\sin\lambda = x\,; \quad 4R.\cos\lambda = y\,.$$

Soient A_i, A'_i, A''_i, les hauteurs observées du baromètre, à neuf heures sexagésimales du matin, à midi et à trois heures du soir, le jour i^{eme}, à partir de la syzygie, i étant nul pour le jour de la syzygie, positif pour les jours qui le suivent, et négatif pour les jours qui le précèdent Soient pareillement B_i, B'_i, B''_i, les hauteurs observées du baromètre, à neuf heures du matin, midi et trois heures du soir, le jour $i^{ème}$ à partir de la quadrature Je suis parvenu dans le chapitre VII du livre XIII de la *Mécanique céleste*, aux deux équations suivantes

$$\left.\begin{aligned} x.\cos 2iq + y.\sin 2iq &= E_i \\ y.\cos 2iq - x.\sin 2iq &= F_i \end{aligned}\right\}, \qquad (O)$$

dans lesquelles q est le moyen mouvement synodique de la Lune dans un jour; et l'on a

$$E_i = A''_i - A'_i + B_i - B''_i;$$
$$F_i = (2A'_i - A_i - A''_i - 2B'_i + B_i + B''_i).\left(1 + \frac{1}{19}\right),$$

les équations (O) donnent

$$x = E_i.\cos 2iq - F_i.\sin 2iq\,, \qquad (u)$$

on peut former autant d'équations semblables qu'il y a de syzygies, et que i a de valeurs. En nommant donc n le nombre de syzygies, n étant un grand nombre, en nommant s' le nombre des valeurs de i, on aura ns' valeurs de x, d'où il faut conclure la valeur la plus avantageuse, c'est-à-dire celle dans laquelle l'erreur moyenne à craindre en plus ou en moins est la plus petite.

On doit pour cela multiplier chacune des ns' équations que représente l'équation (u) par un facteur convenable. J'ai fait voir (page 32

du troisième Supplément à ma Théorie analytique des Probabilités), que si l'on a entre les élémens x, y, z, etc., un grand nombre d'équations de condition représentées par la suivante,

$$\begin{aligned} & l^{(s)}.x + p^{(s)}.y + q^{(s)}.z + \text{etc} \\ = & a^{(s)} + m^{(s)}.\gamma^{(s)} + n^{(s)}.z^{(s)} + r^{(s)}.\delta\rho^{(s)} + \text{etc.}, \quad (i) \end{aligned}$$

le facteur le plus avantageux par lequel cette équation doit être multipliée, est

$$\frac{1}{\frac{k''}{k}.m^{(s)2} + \frac{\overline{k''}}{\overline{k}}\, n^{(s)2} + \frac{\overline{\overline{k''}}}{\overline{\overline{k}}}.r^{(s)2} + \text{etc}}$$

k, k'', $\overline{k}$, $\overline{k''}$, etc ; dépendant des lois de probabilité des erreurs $\gamma^{(s)}$, $\lambda^{(s)}$, etc , de la manière suivante Si $\varphi(\gamma^{(s)})$ est la loi de probabilité de l'erreur $\gamma^{(s)}$, cette loi étant supposée la même pour les erreurs positives et pour les erreurs négatives, on a

$$k = 2\int d\gamma^{(s)}.\varphi(\gamma^{(s)}), \quad k'' = \int d\gamma^{(s)}.\gamma^{(s)2}.\varphi(\gamma^{(s)}),$$

les intégrales étant prises depuis zéro jusqu'à l'infini, pareillement si $\psi(\lambda^{(s)})$ est la loi de probabilité des erreurs $\lambda^{(s)}$, on a

$$\overline{k} = 2\int d\lambda^{(s)}.\psi(\lambda^{(s)}); \quad \overline{k''} = \int d\lambda^{(s)}.\lambda^{(s)2}.\psi(\lambda^{(s)}),$$

et ainsi du reste. Dans la question présente, $\gamma^{(s)}$, $\lambda^{(s)}$, etc , sont les erreurs des observations désignées par les lettres $A_i^{(s)}$, $A'^{(s)}_i$, $A''^{(s)}_i$, $B_i^{(s)}$, etc , observations qui se rapportent au $i^{ème}$ jour depuis la $s^{ième}$ syzygie La loi des erreurs des observations étant supposée la même pour toutes ces observations, on aura

$$k = \overline{k} = \overline{\overline{k}}, \text{ etc.}, \quad k'' = \overline{k''}, \text{ etc},$$

le facteur précédent deviendra donc

$$\frac{1}{\frac{k''}{k}\,(m^{(s)2} + n^{(s)2} + r^{(s)} + \text{etc.})}$$

En désignant par $\gamma_i^{(s)}$, $\lambda_i^{(s)}$, $\delta_i^{(s)}$, $\overline{\gamma}_i^{(s)}$, $\overline{\lambda}_i^{(s)}$, $\overline{\delta}_i^{(s)}$, les erreurs des observations $A_i^{(s)}$, $A'^{(s)}_i$, $A''^{(s)}_i$, $B_i^{(s)}$, $B'^{(s)}_i$, $B''^{(s)}_i$, et par $\overline{m}^{(s)}$, $\overline{n}^{(s)}$, $\overline{r}^{(s)}$, relativement aux trois dernières de ces observations, ce que représentent $m^{(s)}$, $n^{(s)}$, $r^{(s)}$, relativement aux trois premières, on aura

$$m^{(s)} = -\cos 2iq + \left(1 + \frac{1}{19}\right).\sin 2iq,$$

$$n^{(s)} = -2\left(1 + \frac{1}{19}\right).\sin 2iq,$$

$$r^{(s)} = \cos 2iq + \left(1 + \frac{1}{19}\right).\sin 2iq,$$

$$\overline{m}^{(s)} = -m^{(s)}, \quad \overline{n}^{(s)} = -n^{(s)}, \quad \overline{r}^{(s)} = -r^{(s)},$$

le facteur précédent devient ainsi,

$$\frac{1}{\frac{4k''}{k}.\left\{1 + 2,324 \sin^2 2iq\right\}},$$

En réunissant toutes les valeurs de x, multipliées par ce facteur, on aura

$$\frac{x}{1 + 2,324.\sin^2 q} = \frac{\cos 2iq \; \frac{S.E_i^{(s)}}{n} - \sin 2iq \; \frac{S\,F_i^{(s)}}{n}}{1 + 2,324 \sin^2 2iq};$$

$E_i^{(s)}$ et $F_i^{(s)}$ étant les valeurs de E_i et de F_i relatives à la $s^{ième}$ syzygie et à la s^{ieme} quadrature à laquelle on la compare Le signe S indiquant la somme des quantités qu'il précède, pour toutes les syzygies dont le nombre est n, $\frac{S\,E_i^{(s)}}{n}$ et $\frac{S\,F_i^{(s)}}{n}$ seront donc les moyennes des valeurs de $E_i^{(s)}$ et $F_i^{(s)}$, moyennes que l'on obtiendra en substituant dans les expressions de E_i et de F_i, au lieu de A_i, A'_i, A''_i, B_i, etc, leurs valeurs moyennes L'équation précédente deviendra ainsi,

$$\frac{x}{1 + 2,324 \sin^2 2iq} = \frac{E_i \cos 2iq - F_i \sin 2iq}{1 + 2,324 \sin^2 2iq},$$

cette équation produit autant d'équations que i a de valeurs Si l'on réunit ces équations, on aura

$$x.\Sigma.\frac{1}{1 + 2,324 \sin^2 2iq} = \Sigma\left(\frac{E_i.\cos 2iq - F_i \sin 2iq}{1 + 2,324.\sin^2.2iq}\right),$$

le signe Σ exprimant la somme des valeurs du terme qu'il précède, on aura ainsi pour la valeur de x la plus avantageuse,

$$x = \frac{\Sigma\left(\frac{E_i \cos 2iq - F_i.\sin 2iq}{1 + 2,324 \sin^2 2iq}\right)}{\Sigma.\frac{1}{1 + 2,324.\sin^2.2iq}}.$$

Les équations (O) donnent

$$y = F_i . \cos 2iq + E_i . \sin 2iq,$$

on aura donc la valeur de y la plus avantageuse, en changeant dans l'expression précédente de x, $\cos 2iq$ dans $\sin 2iq$, et $\sin 2iq$ dans $-\cos 2iq$, ce qui donne

$$y = \frac{\Sigma . \left(\frac{E_i \sin 2iq + F_i \cos 2iq}{1 + 2,324 \cos^2 . 2iq} \right)}{\Sigma \frac{1}{1 + 2,324 . \cos^2 . 2iq}}$$

M Bouvard a conclu de ces formules

$$x = 0,031758; \quad y = 0,01534,$$

et l'étendue entière 2R du flux lunaire atmosphérique, égale à 0,01763

8 Je vais présentement déterminer la loi de probabilité des erreurs de ces deux valeurs de x et de y Il résulte des formules que j'ai données dans ma Théorie analytique des Probabilités, que si γ, λ, δ, etc., sont des erreurs indépendantes, mais assujetties à la même loi de probabilité, la probabilité que l'erreur de la fonction

$$m\gamma + n\lambda + r\delta + \text{etc.}$$

sera égale à une quantité quelconque l, est proportionnelle à l'exponentielle

$$c^{\frac{-kl^2}{4k'' \, H}},$$

H étant la somme des carrés de m, n, r, et c étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est l'unité Si dans la valeur précédente de x, on désigne par γ, δ, λ, les erreurs des observations $A_i^{(s)}$, $A'^{(s)}_i$, $A''^{(s)}_i$, il est facile de voir que les coefficiens de ces erreurs sont

$$\frac{\left(1 + \frac{1}{19}\right)(\sin 2iq - \cos 2iq) . \frac{1}{1 + 2,324 \sin^2 . 2iq}}{n \, \Sigma . \frac{1}{1 + 2,324 \sin^2 . 2iq}},$$

$$\frac{-2\left(1 + \frac{1}{19}\right) . \sin 2iq . \frac{1}{1 + 2,324 \sin^2 2iq}}{n \, \Sigma . \frac{1}{1 + 2,324 . \sin^2 . 2iq}}$$

$$\frac{\left(1+\frac{1}{19}\right)(\sin 2iq+\cos 2iq).\frac{1}{1+2,324\sin^2 2iq}}{n\,\Sigma\,\frac{1}{1+2,324.\sin^2 2iq}}$$

La somme des carrés de ces coefficiens, est

$$2.\frac{1}{1+2,324.\sin^2 2iq}.\frac{1}{n^2\left(\Sigma\,\frac{1}{1+2,324.\sin^2 2iq}\right)^2};$$

La somme des carrés des coefficiens des erreurs des observations $B_i^{(i)}$, $B'^{(i)}_i$, $B''^{(i)}_i$ est égale à la précédente En ajoutant donc ces deux sommes, on aura

$$4.\frac{1}{1+2,324\sin^2 2iq}.\frac{1}{n^2\left(\Sigma.\frac{1}{1+2,324\sin^2 2iq}\right)}.$$

Chaque syzygie fournit une quantité semblable, la somme de toutes ces quantités sera donc, pour les n syzygies, la quantité précédente multipliée par le nombre n des syzygies Cette somme sera donc relativement à toutes les syzygies, et relativement à toutes les valeurs de i, c'est-à-dire relativement à toutes les observations,

$$\frac{4}{n\,\Sigma\,\frac{1}{1+2,324\sin^2 2iq}}.$$

Ainsi la probabilité que l sera l'erreur de x, peut être supposée égale à

$$H.c^{\frac{-l^2 n}{16\frac{k''}{k}}\Sigma\frac{1}{1+2,324\sin^2 2iq}},$$

H étant une constante qu'il faut déterminer Pour cela, j'observe que si l'on intègre cette différentielle depuis $l=-\infty$, jusqu'à $l=\infty$, l'intégrale doit être l'unité, puisqu'il est certain que la valeur de l est comprise dans ces limites, en faisant donc

$$g^2=\frac{nk}{16\,.\,k''}\,.\,\Sigma\,.\,\frac{1}{1+2,324.\sin^2 2iq},$$

on doit avoir

$$H.\int_{-\infty}^{+\infty}dl.c^{-g^2 l^2}=1$$

Mais on a, par un théorème connu,

$$\int_{-\infty}^{\infty} g dl . c^{-g^2 l^2} = \sqrt{\pi},$$

π étant la demi-circonférence dont le rayon est l'unité ; on a donc

$$H = \frac{g}{\sqrt{\pi}}$$

Ainsi la probabilité que l'erreur de la valeur de x sera comprise dans des limites données, est

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} . \int g dl . c^{-g^2 l^2},$$

l'intégrale étant prise dans ces limites

On trouve de la même manière que la probabilité que l'erreur de la valeur de y sera comprise dans les limites données, est

$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} . \int g' dl . c^{-g'^2 l^2},$$

l'intégrale étant prise dans ces limites, et g'^2 étant égal à

$$\frac{nk}{16 . k''} . \Sigma \frac{1}{1 + 2,324 \cos^2 . 2iq}.$$

Il faut maintenant déterminer par les observations, la valeur numérique de $\frac{k}{k''}$ Pour cela, j'observe que par ma théorie analytique des probabilités, si l'on nomme e la somme des carrés des différences des variations journalières de neuf heures du matin à trois heures du soir, d'un grand nombre s de jours à leur variation moyenne, on a, avec une très grande vraisemblance,

$$\frac{2k''}{k} . s = e,$$

ce qui donne

$$\frac{k}{k''} = \frac{2s}{e}$$

Le calcul de $\frac{k}{k''}$ devient pénible, lorsque s est très considérable, mais on peut le simplifier de la manière suivante

Je conçois le nombre s de jours partagé en groupes de jours, par exemple, dans un nombre i de mois moyens, et je suppose s assez grand,

pour que i soit lui-même un grand nombre Je désigne par $\bar{k}$ et $\bar{k}''$, relativement à ces mois, ce que j'ai nommé k et k'' relativement aux jours Soit encore E la somme des carrés des différences des erreurs des variations moyennes de chacun de ces mois, à la variation moyenne de tous ces mois On aura par ce qui précède

$$\frac{\bar{k}}{\bar{k}''} = \frac{2i}{E}$$

Mais la probabilité de l'erreur u de la variation moyenne de tous ces jours, ou de tous ces mois, est par la théorie citée proportionnelle à l'exponentielle

$$c^{\frac{-su^2}{4\frac{\bar{k}'}{\bar{k}}}}$$

Elle est encore proportionnelle à l'exponentielle

$$c^{\frac{-iu^2}{4\frac{\bar{k}'}{\bar{k}}}},$$

en comparant ces exponentielles, on aura

$$\frac{k}{k''} = \frac{i}{s} \cdot \frac{\bar{k}''}{\bar{k}} = \frac{2i^2}{sE}.$$

Le calcul de E est beaucoup plus simple que celui de e, et c'est ainsi que la valeur numérique de $\frac{k}{k''}$ a été déterminée. Il y avait pour cela, quelques précautions à prendre La variation diurne du baromètre n'est pas la même à Paris, dans tous les mois, elle est la plus petite dans ceux de novembre, décembre et janvier, et la plus grande dans les trois mois suivans Dans les six autres mois, elle diffère peu de la variation moyenne de l'année Il y a donc des causes régulières de ces phénomènes, et que l'on ne doit pas confondre avec les causes irrégulières de la variation diurne. Les causes régulières agissant de la même manière sur la variation diurne des syzygies et sur celle des quadratures, elles n'influent point sur les valeurs de x et de y, qui ne dépendent que des différences de ces variations, les valeurs de E_i et de F_i ne dépendent que de ces différences. Il faut donc pour avoir la loi de probabilité des erreurs dont ces

valeurs sont susceptibles, ne considérer que les variations diurnes dépendantes des seules causes irrégulières, et qui paraissent être celles des mois de mai, juin, juillet, août, septembre et octobre, ce sont celles dont on a fait usage pour avoir la valeur de $\frac{k}{k''}$. On a trouvé ainsi, en prenant le millimètre carré pour unité, $E = 2,565118$, d'où l'on tire

$$\frac{k}{k''} = 4.0,42884$$

On a ensuite

$$\Sigma . \frac{1}{1 + 2,324 \sin^2 . 2iq} = 3,29667,$$

$$\Sigma \frac{1}{1 + 2,324 \cos^2 2iq} = 1,97904$$

Pour déterminer le flux lunaire, j'observe que l'on a $n = 298$, d'où l'on tire

$$g^2 = 3,29667 . 298 . 0,42884 . \tfrac{1}{4},$$
$$g'^2 = 1,97904\ 298 . 0,42884 . \tfrac{1}{4},$$

et, en supposant que la valeur de x soit le résultat des causes accidentelles, la probabilité qu'elle sera comprise dans les limites $\pm 0,031758$, sera

$$\frac{\int g dl . c^{-g^2 l^2}}{\sqrt{\pi}},$$

l'intégrale étant prise relativement à l, dans ces mêmes limites On trouve, au moyen des données précédentes, 0,3617 pour cette probabilité. Si cette probabilité était fort approchante de l'unité, elle indiquerait avec une grande vraisemblance, que la valeur de x n'est pas due aux seules anomalies du hasard, et qu'elle est en partie l'effet d'une cause constante qui ne peut être que l'action de la lune sur l'atmosphère Mais la différence considérable entre cette probabilité et la certitude représentée par l'unité montre que, malgré le très grand nombre d'observations employées, cette action n'est indiquée qu'avec une faible vraisemblance; en sorte que l'on peut regarder son existence sensible à Paris, comme incertaine La valeur de y, considérée de la même manière, donne encore plus d'incertitude sur cette existence

9 Je vais soumettre au calcul des probabilités, quelques singularités que la variation diurne du baromètre a présentées à M. Bouvard Ce savant astronome a trouvé par onze années d'observations baromé-

triques faites tous les jours à neuf heures du matin et à trois heures du soir, que la variation moyenne diurne du baromètre dans cet intervalle a été $0^{mil},557$ pour les trois mois de novembre, décembre et janvier, $0^{mil},940$ pour les trois mois de février, mars et avril, $0^{mil},752$ pour les trois mois de mai, juin et juillet, enfin, $0^{mil},789$ pour les trois mois d'août, septembre et octobre Il a trouvé $0^{mil},802$ pour la variation moyenne de l'année Déterminons la probabilité des différences de ces variations en les supposant dues aux anomalies du hasard

Si l'on nomme u l'erreur de la variation conclue par une moyenne de onze années ou de cent trente-deux mois, la probabilité de cette erreur sera proportionnelle à

$$c^{\frac{-132\,\overline{k}}{4\overline{k''}}\,u^2},$$

comme il est facile de s'en assurer par le n° 20 du second livre de ma Théorie analytique des Probabilités Pareillement si l'on nomme u' l'erreur de la variation conclue par une moyenne des mois de février, mars et avril, pendant onze années, la probabilité de u' sera proportionnelle à

$$c^{\frac{-33\,\overline{k}}{4\overline{k''}}\,u'^2},$$

la probabilité de l'existence simultanée de u et de u' sera donc proportionnelle à

$$c^{\frac{-33\,\overline{k}}{4\overline{k''}}\,(4u^2+u'^2)}.$$

Soit $u'=u+z$, la probabilité de l'existence simultanée de u et de z sera ainsi proportionnelle à

$$c^{\frac{-33\,\overline{k}}{4\overline{k''}}\left[5\left(u+\frac{1}{5}z\right)^2+\frac{4}{5}z^2\right]}$$

En multipliant cette exponentielle par du et intégrant le produit depuis $u=-\infty$, jusqu'à $u=\infty$, on aura une quantité proportionnelle à la probabilité de la valeur de z correspondante à l'ensemble de toutes les valeurs de u, et cette exponentielle sera proportionnelle à

$$c^{\frac{-33\,\overline{k}}{4\overline{k''}}\,\frac{4}{5}z^2}.$$

En faisant donc

$$h^2 = \frac{33 \,.\, \bar{k}}{4\bar{k}''} \,.\, \frac{4}{5},$$

la probabilité que la valeur de z sera comprise dans des limites données, est

$$\frac{\int h dz \; c^{-h^2 z^2}}{\sqrt{\pi}},$$

l'intégrale étant prise dans ces limites Par les observations précédentes, z est égal à $0^{mil},940 - 0^{mil},763$ ou à $0^{mil},177$; ainsi la probabilité que z est au-dessous de $0^{mil},177$, est

$$1 - \frac{\int_{0,177\,h}^{\infty} dt c^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}.$$

On a par le n° 44 de ma Théorie analytique des probabilités,

$$\frac{\int_{T}^{\infty} dt c^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} = \frac{c^{-T^2}}{2T.\sqrt{\pi}}\left(1 - \frac{1}{2T^2} + \frac{1.3}{2^2\,T^4} - \frac{1\;3.5}{2^3T^6} + \text{etc}\right),$$

et la série a l'avantage de donner une valeur alternativement plus grande et plus petite, suivant que l'on s'arrête à un nombre pair ou impair de ses termes.

Si l'on fait $\frac{1}{2T^2} = q$; la série $1 - \frac{1}{2T^2} + \frac{1.3}{2^2T^4} - vc$, peut être mise sous la forme suivante, de fraction continue

$$\cfrac{1}{1 + \cfrac{q}{1 + \cfrac{2q}{1 + \cfrac{3q}{1 + \cfrac{4q}{1 + \text{etc}}}}}}$$

Ici l'on a

$$T = 0,177.h, \quad h^2 = 33 \,.\, \frac{\bar{k}}{4\bar{k}''} \,.\, \frac{4}{5},$$

et l'on a par le n° précédent

$$\frac{k}{4k''} = 33 \,.\, \frac{k}{4k''} = 33 \,.\, 0{,}42884 = 12{,}8652,$$

on a donc

$$T^2 = (0{,}177)^2 \,.\, 24 \,.\, 12{,}8652,$$

c'est le logarithme hyperbolique de c^{T^2}, et pour avoir le logarithme tabulaire de cette exponentielle, il faut le multiplier par 0,434294. On trouvera ainsi à fort peu près

$$\frac{\int_T^\infty dt \,.\, c^{-t^2}}{\sqrt{\pi}} = 0{,}0000015815,$$

en retranchant ce nombre de l'unité, on aura la probabilité que l'excès de la variation diurne observée pendant les trois mois de février, mars et avril, et pendant onze années, sur la variation moyenne des onze années, serait moindre que $0^{mil}{,}177$, s'il était dû aux simples anomalies du hasard. L'excès observé indique donc avec une extrême vraisemblance une cause constante, qui augmente à Paris, la variation diurne du baromètre, pendant les trois mois cités

On trouve de la même manière que l'excès $0^{mil}{,}205$, de la variation moyenne de l'année, sur la variation moyenne des trois mois de novembre, décembre et janvier, indique avec une vraisemblance encore plus grande, une cause constante, qui diminue la variation diurne pendant ces mois

Enfin on trouve que les différences observées entre la variation moyenne de l'année, et les variations moyennes, soit des trois mois de mai, juin et juillet, soit des trois mois d'août, de septembre et octobre, peuvent sans invraisemblance être attribuées aux seules anomalies du hasard

Les observations de la variation diurne du baromètre, de neuf heures du matin à trois heures du soir, discutées par M Bouvard, présentent ce phénomène remarquable, savoir que la variation moyenne de chacun des cent trente-deux mois qu'il a considérés, a été positive Pour apprécier la probabilité de ce phénomène, je supposerai que la variation moyenne des trois mois de novembre, décembre et janvier, serait, indépendamment des anomalies du hasard, et par l'effet des seules causes régulières, celle que M Bouvard a conclue de onze an-

nées d'observations, savoir $0^{mil},557$ Je ferai une supposition semblable relativement à la variation des trois mois suivans, février, mars et avril, et qui a été trouvée de $0^{mil},940$. Enfin je supposerai que la variation moyenne des six autres mois, qui ne paraît être soumise qu'à l'action des causes accidentelles, est celle que l'on a trouvée pour l'année entière, savoir $0^{mil},762$ Cela posé, si l'on nomme u l'erreur de la variation d'un mois, due aux seules causes accidentelles, la probabilité de cette erreur sera par ce qui précède, proportionnelle à $c^{-12,525\,u^2}$ D'où il est facile de conclure que la probabilité que u ne sera pas au-dessous de $0^{mil},557$ sera

$$1 - \frac{\int dt.c^{-t^2}}{\sqrt{\pi}},$$

en supposant

$$t^2 = 12,8652.u^2,$$

et l'intégrale étant prise depuis $t = 0,557 . \sqrt{12,8652}$ jusqu'à $t = \infty$

La probabilité qu'aucun des trois mois de novembre, décembre et janvier n'aura de variation négative, ou que l'erreur négative de u n'atteindra jamais $-0^{mil},557$, sera

$$\left(1 - \frac{\int dt.c^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}\right)^3,$$

et celle que le même résultat aura lieu pendant onze années sera

$$\left(1 - \frac{\int dt\, c^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}\right)^{33}.$$

On trouvera de la même manière que la probabilité semblable relative aux trois mois de février, mars et avril est

$$\left(1 - \frac{\int dt.c^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}\right)^{33},$$

l'intégrale étant prise depuis $t = 0,940 \sqrt{12,8652}$ jusqu'à $t = \infty$

Enfin on trouvera que la probabilité semblable relative aux six autres mois est

$$\left(1 - \frac{\int dt.c^{-t^2}}{\sqrt{\pi}}\right)^{66},$$

l'intégrale étant prise depuis $t = 0^{mil},762 . \sqrt{12,8652}$ jusqu'à $t = \infty$

Le produit de ces trois probabilités est la probabilité du phénomène

observé, que l'on trouvera ainsi à peu près égale à 0,9; en sorte que, loin de présenter une chose invraisemblable, il est lui-même vraisemblable

J'ai supposé dans tous ces résultats tous les mois égaux et de 30 jours On leur donnerait plus d'exactitude en y introduisant l'inégalité des mois, ce qui n'a d'autre difficulté que la longueur du calcul Mais comme il suffit que ces résultats soient approchés pour que nos conclusions soient justes, soit relativement à l'existence des causes régulières qui produisent le *maximum* et le *minimum* de la variation, soit relativement à la vraisemblance du phénomène suivant lequel tous les 132 mois ont donné une variation diurne positive, on peut se dispenser de ce calcul

FIN

CATALOGUE

DES

LIVRES DE FONDS,

ET D'UNE PARTIE

DES LIVRES D'ASSORTIMENT,

QUI SE TROUVENT A LA LIBRAIRIE MATHEMATIQUE

DE BACHELIER,

(SUCCESSEUR DE MADAME VEUVE COURCIER,)

Libraire du Bureau des Longitudes de France, de l'École royale polytechnique, éditeur du *Journal de physique, de chimie et d'histoire naturelle*, *des Annales de l'Industrie nationale et étrangère*, 1re SERIE, et du *Recueil industriel*; Libraire pour les MATHEMATIQUES, LA PHYSIQUE, LES ARTS MECANIQUES, L'INDUSTRIE, LA MARINE, LES PONTS ET CHAUSSEES, les Sciences et les Arts qui en dépendent

QUAI DES AUGUSTINS, N° 55

PARIS.

JUILLET 1827.

OUVRAGES PUBLIÉS PAR SOUSCRIPTION.

RECUEIL INDUSTRIEL, MANUFACTURIER, agricole et commercial, de la salubrité publique et DES BEAUX-ARTS, Repertoire general des brevets d'invention, renfermant la description des expositions publiques faites en France et a l'etranger, par J-G-V *De Molléon*, ancien eleve de l'Ecole polytechnique, membre du jury central de l'exposition de 1823, etc

Le prix de la souscription, pour douze numeros, ou 4 vol, avec 48 planches, est, franc de port, de 30 fr pour Paris, de 36 fr pour les departemens, de 42 fr pour les pays etrangers On ne recoit pas de souscription pour *moins de douze numéros* Le premier numero a paru en janvier 1827

ANNALES DE L'INDUSTRIE NATIONALE ET ETRANGERE, ou MERCURE TECHNOLOGIQUE, recueil de Memoires sur les Arts et Metiers, les Manufactures, le Commerce, l'Industrie, l'Agriculture, etc, renfermant la description du MUSÉE des produits de l'industrie française, exposes au Louvre en 1819 —*Dédiées* au Roi, par *L Seb* LENORMAND, Professeur de technologie et des Sciences Physico-Chimiques appliquees aux arts, et J-G-V *de Moleon*, eleve de l'Ecole Polytechnique, membre de la Société d'Encouragement, etc., commencees en 1820 et terminees en 1826 inclusivement, 28 vol in-8 210 fr

Chaque annee, composée de 4 vol, se vend separement 30 fr

ANNALES DE MATHEMATIQUES PURES ET APPLIQUEES, Ouvrage periodique, redige par M J-D GERGONNE, Professeur de Mathematiques transcendantes, a la Faculte des Sciences de Montpellier

Depuis le 1er juillet 1810 ces Annales paraissent régulièrement de mois en mois par livraison de 32 pages in-4° a moins, en sorte que les 12 Livraisons de chaque annee forment un volume in 4° de près de 400 pages, accompagne de toutes les planches necessaires pour l'intelligence du texte

Le prix de la Souscription annuelle, commencant au 1er juillet de chaque annee, est de 21 fr, franc de port pour la France, et de 24 fr pour l'etranger

Chaque volume se vend separement 18 fr

Cet Ouvrage renferme une grande quantite de Memoires interessans sur les Mathematiques et toutes les parties qui en dependent.

ANNALES MARITIMES ET COLONIALES, contenant ce qui a paru depuis dix ans de plus interessant sur la Marine et les Colonies, publiees avec l'approbation de S Exc le Ministre de la Marine et des Colonies et sous les auspices de S A R. l'Amiral de France, par M BAJOT, Commissaire de Marine, Membre de la Legion-d'Honneur, Chef de bureau au Ministere Prix 25 fr

Franc de port pour la France, 31 fr

pour l'etranger, 37 fr

Il paraît un cahier par mois

Il reste encore quelques collections completes de ce Journal, depuis 1816 Prix de chaque annee, 25 fr

Comme Journal, les Annales Maritimes et Coloniales rendent un compte exact de ce qui est publie en France et chez l'etranger, comme Recueil, elles renferment un grand nombre de Memoires et de Voyages inedits du plus haut interet La Marine et les Colonies ayant leur regime particulier, une partie de leurs Annales est specialement consacrée a leur legislation et a leur administration militaire, civile et judiciaire Cette precieuse Collection est composee, jourd'hui, de 26 vol in-8, dont plusieurs de 1000 pages, avec des justification, avec des planches gravees au Depot general de la Marine et d'autres lithographiees

BULLETIN UNIVERSEL DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, dedie aux Savans de tous les pays et a la Marine nationale et etrangere, publie sous la direction de M le Baron DE FERUSSAC, Officier superieur au Corps royal d'État-Major, Chevalier de Saint-Louis et de la Légion-d'Honneur, Membre de plusieurs Societes savantes nationales et etrangeres

Conditions de la Souscription — Les abonnemens pour le Bulletin universel dans son ensemble, comme pour chacune de ses diverses sections, qu'on peut se procurer separément, datent de janvier, pour douze volumes ou douze numeros paraissant le 1er de chaque mois Le prix en est paye d'avance, les lettres de demande et l'argent sont adressés *franc de port*

Les prix d'abonnement pour l'année 1827 seront, en conséquence, fixes conformement au tableau suivant des sections du Bulletin

PRIX D'ABONNEMENT AU BULLETIN UNIVERSEL, etc

	Paris	Les dep, port franc	L'étran, port fr
	fr	fr c	fr
1 Sciences mathematiques, physiques et chimiques	15	17 50	20
2 Sciences naturelles et geologie	26	30 50	35
3 Sciences medicales, etc	22	25 50	29
4 Sciences agricoles, econ, etc	15	17 50	20
5 Sciences technologiques	18	21 »	24
6 Sciences geograph, econ, publ, voyages	22	25 50	29
7 Sciences hist, antiquites, philol	18	21 »	24
8 Sciences militaires	11	14 »	16
TOTAUX	148	172,50	197
Prix des 7 premieres sections prises ensemble	120	142 50	165
Prix du Bulletin complet	132	156 50	181

CORRESPONDANCE ASTRONOMIQUE, geographique, hydrographique et statistique, par M le baron de ZACH

Cet ouvrage paraît depuis le 1er juillet 1818, regulierement de mois en mois, par cahier de 6 a 7 feuilles d'impression

Le prix de la souscription annuelle, ou de douze cahiers, est de 36 francs pour Paris La collection se compose de 14 vol in-8, du prix de chacun 18 fr

ENCYCLOPEDIE PORTATIVE, ou Résumé universel des Sciences, des Lettres et des Arts, par une Societé de savans et de gens de lettres, sous la direction de MM Bailly et de Moleon Cet ouvrage formera deux series, chacune composee de 100 volumes grand in-32, de 250 a 300 pages

Le prix de chaque volume ou livraison est de 3 fr 50 c

Par la poste, 3 fr 80 c

Chaque volume se vend separement

La 1re Serie traitera des Sciences physiques, des Sciences rationnelles et des Sciences litteraires

Les 18 premières Livraisons de cette premiere Serie sont en vente

La 2e Serie traitera des Arts et Metiers, de l'Industrie en general et des Sciences appliquees à l'Industrie et aux Arts

JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE, D'HISTOIRE NATURELLE ET DES ARTS, Ouvrage periodique qui paraît tous les mois par cahier de dix feuilles d'impression, avec des pl en taille-douce, ce qui forme 2 vol par an, format in-4, par feu J-C DELAMÉTHERIE, Professeur au College de France, et continue par M H DE BLAINVILLE, Docteur en Medecine de la Faculte de Paris, Professeur de Zoologie, d'Anatomie et de Physiologie comparees, a la Faculte des Sciences, suppleant de M Cuvier au Jardin du Roi et au College de France, Membre et Secretaire de la Societe Philomathique, etc

Ce journal a cessé de paraître Il se termine avec le t 96

On trouve a la même adresse des Collections completes, des volumes et même des numeros separes

Le prix de chacun des volumes depuis le tome 50 jusqu'au tome 96 inclusivement est de 20 fr, ceux anterieurs ne

EXTRAIT DU CATALOGUE

DE BACHELIER, SUCCESSEUR DE Mme Ve. COURCIER,

Quai des Augustins, n° 55, à Paris

JUILLET 1827.

ALDINI ESSAI THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTAL SUR LE GALVANISME, 2 vol in-8 avec 10 planches 10 fr

ALLIX, Lieutenant-Général THÉORIE DE L'UNIVERS, ou de la cause primitive du Mouvement et de ses principaux effets, 2e edit, 1 vol in 8, 1818 5 fr

AMPERE, de l'Institut PRECIS DES LEÇONS SUR LE CALCUL DIFFÉRENTIEL ET INTÉGRAL, données à l'Ecole royale polytechnique, in-4 (1e partie) 8 fr

— Memoire sur quelques nouvelles propriétés des AXES PERMANENS de rotation des corps et des plans directeurs de ces axes, in-4 1823 4 fr

— Théorie des phenomènes électro-dynamiques, uniquement deduite de l'expérience, in-4, 1826, figures 9 fr

— Précis de la theorie des phénomènes electro dynamiques, in-8, 1824 2 fr

— Description d'un appareil électro-dynamique, in-8, 1826 1 f. 50 c.

— Exposé méthodique des phénomènes électro-dynamiques et des lois de ces phénomènes, in 8, 1823, 1 f 50 c.

— Memoire sur une nouvelle expérience électro-dynamique, in-8, 1825 1 f 50 c

— Précis d'un mémoire sur l'électro-dynamique in 8, 1825 1 fr

— Considérations sur la theorie mathematique du jeu, in-4 4 fr

ANALYSE DE LA LUMIERE deduite des lois de la mecanique, 1 fort vol in 8 avec planches, 1826 9 fr

ANALYSE de l'origine de tous les cultes, ou religion de Dupuis, in 8 3 fr

ANNALES DE L'INDUSTRIE nationale et etrangère de 1820 à 1826, formant 28 vol in 8 210 fr.

Chaque annee se vend séparement 30 fr.

Voyez ci-contre les Annales mensuelles de l'industrie

ANNUAIRE présenté au Roi par le BUREAU DES LONGITUDES de France, in-18 (Cet ouvrage paraît tous les ans) 1 fr

ARAGO ET BIOT RECUEIL D'OBSERVATIONS (*Voyez* BIOT) 21 fr

ARITHMETIQUE (L') des campagnes, a l'usage des Ecoles primaires, etc, ouvrage adopte par l'Université, in-12 1 fr

AVIS aux ouvriers en fer, sur la fabrication de l'acier, in-4, figures 3 fr

BIOT CALCUL DES PIEDS DE FER, indiquant leur grosseur et largeur, réduit au pied. *Nouv. édit*, augm du tarif du poids du fer ROND, à l'usage des serruriers, architectes-toiseurs, qui sont souvent chargés de faire des devis et marches concernant la serrurerie, à la suite duquel on trouvera les tarifs à tant la livre et à tant le cent, etc, et de plusieurs tables, 1 vol in-12, 1821 2 fr 50 c

BRON. PRÉCIS DES PRATIQUES DE L'ART NAVAL EN FRANCE, en Espagne et en Angleterre, etc, in-8, 1817. 6 f. 50 c

BILLY HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE ANCIENNE ET MODERNE, dans laquelle on a conservé litteralement le texte, en supprimant seulement les calculs abstraits, les notes hypothétiques, les digressions scientifiques, etc., par V C, 2 vol in-8 10 fr

CARRES DU MOLARD, *officier supérieur du corps royal d'artillerie* NOUVEAU système de ponts à grandes portees, ou moyen économique de construire des arches de toutes grandeurs, in-4, 1827, figures 7 fr

* BARROIS (Th) THÉORIE DES BATEAUX AQUAMOTEURS, propres à remonter les fleuves et à les descendre plus rapidement, par la seule action de leur courant, in-8, 1826, figures 1 f 50 c

BARRUEL, ex-Professeur à l'Ecole Polytechnique TABLEAUX DE PHYSIQUE, ou Introduction à cette science, à l'usage des Elèves de l'Ecole Polytechnique; nouv edit, entièrement refondue et augmentee, grand in-4, cart, 1806 10 fr

BASTENAIRE-DAUDENART, ancien manufacturier, ex-propriétaire et directeur de la manufacture de porcelaine à suite de Saint-Amand-les Eaux L'ART DE LA VITRIFICATION, ou TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE, THÉORIQUE ET PRATIQUE DE LA FABRICATION DU VERRE, ouvrage dans lequel sont décrits avec précision les divers procédés qu'on emploie pour se procurer toutes les espèces de verres et cristaux colorés, tant pour la formation des vases que pour les vitraux et les pierres imitant les pierres précieuses; ainsi que les manipulations relatives à cette branche importante de l'industrie française, suivi d'un Vocabulaire des mots techniques employés dans cet art, et d'un Traité de la dorure sur cristal et sur verre, 1 vol in-8°, avec planch 1825 7 fr

BAUDEUX Arithmetique universelle, traduite de NEWTON 2 vol in-4 40 fr

* BERARD NOUVELLE METHODE pour determiner les racines des equations numériques et les intégrales simples ou indéfinies, in-4, 1818 6 fr

* BERGERON MANUEL DU TOURNEUR, ouvrage dans lequel on enseigne aux amateurs la manière d'exécuter sur le tour à pointes, à lunettes, etc, tout ce que l'art peut produire d'utile et d'agreable, précédé de notions élementaires sur la connaissance des bois, la menuiserie, la fonte des métaux, etc 2e edition, revue et augmentée par Hamelin Bergeron 2 vol in-4 et atlas, 1816 60 fr

* BERGERY, Professeur de sciences appliquées à l'école d'artillerie de Metz, GÉOMETRIE APPLIQUÉE A L'INDUSTRIE, à l'usage des artistes et des ouvriers, in-8, 1825, figures 6 fr

* BERGERY Exercices d'arithmétique à l'usage des jeunes ouvriers qui veulent suivre les cours industriels, in-8, 1826. 50 c

* — GÉOMETRIE DES COURBES, appliquée à l'industrie, à l'usage des artistes et des ouvriers, in-8, 1825, figures 4 fr

BERLINGHIERI EXAMEN DES OPERATIONS ET DES TRAVAUX DE CESAR AU SIEGE D'ALÉZIA (œuvre posthume). Lucques, 1812. 3 fr. 50 c

BERNOULLI (Jacob) L'ART DE CONJECTURER à la Lorenne, traduit du latin, par *Vastel*, in 4. 7 fr 50 c.

BERTHOUD (F) L'ART DE CONDUIRE ET DE RÉGLER LES PENDULES ET LES MONTRES, 4e édit, augmentée d'une planche, et de la manière de tracer la ligne méridienne du temps moyen, 1811, vol in-12, avec 5 pl 2 fr 50 c

2° HISTOIRE DE LA MESURE DU TEMPS par les Horloges Paris, 1802, vol, in-4, avec 23 pl. gravées. 36 fr

3°. TRAITÉ DES HORLOGES MARINES contenant la theorie, la construction, la main-d'œuvre de ces machines, et la manière de les eprouver, suivi des eclaircissemens sur l'invention, la theorie, la construction et les épreuves des nouvelles machines proposées en France pour la détermination des longitudes en mer par la mesure du temps, un gros volume in-4, avec 27 planches, 1773 24 fr

4° ECLAIRCISSEMENS sur l'invention, la theorie, la construction et les épreuves des nouvelles machines proposées en France pour la determination des longitudes en mer par la mesure du temps, servant de suite à l'*Essai sur l'Horlogerie* et au *Traité des Horloges marines*, etc, vol in-4 6 fr

5° LES LONGITUDES PAR LA MESURE DU TEMPS, ou Méthode pour determiner les longitudes en mer, avec le secours des horloges marines, suivie du Recueil des Tables nécessaires au pilote, pour reduire les observations relatives à la longitude et à la latitude, 1 vol. in-4. 9 fr.

6° DE LA MESURE DU TEMPS, ou Supplément au Traité des horloges marines et à l'Essai sur l'horlogerie, contenant les principes de constructions, d'exécution et d'épreuves des petites horloges, à longitude des portatives, et l'application des mêmes principes de construction, etc, aux montres de poche, ainsi que plusieurs constructions d'horloges astronomiques, etc, onze pl en taille douce, 1 vol in-4 18 fr.

7° TRAITE DES MONTRES A LONGITUDES, contenant la description et tous les details de main d'œuvre de ces machines, leurs dimensions, la manière de les éprouver, etc, suivi 1° du Mémoire instructif sur le travail des montres à longitudes, 2° de la description de deux Horloges astronomiques, 3°. de l'Essai sur une Méthode simple de conserver le rapport des poids et des mesures, et d'établir une mesure universelle et perpetuelle, avec sept planches en taille-douce

8° Suite du Traité des Montres à Longitudes, contenant la construction des Montres verticales portatives, et celle des Horloges horizontales, pour servir dans les plus longues traversées, un volume in-4, avec deux planches en taille-douce *Prix de ces deux Ouvrages, réunis en un volume*, 24 fr

9° Supplement au Traité des Montres à Longitudes, suivi de la Notice des recherches de l'Auteur, depuis 1752 jusqu'en 1807 12 fr

Total de cette Collection, 191 fr 50 c

* BERTHEVIN. Élémens D'ARITHMÉTIQUE COMPLÉMENTAIRE, ou Méthode nouvelle, par laquelle à l'aide des complémens arithmétiques, on exécute toutes les opérations de calcul. Nouvelle edition, in-8, 1826 5 fr

BEZOUT COURS COMPLET DE MATHÉMATIQUES A L'USAGE DE LA MARINE, DE L'ARTILLERIE, et des Élèves de l'Ecole Polytechnique, nouvelle édition, revue et augmentée par M REYNAUD, Examinateur des Candidats de l'Ecole Polytechnique; et M. de ROSSEL, ancien capitaine de vaisseau, Directeur adjoint du Dépôt général des Cartes, Plans et Archives de la Marine 6 vol in-8, avec planches 31 f. 50

On vend separément,

ARITHMETIQUE

dues, et des Tables de Logarithmes jusqu'à 10,000, etc, par REYNAUD, douzième edit, 1826. 3 fr 50 c
Le texte pur se vend separement, 2 fr
Les notes seules, 2 fr 50 c
— GÉOMÉTRIE, avec des Notes fort etendues, par *le même*, troisième édit, 1824 6 fr
Le texte pur se vend séparement, 4 fr
Les notes seules, 4 fr
— ALGEBRE et Application de cette science à l'Arithmetique et à la Geometrie, nouvelle édition, avec des notes, par *le même*, in-8, 1822 6 fr
Le texte pur se vend séparement, 4 fr
Les Notes seules, 4 fr
— MÉCANIQUE, nouvelle edition, 2 vol, in 8 10 fr
— TRAITE DE NAVIGATION, nouvelle édition, revue et augmentée de Notes, et d'une Section supplémentaire où l'on donne la manière de faire les Calculs des Observations avec de Nouvelles Tables qui les facilitent, par M de Rossel, Membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes 1 vol in 8, avec 10 pl. 6 fr
— NOTES et additions aux trois premières sections du Traite de navigation, par Ant Reboul 3 fr
— Cours de mathematiques avec des notes et additions, par *Payrard*, GÉOMÉTRIE, 6e, edition in-8 6 fr
— Cours de mathématiques à l'usage de l'artillerie, 4 vol, grand in-8, (Texte pur) 24 fr
IOT et ARAGO, Membres de l'academie des Sciences et du Bureau des Longitudes de France RECUEIL D'OBSERVATIONS GEODESIQUES, ASTRONOMIQUES ET PHYSIQUES, exécutées par ordre du Bureau des Longitudes de France, en Espagne, en France, en Angleterre et en Ecosse, pour déterminer la variation de la pesanteur et des degres terrestres, sur le prolongement du meridien de Paris, faisant suite au troisième volume de la Base du système metrique. 1 vol in 4, avec fig, 1821 21 fr
IOT, TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE D'ASTRONOMIE PHYSIQUE, destiné à l'enseignement dans les Colléges, etc, 3 vol in-8, 1810.
— PHYSIQUE MECANIQUE, par E G FISCHER, traduite de l'allemand avec des Notes et un Appendice sur les anneaux colorés, la double refraction et la polarisation de la lumière, 4e edition, revue et considerablement augmentée, 1 vol in-8, avec planches *Sous presse*
— ESSAI DE GEOMÉTRIE ANALYTIQUE, appliquée aux courbes et aux surfaces du second ordre, in 8, 7e edition, 1826 6 fr. 50 c
— TABLES BAROMETRIQUES portatives, donnant les differences de niveau par une simple soustraction, in-8 1 fr 50 c
— Essai sur l'HISTOIRE GENERALE DES SCIENCES, pendant la révolution française, in-8 3 fr
— Recherches sur l'integration des équations différentielles, partielles, et sur les vibrations des surfaces (Extrait des memoires de l'Institut) in-4 4 fr
OISGENETTE CONSIDERATIONS SUR LA MARINE FRANÇAISE en 1818, et sur les dépenses de ce departement, vol in 8 1818 3 fr,
ONNEFOUX, capitaine de fregate, etc SEANCES NAUTIQUES ou expose des diverses manœuvres des vaisseaux, in-8, 1824, figures 5 fr
ORDA TABLES TRIGONOMÉTRIQUES DECIMALES, ou Tables des Logarithmes des sinus, secantes et tangentes, suivant la division du quart de cercle en cent degres, et précédées de la Table des Logarithmes des nombres, etc, calculées par Ch Borda, rev, augmentées et publiées par J-B-J Delambre Paris, an IX, in-4 15 fr
ORGNIS, Ingenieur et membre de plusieurs académies TRAITÉ COMPLET DE MÉCANIQUE APPLIQUÉE AUX ARTS, contenant l'exposition methodique des théories et des expériences les plus utiles pour diriger le choix, l'invention, la construction et l'emploi de toutes les espèces de machines, ouvrage divise en *dix Traites* format in 4, avec 249 planches, dessinées par *Gerard*, et gravées par *Adam*, 1818 a 1823 206 fr
Chaque Traite se vend séparément, ainsi qu'il suit *Excepte les 4 premiers*
I *De la composition des machines*, contenant la classification, la description et l'examen comparatif des organes mécaniques, avec tableaux synoptiques et 43 planches donnant les figures de plus de 1200 organes de machines, 1818 25 fr
II *Du mouvement des Fardeaux*, contenant la description et l'examen des machines les plus convenables pour transporter et élever toute espèce de fardeaux; volume de 334 pages et 20 planches gravées, 1818 20 fr
III *Des machines que l'on emploie dans les constructions diverses*, ou Description des Machines dont on fait usage dans les quatre genres d'Architecture, civile, hydraulique, militaire et navale, vol. de 336 pag. avec 26 planches, 1818 26 fr
IV *Des Machines hydraulique*, ou Machines employées pour élever l'eau nécessaire aux besoins de la vie, aux usages de l'Agriculture, aux épuisements temporaires et aux epuisements dans les mines, volume in 4, avec 27 pl, 1819 20 fr
V *Des Machines d'Agriculture* Ce volume décrit les instrumens et machines aratoires, les machines employées à récolter les produits du sol et à leur donner les preparations premières, les moulins et les mecanismes qui servent à épurer le blé et à bluter les farines, et enfin les pressoirs, les cylindres, les pilons et autres machines employées à l'extraction des huiles et du vin, etc, volume in 4 avec 28 planches, 1819 21 fr
VI *Des Machines employées dans diverses fabrications*, contenant la description des machines en usage dans les grosses forges et dans les ateliers de métallurgie, dans les papeteries dans les tanneries, etc, vol in 4, avec 27 pl, 1819 21 fr
VII *Des Machines qui servent à confectionner les étoffes*, contenant la manière de preparer les matieres filamenteuses, animales et végétales, l'examen comparatif des moyens mecaniques employés dans les filatures, la description des metiers avec leurs accessoires pour toutes espèces d'étoffes, depuis les plus simples jusqu'aux plus figurées, enfin, la maniere de donner aux étoffes les derniers apprêts ayant de être livrées au commerce, vol. in 4, avec 44 pl, 1820 30 fr
VIII *Des Machines qui imitent ou facilitent les fonctions vitales des corps animés*, suivi d'un appendice sur les machines de théâtres anciens, et sur les procédés en usage dans les théâtres modernes, pour effectuer les changemens a vue, les vols directs et obliques et autres effets, vol in-4, avec 27 pl, 1820 21 fr
IX THÉORIE DE LA MÉCANIQUE USUELLE, ou Introduction à l'etude de la Mécanique appliquée aux arts, contenant les principes de Statique, de Dynamique, d'Hydrostatique et d'Hydrodynamique applicables aux Arts industriels, la théorie des moteurs, des effets utiles des machines, des organes mecaniques intermediaires, et l'equilibre des supports, 1 vol in 4, 1821 15 fr
X DICTIONNAIRE DE MECANIQUE APPLIQUÉE AUX ARTS, contenant la définition et la description sommaire des objets les plus importans ou les plus usités qui se rapportent à cette science, avec l'enonce de leurs proprietes essentielles, suivi d'indications qui facilitent la recherche des details plus circonstanciés, in 4, 1823 13 fr
BORGNIS TRAITÉ ÉLÉM CONSTRUCTION APPLI CHITECTURE CIVILE, cipes qui doivent diriger, preparation des materiaux, tion et les proportions des stituent les edifices en gen tion des plans déja fixes, sui applications nécessaires monumens antiques et in-4, et Atlas de 30 pla Adam, 1823
BOSSUT Essai sur l'histoire thematiques depuis leur origine 2 vol in-8 10 fr
BOUCHARLAT, Professeur de Mathématiques transcendantes aux Ecoles militaires, Docteur des Sciences, etc THEORIE DES COURBES ET DES SURFACES du second ordre, précédée des principes fondamentaux de la Geométrie analytique, seconde édition in-8 6 fr
— ELEMENS DE CALCUL DIFFERENTIEL ET DE CALCUL INTEGRAL, 3e edition, revue et augmentee, in-8, avec planches, 1826 6 fr
— ELEMENS DE MÉCANIQUE, in-8, avec planches, 2e, édition, 1827. 6 fr
* BOUE ESSAI GEOLOGIQUE SUR L'ECOSSE, in 8, figures 8 fr
BOURDE-DE-VILLEHUET LE MANŒUVRIER, ou Essai sur la Theorie et la Pratique des mouvemens du navire et des évolutions navales, nouv edit, augmentee, 1° d'un Appendice du meme auteur, contenant les principes fondamentaux de l'arrimage des vaisseaux, suivi d'un memoire sur le meme sujet, par Grognard, ingenieur-constructeur, 2° des nouvelles Manœuvres du canon, a bord des vaisseaux du Roi, et du Mode d'exercice pour les officiers et les equipages, 1 fort vol in-8, gr pap cette fin, avec 11 pl., 1814 6 fr
— PRINCIPES FONDAMENTAUX de l'arrimage des vaisseaux, (*Extrait du Manœuvrier*), in-8 avec 3 planches 3 fr
BOURDON, *Inspecteur de l'Academie de Paris* ELEMENS D'ARITHMETIQUE, 1 vol in-8, 4e edit, 1826, *Ouvrage adopte par l'Université*, 5 fr
— ELEMENS D'ALGÈBRE, 4e edit considerablement augmentee, 1 fort vol in-8, 1825, *Ouvrage adopte par l'Université* 7 fr
— APPLICATION DE L'ALGEBRE A LA GEOMÉTRIE à deux et à trois dimensions, 1 fort vol in-8 avec 15 planches, *Ouvrage adopte par l'Université*, 1825, 7 fr, 50 c
— Thèse de mécanique, qui a été soutenue le 9 mars 1811 devant la faculté des sciences de Paris, etc, in-4. 3 f 50 c
*BRESSON DES FONDS PUBLICS français et etrangers, et des Opérations de la Bourse de Paris, ou Recueil contenant, 1° le detail sur les rentes 3 pour cent, 4 et demi pour cent et 5 pour cent consolidés, sur les Canaux, 2° des notions exactes sur tous les fonds étrangers, 3° les diverses manières de spéculer, etc, 5e edition, revue augmentée, conformement aux lois actuelles de la Bourse, in-12, 1825 3 fr 50 c
* — DE LA LIQUIDATION DES MARCHÉS A TERME a la Bourse de Paris, ouvrage contenant des details sur la méthode des compensations, la circulation et l'endossement des noms, les delegations, la balance générale des feuilles de liquidation, les paiemens et les livraisons des effets publics, etc, avec un aperçu sur les *fonds publics anglais*, faisant connaître la nature et l'etat de rentes 3 pour 100 consolides, 3 p 100 reduits, 3 et demi pour 100, nouveau 4 pour 100, annuités à vie, annuités longues, effets de la Banque, fonds de la Compagnie de la mer du Sud, fonds de la Compagnie des Indes, bons des Indes, billets de l'échiquier, fonds d'amortissement, etc; suivi de developmens sur le mode de liquidation en usage aux bourses de Londres d'Amsterdam et de

Francfort, avec des considérations sur l'influence que les marchés à termes en fonds public doivent exercer sur le crédit en général, et les intérêts commerciaux de chaque pays, in-12, 1826 2 fr

PRANCHON, Capitaine d'artillerie APPLICATION DE LA THÉORIE DES TRANSVERSALES sous des opérations géom sur le terrain, etc 1818, in 8 1 fr 80 c

— MÉMOIRE sur les lignes du second ordre 1817, in 8 2 fr

BRISSON DICTIONNAIRE RAISONNÉ DE PHYSIQUE, 6 vol in-8, et atlas in 4 36 fr

— PESANTEUR SPÉCIFIQUE DES CORPS, ouvrage utile à l'Histoire naturelle, à la Physique, aux Arts et au Commerce, 1 vol in 4, avec pl 15 fr

BUQUOY (Comte de) Exposition d'un nouveau Principe général de DYNAMIQUE, dont le principe des Vitesses virtuelles n'est qu'un cas particulier, lu à l'Institut de France le 28 août 1815, in-4 2 fr

---

BUREAU DES LONGITUDES DE FRANCE

---

* OBSERVATIONS ASTRONOMIQUES faites à l'observatoire royal de Paris, publiées par le Bureau des Longitudes, tome 1er in folio, 1825 50 fr
* TABLES DE JUPITER, DE SATURNE ET D'URANUS, par M BOUVARD, in-4 2e édition. 12 fr
* TABLES DE LA LUNE, par M BURCKHARDT, in-4 8 fr.
* TABLES DU SOLEIL, par M DELAMBRE, et Tables de LA LUNE, par M BURG, in-4. 18 fr
* TABLES ECLIPTIQUES DES SATELLITES DE JUPITER, par M. DELAMBRE, in-4 10 fr
* TABLES DE LA LUNE, formées par la seule théorie de l'attraction, par M le baron de DAMOISEAU, in 4 12 fr
* CONNAISSANCE DES TEMPS, à l'usage des astronomes et des navigateurs, pour les années 1827, 1828 et 1829 Prix de chaque année avec additions 6 fr, sans additions 4 fr
* ANNUAIRE présenté au Roi par le Bureau des Longitudes, in-18 (Cet ouvrage paraît tous les ans) 1 fr.

BURCKHARDT, Membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes de France TABLE DES DIVISEURS POUR TOUS LES NOMBRES DU 1er, 2e ET 3e MILLION, avec les nombres premiers qui s'y trouvent, grand in 4, pap vélin, 1817 36 fr
Chaque million se vend séparement, savoir le 1er million, 15 fr les 2e. et 3e chacun 12 fr

CAGNOLI TRAITÉ DE TRIGONOMETRIE, traduit de l'italien, par M Champy, 2e édition, in-4, 1808 18 fr

— Catalogue de 501 étoiles, suivi de tables relatives d'aberration et de nutation, etc, Montène, 1827, in-4 6 fr.

CARON DE MEZIÈRES TRAITÉ SUR LA FORCE DES BOIS DE CHARPENTE, ouvrage essentiel pour ceux qui veulent bâtir, et qui donne les moyens de procurer plus de solidité aux édifices, de connaître la bonne et la mauvaise qualité des Bois, de calculer leur force, etc, in-8 6 fr

CANARD, Professeur de Mathématiques transcendantes au Lycée de Moulin TRAITÉ ÉLEMENTAIRE DU CALCUL DES EQUATIONS, in 8 1808 6 fr

CARNOT, Général, Membre de l'Institut et de la Légion-d'Honneur, etc DE LA DEFENSE DES PLACES FORTES Ouvrage composé pour l'instruction des Elèves du Corps du Génie, troisième édition, revue et considérablement augmentée, avec 11 pl 1 vol in-4, 1812 25 fr
Le même Ouvrage, deuxième édit, sans planch, in-8, 1811 6 fr

— MÉMOIRE SUR LA FORTIFICATION primitive, pour servir de suite au Traité sur la défense des Places fortes, in-4, fig, 1823 6 fr

— GÉOMÉTRIE DE POSITION, in 4, papier vélin, 1803 18 fr
Le même Ouvrage, grand pap vélin 36 fr

— MÉMOIRE SUR LA RELATION qui existe entre les distances respectives de cinq points quelconques pris dans l'espace, suivi d'un ESSAI SUR LA THÉORIE DES TRANSVERSALES, in-4, 1806 5 fr

— DE LA CORRELATION DES FIGURES DE GEOMETRIE, an 9, in-8, gr pap 3 fr

— REFLEXIONS SUR LA MÉTAPHYSIQUE DU CALCUL INFINITESIMAL, in-8, fig nouv édit, revue et augmentée, 1813. 3 fr 50 c

— PRINCIPES DE L'EQUILIBRE et du Mouvement, in-8, 1803 5 fr.

*CARNOT, *ancien élève de l'Ecole polytechnique* REFLEXIONS SUR LA PUISSANCE MOTRICE DU FEU, in-8, 1824 3 fr

CHARPENTIER, *capitaine au corps royal d'artillerie de marine* TRAITÉ D'ARTILLERIE NAVALE, contenant un exposé succinct de la théorie du pendule balistique et des expériences de Hutton, les principes fondamentaux de l'artillerie navale, etc, traduit de l'anglais de Douglas, in-8, 1826, figures 7 fr

CHLADNI TRAITÉ D'ACOUSTIQUE, in-8, avec 8 planches. 7 fr. 50 c.

CHRISTIAN, Directeur du Conservatoire des Arts et Métiers TRAITÉ DE MÉCANIQUE INDUSTRIELLE, ou Exposé de la science de la Mécanique, déduite de l'expérience et de l'observation, à l'usage des manufacturiers et des artistes, 3 vol in-4 et Atlas de 60 pl doubles, 1825 75 fr

— DES IMPOSITIONS et de leur influence sur l'industrie agricole, etc., in-8 2 f 50 c

CLAIRAUT ELEMENS D'ALGÈBRE, 6 édit, avec des Notes et des Additions très étendues, par M Garnier, précédés d'un Traité d'Arithmétique par Thevenéau, et une Instruction sur les nouveaux poids et mesures, 2 vol in 8, 1801, 10 fr

— THÉORIE DE LA FIGURE DE LA TERRE, tirée des principes de l'Hydrostatique, in-8, deux édit, 1808 10 fr

CLOQUET (J B), ex-Professeur de Dessin à l'Ecole des Mines et à celle de la Brigade topographique au Dépôt des fortifications NOUVEAU TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE DE PERSPECTIVE à l'usage des artistes et des personnes qui s'occupent du Dessin, précédé des premières notions de la Géométrie élémentaire, de la Géométrie descriptive, de l'Optique et de la projection des ombres 1 vol in-4, et atlas de 84 pl, dont plusieurs coloriées, 1823 30 fr

CONDORCET MOYENS FACILES D'APPRENDRE A COMPTER avec facilité, deux édit, in-12 1 fr. 25 c

CORNIBERT Manuel du canonnier marin, in-8 6 fr

— TABLE DE PORTÉES DES CANONS et caronades en usage dans la marine, précédée de l'application des principes théoriques et pratiques de l'artillerie, au tir de ces bouches à feu à bord des vaisseaux de guerre, in-8, figures, 1807 6 fr.

COTTE Tables des articles contenus dans LE JOURNAL DE PHYSIQUE, in-4 6 fr

— TABLE DES MATIÈRES contenues dans les Mémoires de l'Académie, pour les années 1781 à 1790, tome X. 15 fr

COULOMB, Membre de l'Institut de France, THEORIE DES MACHINES SIMPLES, en ayant égard au frottement de leurs parties et à la raideur des cordages *Nouvelle édit*, à laquelle on a ajouté les Mémoires suivans du même auteur sur les frottemens de la pointe des pivots, — Recherches théoriques et expérimentales sur la force de torsion et sur l'élasticité des fils de métal, — Résultats de plusieurs expériences destinées à déterminer la quantité d'action que les hommes peuvent fournir par leur travail journalier, suivant les différentes manières dont ils emploient leurs forces, — Observations théoriques et expérimentales sur l'effet des moulins à vent et sur la figure de leurs ailes, — sur les murs de revêtement et l'équilibre des voûtes, etc vol in-4, avec 10 pl, 1821 15 fr

COULOMB RECHERCHES SUR LES MOYENS d'exécuter sous l'eau toutes sortes de travaux hydraulique sans employer aucun épuisement, in-8, 3e édit 1 fr 80 c

COUSIN Traité du CALCUL DIFFERENTIEL ET INTEGRAL, 2 vol. in 4, 6 pl 21 fr

— Traité élém de l'ANALYSE MATHÉMATIQUE ou d'ALGÈBRE, in-8 4 fr.

D'ABREU PRINCIPES MATHÉMATIQUES de J A Chuna, traduit du portugais, in-8 5 fr

* DARCET Mémoire sur la construction des latrines publiques, et sur l'assainissement des latrines et des fosses d'aisances in-8, figures, 1822. 1 f 50 c

* — Description d'un fourneau de cuisine avec 2 planches, 1821 2 f 50 c

* — MÉMOIRE SUR LES SOUFFROIRS, in-8, figures, 1821 1 f 50 c

DAUBUISSON MÉMOIRE SUR LES BASALTES DE LA SAXE, accompagné d'observations sur l'origine des Basaltes en général, lu à la Classe des Sciences physiques et mathématiques de l'Institut national, an 11, in-8. 2 fr 50 c

DAULNOY, Calcul des intérêts de toutes les sommes, à tous les taux et pour tous les jours de l'année, etc., in-12 1 f 80 c

DE CESSART DESCRIPTION DES TRAVAUX HYDRAULIQUES, 2 vol. in-4., 67 pl. 84 fr

DELAISTRE Science des ingénieurs, divisée en trois livres, où l'on traite des Chemins, des Ponts, des Canaux et des Aquéducs, 2 vol in-4, et Atlas, 1825 40 fr

DELAMBRE, Secrétaire perpétuel de l'Institut, membre de la Légion d'Honneur, professeur d'astronomie au collège royal de France, etc TRAITÉ COMPLET D'ASTRONOMIE THÉORIQUE ET PRATIQUE, 3 vol in 4, avec 29 pl., 1814 60 fr

— Abrégé du même Ouvrage, ou LEÇONS ÉLÉMENTAIRES D'ASTRONOMIE théorique et pratique données au collège de France, 1 v in-8, avec 17 pl., 1813

— HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE ANCIENNE, 2 vol in-4, avec 17 pl, 1817 40 fr

— HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE DU MOYEN AGE, 1 vol in-4, 1819, avec 17 pl en taille douce 25 fr

— HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE MODERNE, 2 vol in-4., avec 17 pl, 1821 50 fr

DELAMBRE. HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE DU XVIIIe. SIÈCLE, in-4. 1827 36 fr

DELAMBRE et LEGENDRE Méthode analytique pour la DÉTERMINATION D'UN ARC DU MÉRIDIEN, in-4, an 7 9 fr.

DELAMETHERIE, professeur au collège de France, ancien rédacteur du Journal de physique, etc CONSIDÉRATIONS SUR LES ÊTRES ORGANISÉS, 2 vol in 8 12 fr.

— DE LA PERFECTIBILITÉ ET DE LA DÉGÉNERESCENCE DES ÊTRES ORGANISÉS, formant le tome III des Considérations sur les êtres organisés, 1 vol in-8 6 fr

— DE LA NATURE DES ÊTRES EXISTANS, ou Principes de la philosophie naturelle, 1 vol. in-8 6 fr

— LEÇONS DE MINÉRALOGIE données au collège de France, 2 vol in-8., 1812 14 fr

DELAU DECOUVERTE DE L'UNITÉ et généralité de principe, d'idée et d'exposition

de la science des nombres, son application positive et regulière a l'algebre, a la geometrie, et surtout a la pratique, aux developpemens et a l'extension du precieux systeme decimal Calculs theori-pratiques, 1809, 1 vol in 8 3 fr

DELUC TRAITE ELEMENTAIRE DE GEOLOGIE, in-8, 1809 5 fr

— Recherches sur les modifications de l'atmosphère, 4 vol in 8 20 fr

— Precis de la philosophie de Bacon et des progrès qu'ont faits les sciences naturelles, 2 vol in 8 10 fr

DEMONFERRAND, Professeur de Mathematiques et de Physique au College de Versailles MANUEL D'ÉLECTRICITÉ DYNAMIQUE, ou Traité sur l'action mutuelle des conducteurs electriques et des aimans, et sur la nouvelle theorie du magnétisme, pour faire suite à tous les Traités de Physique elementaire, in 8, 1823, avec 5 planches 4 fr

DEPRASSE, *professeur de mathematiques a Berlin* TABLES LOGARITHMIQUES pour les nombres, les sinus et les tangentes, disposées dans un nouvel ordre, corrigées et précédées d'une Introduction, traduites de l'allemand et accompagnées de notes par *Halma*, 1814, in-18 1 fr.

DESTUTT-TRACY ELÉMENS D'IDEOLOGIE, 4 vol in-8 22 fr

Chaque volume se vend séparement, savoir :

IDEOLOGIE proprement dite. 5 fr.
GRAMMAIRE 5
LOGIQUE 6
TRAITE DE LA VOLONTÉ 6

DEVELEY, professeur de mathématiques, etc APPLICATION DE L'ALGEBRE A LA GEOMETRIE, in 4, nouvelle edit, 1824 in-4° 14 fr.

DIONIS DU-SEJOUR TRAITÉ DES MOUVEMENS APPARENS DES CORPS CÉLESTES, 2 vol in-4 40 fr

D'OBENHEIM voyez OBENHEIM

DUBOURGUET, ancien officier de marine, professeur de mathematiques au collége Louis-le-Grand, TRAITES ELEMENTAIRES DE CALCUL DIFFERENTIEL ET DE CALCUL INTEGRAL, indépendans de toutes notions de quantités infinitésimales et de limites, ouvrage mis à la portée des commençans, et où se trouvent plusieurs nouvelles théories et méthodes fort simplifiées d'integrations, avec des applications utiles aux progrès des sciences exactes, 2 v in-8 *Paris*, 1810 et 1811 16 fr

— TRAITE DE LA NAVIGATION, ouvrage approuvé par l'Institut de France, et mis a la portee DE TOUS LES NAVIGATEURS, in-4, 1808, avec fig 20 fr

DUBRUNFAUT, *Membre de la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale, etc* TRAITE COMPLET DE L'ART DE LA DISTILLATION, contenant, dans un ordre methodique, les instructions théoriques et pratiques les plus exactes et les plus nouvelles sur la preparation des liqueurs alcoholiques avec les raisins, les grains, les pommes de terre, les fécules et tous les vegetaux sucrés ou farineux, 2 vol in 8, fig, 1824 10 fr 50 c

— ART DE FABRIQUER LE SUCRE DE BETTERAVES, contenant 1° la description des meilleures methodes usitées pour la culture et la conservation de cette racine ; 2°. l'exposition detaillée des procedés et appareils utiles pour en extraire le sucré avec de grands avantages Suivi d'un essai d'analyse chimique de la betterave, propre a eclaircir la theorie des operations qui ont pour objet d'en séparer la matière sucree, 1 vol in-8, avec pl, 1825 7 fr 50 c

DUCOUEDIC LA RUCHE PYRAMIDALE methode simple et naturelle pour rendre perpetuelles les peuplades d'abeilles, et obtenir de chaque peuplade, a chaque automne, la recolte d'un panier plein de cire et de miel, sans mouches, sans couvains, outre plusieurs essaims, avec l'art de rétablir et d'utiliser, au retour de l'ete, les ruches les essaims dont les peuplades auraient peri en automne, dans l'hiver ou au printemps, en faisant eclore les œufs restés dans les alvéoles, et l'Art de convertir le miel en sucre blanc inodore, de faire l'hydromel, des sirops, etc, ouvrage utile aux habitans des campagnes, deux édit, considerablement augmentee, et orner d'une gravure, 1 vol in-8, 1813 3 fr

DUCREST VUES NOUVELLES SUR LES COURANS D'EAU, la navigation interieure et la marine, 1 vol in-8, 1803 5 fr

DUFOUR ESSAI DE GEOLOGIE in-8 1 fr

* — DUFOUR, *de Genève* GEOMETRIE PERSPECTIVE, avec ses applications a la recherche des ombres, in 8 et atlas in-4, 1827 6 fr

DUFRÉNOY, *ingenieur des mines* Voyez *page* 12

* DULEAU, ingénieur des ponts et chaussées, Essai theorique et experimental sur la RESISTANCE DU FER FORGÉ, in-4, figures. 8 fr

DUMAS (l'*abbe*) Nouvelles methodes pour resoudre les equations d'un degre superieur, in-8, 1815 2 f 50 c

DUPAIN NOUVEAU TRAITÉ DE TRIGONOMETRIE rectiligne, in-8 6 fr

— La PRATIQUE DU DESSIN dans l'architecture bourgeoise, in 8 figures. 3 fr

*DUPIN (C), *membre de l'Institut* VOYAGES DANS LA GRANDE BRETAGNE entrepris relativement aux services publics de la guerre, de la marine et des ponts et chaussées, en 1816, 1817, 1818, 1819, 1820 et 1821, présentant le tableau des institutions et des établissemens qui se rapportent à

I. la Force militaire,
II la Force navale,
III. aux Travaux civils des ports de commerce, des routes, des ponts et des canaux,

2e SECTION

IV Force productive

Chaque partie se vend separement

Ire partie, FORCE MILITAIRE, 2 vol in 4 et atlas 2e édit, 1825 25 fr

IIe partie, FORCE NAVALE, 2 vol in-4 et atlas 2e édit, 1825 25 fr

IIIe partie, FORCE COMMERCIALE, 1re SECTION, 2e édit. TRAVAUX CIVILS DES PONTS ET CHAUSSEES, 2 vol in-4, et atlas, 1824 27 fr

IVe partie FORCE COMMERCIALE EXTERIEURE, 2e SECTION, paraîtra dans le courant de 1827

* — FORCES COMMERCIALES ET PRODUCTIVES DE LA FRANCE, 2 vol in 4, avec deux grandes cartes, 1827. 25 fr

* — SITUATION PROGRESSIVE DES FORCES DE LA FRANCE depuis 1814, in-4, 1827

*— GEOMETRIE ET MECANIQUE DES ARTS ET DES BEAUX-ARTS, COURS NORMAL à l'usage des ouvriers et des arts utiles, des sous-chefs et des chefs d'ateliers et de manufactures, professe au Conservatoire royal des Arts et Metiers par l'auteur, 3 vol in-8 18 fr et 24 fr franc de port

1er *volume* GEOMETRIE, ou des Formes necessaires a l'Industrie 6 fr

2me *volume* MACHINES ELEMENTAIRES necessaires a l'Industrie 6 fr

3me *volume* FORCES MOTRICES necessaires à l'Industrie 6 fr

Chaque leçon se vend separément 40 c et 50 franco de port

* — DISCOURS ET LEÇONS SUR L'INDUSTRIE, le Commerce, la Marine, et sur les Sciences appliquées aux Arts 2 vol in 8, 1825 10 fr 50 c

— DEVELOPPEMENS DE GEOMETRIE 1 vol in 4° 1813. 15 fr

— APPLICATIONS DE GEOMETRIE ET DE MECANIQUE A LA MARINE, aux Ponts et Chaussées etc in 4, 1822 15 fr

—ESSAI HISTORIQUE sur les services et les travaux scientifiques de G. Monge, etc., in-8, 1819 4 fr 50 c

— *Le même*, in-4 avec portrait parfaitement ressemblant 7 fr 50 c

DUPIN ESSAIS SU[illegible] sur son eloquence, [illegible] des Harangues p[illegible] en regard, des co[illegible] des pensees [illegible] nien, in 8 [illegible]

— LETTRE [illegible] HIL Shakespeare [illegible]

*— SYSTEME [illegible] en 1822, t[illegible]sidere[illegible] finances, de l'indust[illegible] la navigation, d'apr[illegible] in 8, 1822

*—OBSERVATIONS sur la puissance de l'Angleterre et sur celle de la Russie au sujet du parallele etabli par M De Pradt entre ces puissances, deuxième edition, in 8, 1824, 1 fr 50 c

* — PROGRES DES SCIENCES ET DES ARTS de la marine française depuis la paix in-8, 1820 1 f 25 c

* — TABLEAU DES ARTS ET MÉTIERS et des beaux-arts, pour servir d'introduction a son *Cours de géométrie et de mecanique appliquees aux arts* professe dans les villes de France, in-8, 1826 2 fr.

* — EFFETS DE L'ENSEIGNEMENT populaire de la lecture, de l'écriture, de l'arithmétique, de la géometrie et de la mécanique appliquée aux arts, in-8, 1826 1 fr

* — Rapport fait à l'Institut de France, sur les avantages, les inconveniens et les dangers des machines à vapeur, in-8, 1825 1 f 25 c

* — Du rétablissement de l'academie de marine, in-8 1815 1 f. 50 c

* — Considerations sur les avantages de l'industrie et des machines en France et en Angleterre, in-8, 1825 1 f 25 c

* — Inauguration de l'amphitheâtre du Conservatoire des arts et metiers, in-8, 1822 1 f 50 c

* — Influence du commerce sur le savoir, sur la civilisation des peuples anciens et sur leur force navale, in-8 1822 1 f 25 c

* — Du commerce et de ses travaux publics en France et en Angleterre, in-8, 1823 1 f 50 c

* — Tableau de l'architecture navale au dix huitieme siècle, in-4 1 f 80 c

* — AVANTAGES SOCIAUX d'un enseignement public appliqué à l'industrie, in-8, 1824 1 f 25 c

* — Progrès de l'industrie française, depuis le commencement du dix-neuvième siècle, in 8, 1824 1 f 50 c

* — INTRODUCTION d'un nouveau cours de mecanique, appliquees aux arts, à l'usage des ouvriers, etc Discours prononcé le 11 novembre 1824, in 8 1 f 50 c

* — Second DISCOURS sur la géometrie et la mecanique, appliquees aux arts, prononcé le 24 decembre 1824, in 8 1 f 50 c

* — DISCOURS prononcé le 26 mars 1825 au Conservatoire des arts et metiers, pour la clôture du cours, in 8 1 f 50 c

DUPUIS MEMOIRE EXPLICATIF DU ZODIAQUE chronologique et mythologique, ouvrage contenant le tableau comparatif des maisons de la lune chez les differens peuples de l'Orient, et celui des plus anciennes observations qui s'y lient, d'après les Egyptiens, les Chinois, les Perses, les Arabes, les Chaldéens, etc, in-4, 1806 7 fr

DUTENS Analyse raisonnée des PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'ECONOMIE POLITIQUE, in 8, 1814 3 fr

DUVILLARD Recherches SUR LES RENTES ET LES EMPRUNTS, in-4 10 fr

— Analyse et tableau DE L'INFLUENCE DE LA PETITE VEROLE sur la mortalité à chaque age, et de celle d'un préservatif, tel que la vaccine peut avoir sur la population et la longevite, in-4, 1806 10 fr

---

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

*JOURNAL DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE, par MM Lagrange, Laplace, Monge, Prony, Fourcroy, Berthollet, Vauquelin, Lacroix, Hachette Poisson Sganzin Gi[illegible]

Hauy, Malus
, contient 19
129 fr
6 fr
15 fr
9 fr
fr 50 c
chnique,
ne)
ement 4 f
L'ECOLE
contenant
, (sans texte),
ui la géométrie descriptive, la charpente, a coupe des pierres, la perspective et les ombres Prix en feuilles, 24 fr

COLLECTION D'EPURES DE TOPOGRAPHIE A LUMIERE OBLIQUE (ancien système), 15 pl in folio sans texte 7 fr

COLLECTION D'EPURES DE TOPOGRAPHIE A LUMIERE DIRECTE (nouveau système), 13 planches in-folio sans texte 7 fr

— RELATIVES A LA FORTIFICATION DES PLACES ET DE CAMPAGNE, 6 planches in-folio sans texte 15 fr

---

COLE DE LA MINIATURE, ou l'Art d'apprendre à peindre sans maître, nouvelle édition revue, corrigée et augmentée 1 vol in-12, fig 1816 3 fr

E DE BEAUMONT (*Voyez Dufrenoy*)

CLIDE OEUVRES EN GREC, LATIN ET FRANÇAIS, d'après un manuscrit très-ancien, qui était resté inconnu jusqu'à nos jours, par Peyrard, traducteur des Œuvres d'Archimède, ouvrage approuvé par l'Académie des sciences, 3 vol. in-4, 1814, 1817 et 1818 90 fr

mêmes, papier vélin 120 fr

mêmes, tirées sur papier grand-raisin fin, 120 fr

mêmes, sur papier grand-raisin vélin 180 fr

ne reste plus que quelques exemplaires de trois derniers papiers

TER ELEMENS D'ALGEBRE, nouvelle édit, 1807, 2 vol in 8 12 fr

LETTRES à une Princesse d'Allemagne, sur divers sujets de PHYSIQUE ET DE PHILOSOPHIE Nouv edit, conforme à l'édition originale de Saint-Petersbourg, revue et augmentée de l'ELOGE EULER par *Condorcet*, et de diverses notes par *M Fabey*, docteur es-Sciences de l'Université, Instituteur à l'Ecole Polytechnique, etc, 2 forts vol in-8 de 1180 pag, imprimés en caractère neuf et sur papier vélin fin avec le portrait de l'auteur, 1812, broch 15 fr

ANS (OLIVER) MANUEL DE L'INGENIEUR-MECANICIEN, Constructeur de machines à vapeur, traduit de l'anglais par Cochitte, in-8, avec 7 pl, 2e edit, 1825 5 fr

EXERCICES et Manœuvres du canon à bord des vaisseaux du Roi, et Reglement sur le mode d'exercice des officiers et des equipages nouvelle edition, augmentée de Nouvelles Manœuvres des deux bords, et de nouveaux Tables de Pointage, extraites de Murucca, par un officier de marine (William), 1 vol in 8 1815 2 fr

ZIO Tables d'INTERÊTS SIMPLES et composés, suivies de celles de *Buffon* et de *Halley* sur la mortalité dans les différens âges, in-folio 18 fr,

IER, *Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées* EXAMEN DES CONDITIONS ET MODE D'ADJUDICATION DES TRAVAUX PUBLICS, suivi de Considérations sur l'emploi de ce mode et de celui de la régie, in 8, 1824 2 fr

HIER, Membre honoraire de l'Académie des Sciences de Berlin, etc PHYSIQUE MECANIQUE, traduite de l'allemand, avec Notes et un Appendice sur les anneaux colorés, la double réfraction et la polarisation de la lumière par M BIOT, membre de l'Institut, 4e edit., revue et considérablement augmentée, 1 vol in-8, avec pl, *Sous Presse*

FLEURIEU *membre de l'Institut*, VOYAGE AUTOUR DU MONDE pendant les années 1790, 1791 et 1792, par ETIENNE MARCHAND, précédé d'une introduction historique, auquel on a joint des recherches sur les terres australes de Drake, et un examen critique du voyage de Roggewen avec cartes et figures, 4 vol in-4 et atlas 60 fr

LE MÊME OUVRAGE, 5 vol in-8 et atlas in-4 30 fr

FORFAIT TRAITE ELÉMENTAIRE DE LA MATURE DES VAISSEAUX, à l'usage des élèves de la Marine, *seconde edit*, augmentée d'un grand nombre de Notes et de Tables, par M Villaumez, capitaine de vaisseau suivi d'un Appendice contenant un Mémoire sur le Système de construction des Mâts d'assemblage en usage dans les Ports de Hollande, et sur les Modifications que l'on propose d'y apporter, par M Rolland, inspecteur-adjoint du Génie maritime, 1 vol in-4, avec 25 pl, 1825 18 fr

FOURCROY TABLEAUX SYNOPTIQUES DE CHIMIE, in fol cart 9 fr

FRANCOEUR Professeur de la Faculté des Sciences de Paris, ex Examinateur des Candidats de l'Ecole Polytechnique, etc URANOGRAPHIE, ou Traité élémentaire d'Astronomie, à l'usage des personnes peu versées dans les mathématiques, des Géographes, des Marins, des Ingénieurs, accompagnée de planisphères, troisième édition, revue et considérablement augm, 1 vol in-8, 1821, avec planches 9 fr

— TRAITE ELEMENTAIRE DE MECANIQUE, 6e édition, in-8 1825 7 fr, 50 c

— ELEMENS DE STATIQUE, in 8 3 fr

— COURS COMPLET DE MATHEMATIQUES PURES, dédié à S M Alexandre Ier, Empereur de toutes les Russies, Ouvrage destiné aux Elèves des Ecoles Normale et Polytechnique, et aux Candidats qui se disposent à y être admis, 2e edit, revue et considérabl augm, 2 vol in-8, avec pl, 1819 15 fr

* — LA GONIOMETRIE, ou l'art de tracer sur le papier des angles, dont la graduation est connue, et d'évaluer le nombre de degrés d'un angle déjà tracé, accompagné d'une table des cordes de 1 à 10,000, in-8, figures 1 f 25 c

* — L'enseignement DU DESSIN LINEAIRE, d'après une méthode applicable à toutes les écoles primaires, quel que soit le mode d'instruction qu'on y suit, 2e édition, 1 vol in-8 et atlas, in-folio de 12 planches, 1827 7 fr

FRANÇAIS, professeur à Metz MÉMOIRE SUR LE MOUVEMENT DE ROTATION d'un corps solide autour de son centre de masse, in-4, 1813 2 f 50 c

FRAY, Commissaire Ordonnateur des Guerres, Membre de la Légion d'Honneur, etc. ESSAI SUR L'ORIGINE DES CORPS ORGANISES ET INORGANISES, et sur quelques phénomènes de Physiologie animale et végétale, 1 vol in 8, 1817 5 fr

* FULTON (Robert) RECHERCHES SUR LES MOYENS DE PERFECTIONNER LES CANAUX DE NAVIGATION et sur les nombreux avantages des petits canaux, in 8, avec le supplément 7 f. 50 c

GALLON Recueil de Machines approuvées par l'Académie, 7 vol. in 4, avec 946 planches 150 fr

— Le 7e volume se vend séparément 36 fr.

GARNIER *Ingénieur des Mines, ancien Elève de l'Ecole Polytechnique* TRAITÉ SUR LES PUITS ARTÉSIENS, ou sur les différentes espèces de Terrains dans lesquels on doit rechercher des eaux souterraines Ouvrage contenant la description des procédés qu'il faut employer pour ramener une partie de ces eaux à la surface du sol, à l'aide de la sonde du puisard ou du fontainier, seconde édition, revue et augmentée, avec 2 planches, in 4, 1826 16 fr

GARNIER TRAITÉ D'ARITHMÉTIQUE à l'usage des Elèves de tout âge, 2e edit in-8, 1808 2 fr 50 c

— ELÉMENS D'ALGEBRE à l'usage de Aspirans à l'Ecole Polytechnique, 3e edit in 8, revue, et augmentée, 1811 6 fr

— Suite de ces Elémens, 2e partie ANALYSE ALGEBRIQUE, nouvelle édition considérablement augmentée, in 8, 1814 7 fr

— GÉOMETRIE ANALYTIQUE, ou application de l'Algèbre à la Géométrie, seconde edition, revue et augm, 1 vol in-8 avec 14 pl., 1813 6 fr

— LES RÉCIPROQUES de la Géométrie suivi d'un Recueil de Problèmes et de Théorèmes, et de la construction des Tables trigonométriques, in 8, 2e. edition, considérablement augmentée, 1810

— ELEMENS DE GÉOMÉTRIE, contenant les deux Trigonométries, les élémens de la Polygonométrie et du levé des Plans, et l'Introduction à la Géométrie descriptive, 1 vol in-8 avec pl, 1812 5 fr

— LEÇON DE STATIQUE à l'usage des Aspirans à l'Ecole Polytechnique, 1 vol in 8 avec douze pl, 1811 5 fr

— LEÇONS DE CALCUL DIFFÉRENTIEL 3e edit, 1 vol in 8 avec 4 pl 1811 7 fr

— LEÇONS DE CALCUL INTÉGRAL 1 vol in-8 avec deux pl, 1812 7 fr

— TRISECTION DE L'ANGLE, suivie de Recherches analytiques sur le même sujet in 8, 1809 2 fr 50 c

— DISCUSSION DES RACINES des équations déterminées du premier degré à plusieurs inconnues, et élimination entre deux équations de degrés quelconques à deux inconnues, 2e édit., 1 vol in-8, 1 fr 80 c

GAUSS RECHERCHES ARITHMETIQUES, traduites par M Poulet-Delisle, Elève de l'Ecole Polytechnique et Professeur de Mathématiques à Orléans, 1 vol in-4, 1807 18 fr

* GERMAIN (Mlle Sophie) RECHERCHES SUR LA THÉORIE DES SURFACES ELASTIQUES, in-4, 1824 5 fr

* — REMARQUES sur la nature, les bornes et l'étendue de la question des surfaces élastiques, et équation générale de ces surfaces, in 4 1826 1 f 50 c

GICQUEL-DESTOUCHES, Capitaine de Vaisseau TABLES COMPARATIVES des principales Dimensions des Bâtimens de guerre français et anglais de tous rangs, de leur Mature, Gréement, Artillerie, etc, d'après les derniers réglemens, avec plusieurs autres Tables relatives à un Système de mâture proposé comme plus convenable que celui actuel, aux bâtimens de guerre français, ouvrage utile aux officiers de la Marine royale, in-4 9 fr

GILBERT, Ingénieur de Marine ESSAI SUR L'ART DE LA NAVIGATION PAR LA VAPEUR, 1 vol in-4 avec trois grandes planches, 1820 5 fr

GIRARD, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Directeur du Canal de l'Ourcq et des eaux de Paris, etc RECHERCHES EXPERIMENTALES SUR L'EAU ET LE VENT, considérés comme forces motrices applicables aux moulins et autres machines à mouvement circulaire, traduit de l'anglais de *Smeaton*, 2e édit in 4, avec pl 1827 9 fr

— DEVIS GÉNÉRAL DU CANAL DE L'OURCQ, 2e édition, in 4, avec une grande carte, 1820 6 fr

— MEMOIRE SUR LES GRANDES ROUTES, LES CHEMINS DE FER et les canaux de navigation, traduit de l'allemand de GERSTERN, par P TERQUEM, et précédé d'une introduction, par M P-S GIRARD, in-8, 1824, figures, 6 f 50 c

* — DEVIS DU CANAL SAINT-MARTIN, in-4, avec une grande carte 1820 6 fr

* — Nouvelles observations SUR LE CANAL SAINT-MARTIN et supplément au devis général, in-4, avec une grande planche colorée 1822 6 f

* GIRARD Essai sur le mouvement des eaux courantes et la figure qu'il convient de donner aux canaux qui les contiennent, in-4 6 fr
* — Memoire pour servir d'introduction au devis general des ouvrages à executer pour la distribution des eaux du canal de l'Ourcq, dans l'interieur de Paris, in-4, figures 15 fr.
* — Recherches sur les eaux publiques de Paris, les distributions successives qui en ont eté faites, et les divers projets qui ont ete proposés pour les augmenter 4 vol in-4 avec planches, 1812 15 fr
* — Description générale des différens ouvrages à executer pour la distribution des eaux du canal de l'Ourcq dans l'interieur de Paris, et devis detaillé de ces ouvrages, in 4., 1812 figures 12 fr
* — MEMOIRE SUR LE CANAL DE SOISSONS destiné à joindre le canal de l'Ourcq aux canaux des Ardennes et de Saint Quentin, in-4 avec une grande planche 5 fr
— DEVIS DES PONTS à bascule à construire sur le canal de l'Ourcq, in-4, fig, 1808 6 fr
* GINOT DES ROIS (Mademoiselle) PLANISPHERE MOBILE, 3e édition, tableau collé sur carton 3 f 50 c
* — PLANETAIRES HELIOCENTRIQUE et geocentrique, 2e edition, deux cartes collées sur carton ensemble 7 fr
* — CALENDRIER ASTRONOMIQUE PERPETUEL, indiquant le quantième des mois, les jours de la semaine, les phases de la lune, les eclipses, etc Tableau collé sur carton 5 fr
GIROD-CHANTRANS ESSAI SUR LA GEOGRAPHIE PHYSIQUE, le climat et l'histoire naturelle du département du Doubs 2 vol in-8 10 fr
GOUDIN (Œuvres de M B) contenant un Traite sur les PROPRIETES COMMUNES A TOUTES LES COURBES, un Memoire sur les ECLIPSES DE SOLEIL, nouv édit, in-4 7 fr 50 c
GRAFF Galerie des combinateurs à la loterie, in 8 6 fr
*GREMILLET NOUVELLE THEORIE DU CALCUL DES INTERÊTS simples et composés, des annuités, des rentes et des placemens viagers, etc, 1 vol. grand in-8, 1823 7 f. 50 c
* — RECUEIL DE PROBLÈMES amusans et instructifs, avec les demonstrations raisonnées, et l'application des règles de l'arithmetique à leurs solutions, etc, 2 vol in-8 11 fr
Chaque volume se vend separement, savoir
Tome 1er. Questions, in 8 5 fr
Tome 2e Solutions, in 8 6 fr
* GUEPRATTE Instruction sur le PLANISPHERE CELESTE, à l'usage de la marine, et determination des eclipses de lune, de soleil et des occultations d'étoiles, in 8, 1826, avec une très-grande carte. 12 fr
HACHETTE, ex Professeur à l'Ecole Polytechnique PROGRAMMES D'UN COURS DE PHYSIQUE, ou Precis des leçons sur les principaux phenomènes de la nature, et sur quelques applications des Mathématiques à la Physique, in-8 1809 5 fr. 50 c
— TRAITE ELEMENTAIRE DES MACHINES, nouvelle édit augmentée, 1 vol in-4., avec 32 planches, 1819 25 fr
HAGEAU, inspecteur divisionnaire au corps des ponts et chaussees DESCRIPTION du canal de jonction de la Meuse au Rhin, etc, 1819, 1 vol in-4, grand papier, et atlas composé de 21 pl sur demi feuille grand-aigle 70 fr
HASSENFRATZ La SYDEROTECHNIE, ou l'art de traiter le minerai de fer pour en obtenir la fonte du fer ou de l'acier, etc 4 vol in-4 avec 66 planches, 1811 80 fr
— COURS DE PHYSIQUE CELESTE, ou lecons sur l'exposition du système du monde, in-8, figures 7 f 50 c
— Traite elementaire et pratique de l'art de calciner la pierre calcaire, etc, in-4 figures, 1825 18 fr
HATCHETT EXPERIENCES NOUVELLES et Observations sur les differens ALLIAGES DE L'OR, leur pesanteur specifique, etc, traduites de l'anglais par Leiat, contrôleur du monnayage à Paris, avec des Notes, par Guyton Morveau, in-4 9 fr
HAUY Membre de l'Académie Royale des Sciences, Professeur de mineralogie au Jardin du Roi, etc, etc TRAITE DES CARACTERES PHYSIQUES DES PIERRES PRECIEUSES, pour servir à leur determination lorsqu'elles ont ete taillees, 1 vol in 8, 1817, avec 3 pl en taille-douce 6 fr
— TABLEAU COMPARATIF DES RESULTATS DE LA CRISTALLOGRAPHIE et de l'analyse chimique, relativement a la classification des Mineraux, vol in-8 5 fr 50 c
— TRAITÉ DE MINERALOGIE, précédé d'un TRAITE DE CRISTALLOGRAPHIE, 2e edition revue, corrigee et considerablement augmentee, 6 vol in-8 et deux atlas, ensemble 204 pl en taille-douce, 1822 et 1823 90 fr
Ces deux ouvrages se vendent separement, savoir
Traite de Mineralogie, 4 vol in-8 et atlas de 120 planches in-4 60 fr
Traite de Cristallographie, 2 vol in-8 et atlas de 84 planches in-4 30 fr
HAUY TRAITE ELEMENTAIRE DE PHYSIQUE, troisième édition, considerablement augmentée, adopte par le Conseil royal de l'Instruction publique, pour l'enseignement dans les colléges, 2 vol in 8 avec 19 pl, 1821 15 fr
HERBIN DE HALLE DES BOIS propres AU SERVICE DES ARSENAUX de la marine et de la guerre, etc, accompagne de 40 planches enluminees, représentant les arbres qui fournissent les diverses pieces de constructions, in-8, 1823 9 fr
HISTOIRE ET MEMOIRES DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS, 167 vol in-4, vol 1500 fr
Chaque volume, depuis 1666 jusqu'a 1790 (le dernier de cette collection), se vend separément, 20 fr
Table des matières contenues dans les Mémoires de l'Académie, 10 vol, chaque vol. 15 fr
— Savans étrangers, 11 vol, chaque vol 20 fr
— Prix, tomes 7, 8 et 9, ensemble 60 fr
— Machines, 7 vol 150 fr
— Le tome 7e, séparement. 36 fr
HOMASSEL, Élève gagnant maîtrise, et ex Chef des teintures de la Manufacture des Gobelins COURS THEORIQUE ET PRATIQUE SUR L'ART DE LA TEINTURE en laine, soie, fil, coton, fabrique d'Indienne en grand et petit teint, suivi de l'Art du Teinturier-Degraisseur et du Blanchisseur, avec les expériences faites sur les végétaux colorans, 3e edit, 1818, 1 vol in-8 5 fr
*HUERNE DE POMMEUSE DES CANAUX NAVIGABLES, considérés d'une maniere générale, avec des recherches comparatives sur la navigation interieure de la France et celle de l'Angleterre, 1 vol in-4 et atlas 25 fr
HUTTON NOUVELLES EXPÉRIENCES D'ARTILLERIE faites pendant les années 1787, 88, 89 et 91, où l'on determine la force de la poudre, la vitesse initiale des boulets de canon, les portees des pièces à différentes élevations, la résistance que l'air oppose au mouvement des projectiles, les effets des differentes longueurs, des différentes charges de poudre, etc, etc, trad de l'anglais, par O Terquem, prof de mathematiques aux ecoles royales, et bibliothecaire au dépôt central de l'artillerie, etc, 1826, in-4 avec planch 10 fr
— La 1re partie traduite sur Villantroy, in-4, 1802 7 fr 50 c
*INSTRUCTION SUR LA MANIERE DE SE SERVIR DE LA REGLE A CALCUL, instrument à l'aide duquel on peut obtenir a vues sans plume, crayon, ni papier, le resultat de toutes espèces de calcul, avec 21 figures, representant l'instrument dans les principales operations 2e edition, corrigee et augmente, in 12, 1825 2 fr.
*INSTRUCTION DU CONSEIL DE SALUBRITE, SUR LA CONSTRUCTION DES LATRINES PUBLIQUES et sur l'assainissement des Fosses d'aisances, precede du Rapport fait au Monsieur le Dauphin, par un membre de la Societe *Il primo ar ordre du Conseil gen sur la voirie royale des Prisons*, 1 f, 1825, avec de très grandes planches 5 fr
*JANVIER, *horloger ordinaire du Roi* MANUEL CHRONOMETRIQUE, ou Precis de ce qui concerne le Temps, ses divisions, ses mesures, leurs usages, etc, vol in-12, avec 5 planches, 1821 4 fr
JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE, D'HISTOIRE NATURELLE ET DES ARTS, 96 vol in-4, avec beaucoup de planches 1500 fr
Chaque volume se vend separement 18 fr
— et chaque numero 4 fr.
JUVIGNY MOYEN DE SUPPLEER PAR L'ARITHMETIQUE A L'EMPLOI DE L'ALGEBRE dans les questions d'intérêts composes, d'annuites, d'amortissemens, etc, termine par une application speciale du meme procede a l'extinction de la dette publique, in-8, 1825 2 fr
* — APPLICATION DE L'ARITHMETIQUE AU COMMERCE et à la banque, d'apres les principes de Bezout, ouvrage elementaire, theorique et pratique, 3e edit, deux parties en 1 vol in 8, 1827 7 fr
* JOUANNO, *professeur de mathematiques au collège de Pontoy* ARITHMETIQUE ELEMENTAIRE, theorique et pratique, in-8, 1826. 3 f 50 c
* JOURNAL DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE *Voyez* ÉCOLE POLYTECHNIQUE
LABEY, ex-professeur à l'Ecole Polytechnique TRAITE DE STATIQUE, vol in 8 3 fr 50 c
LA CAILLE LEÇONS ELÉMENTAIRES DE MATHEMATIQUES, augmentees par *Maru*, avec des Notes par M. Labey, Professeur de Mathématiques et Examinateur des Candidats pour l'Ecole Polytechnique, Ouvrage adopte par l'Université, pour l'enseignement dans les Lycees, etc, in 8, fig, 1811 6 fr 50 c
— LEÇONS D'OPTIQUE, augmentées d'un TRAITE DE PERSPECTIVE, nouvelle édition, in-8, 1808 5 fr
LACOUDRAYE THÉORIE DES VENTS ET DES ONDES, in-8 4 fr
LACROIX, Membre de l'Institut et de la Légion-d'Honneur etc TRAITÉ DU CALCUL DIFFERENTIEL ET DU CALCUL INTEGRAL, 2e edition, revue, corrigee et considerablement augmentée, 3 vol in 4, avec 18 pl 66 fr
Le troisième volume se vend separement, 26 fr
L'Auteur a fait des changemens et augmentations considerables a cette nouvelle edition, qu'il a revue avec le plus grand soin
— COURS DE MATHEMATIQUES à l'usage de l'Ecole centrale des Quatre Nations, Ouvrage adopte par le Gouvernement pour les Lycees, Ecoles secondaires, Colléges, etc, 9 vol in 8 38 fr 50 c
Chaque volume du Cours de M LACROIX *se vend separement, savoir*
— Traite élémentaire d'Arithmetique, 17e edition, 1826 2 fr
— Elemens d'Algebre, 14e edit, 1825, 4 fr.
— Elemens de Geometrie, 13e edit, 1825, 4 fr
— Traite elémentaire de Trigonometrie rectiligne et sphérique, et l'Application de l'Algebre à la Geometrie 7e edit, 1822 4 fr
— Complement des Elémens d'Algèbre, 5e édition, 1825 4 fr
— Complement des Elemens de Géometrie, ou Elemens de Géométrie descriptive, 5e edition, 1822 3 fr
— Traite elementaire de Calcul differentiel et de Calcul integral, 3e édition, 1820 7 fr 50 c

eignement en genatiques en par- et et d'enseignet in-8, seconde 1816 5 fr

E DU CALCUL 8, 2e edition, 5 fr

Officier de la de l'Institut et de France, etc IL DES FONC- vue, corrigee et augmentee, in-8 6 fr 50 c

Elles contiennent des formules et des metho des nouvelles

—DE LA RESOLUTION DES ÉQUATIONS NUMERIQUES de tous les degres, avec des Notes sur plusieurs points de la Theorie des equations algebriques, in-4, 3e edition, revue et corrigee Ouvrage adopte par l'Universite pour l'enseignement dans les Lycées, etc, 1826 15 fr

Cette 3e. edition est precedee d'une analyse de cet ouvrage, par M l'ornsor de l'*Institut*.

— THEORIE DES FONCTIONS ANALYTIQUES, nouvelle edition, revue, corrigée et augmentee par l'Auteur, in-4, 1813 15 fr

— MÉCANIQUE ANALYTIQUE, nouvelle édition, revue et augmentée par l'Auteur, 2 vol in 4, 1811 et 1815 36 fr

(*L'Auteur a fait des augmentations considérables à cette nouvelle édition.*)

— Le tome second se vend separément, pour ceux qui ne l'ont pas retire. 18 fr

Lagrange a publié un grand nombre de Memoires *dans la collection des Memoires de l'Academie des Sciences*, quelques-uns se vendent separément

LAGRIVE MANUEL DE TRIGONOMETRIE PRATIQUE, revu par les Professeurs du Cadastre, MM Reynaud, Harros, Plauzol et Boson, et augmenté des Tables des Logarithmes a l'usage des Ingenieurs du Cadastre, 1 vol in-8 7 fr

LALANDE Membre de l'Institut, Directeur de l'Observatoire, TABLES DES LOGARITHMES pour les nombres et les sinus, etc, revues par Reynaud, Examinateur des Candidats de l'École Polytechnique, PRECEDÉES DE LA TRIGONOMETRIE RECTILIGNE ET SPHERIQUE, par le même, 1 vol. in-18, avec planches, 1818 3 fr

Les Tables de Logarithmes de LALANDE seules, sans la Trigonometrie de M Reynaud, se vendent separément 2 fr

—HISTOIRE CELESTE FRANÇAISE, in 4 15 fr

— BIBLIOGRAPHIE ASTRONOMIQUE, in-4 30 fr

Et les autres ouvrages du même auteur

LAME, Élève Ingénieur au Corps royal des Mines. Examen des differentes methodes employees pour résoudre les PROBLEMES DE GEOMETRIE, in 8, avec pl, 1818 2 fr 50 c

LANDALIN INTRODUCTION A L'ANALYSE DES SCIENCES, ou de la Generation des Systemes et des instrumens de nos connaissances, 3 vol in-8, 1803, 15 fr

LANZ et BETANCOURT ESSAI SUR LA COMPOSITION DES MACHINES, 2e édition, revue, corrigee et considerablement augmentée, vol. in-4. avec 13 gr. pl., 1819 15 fr

LAPEYROUSE (DE) TRAITÉ SUR LES MINES ET LES FORGES du comté de Foix, in 8, avec 6 grandes planches. 6 fr

LAPIE Atlas classique et universel de géographie ancienne et moderne, in-folio, 39 cartes, demi-reliure 36 fr

LAPLACE (M le marq de), Pair de France, Grand-Officier de la Legion-d'Honneur, Membre de l'Institut, du Bureau des Longitudes de France, des Societes royales de Londres, de Gottingue, etc

— EXPOSITION DU SYSTEME DU MONDE, 5e edition, revue et augmentee par l'Auteur, in-4, 1824, avec portrait, 15 fr

— Le meme ouvrage, 2 vol in-8, sans port., 1824

— THEORIE analytique DES PROBABILITÉS, 1 vol. in 4, troisième edition, 1820, avec le 4e. supplement 27 fr 50 c

— Quatrième Supplement à la Theorie des Probabilites, 1825, séparément 2 fr 50 c

— ESSAI philosophique SUR LES PROBABILITES, 5e edition, revue et augmentee, in 8, 1825 4 fr

— PRÉCIS DE L'HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE, 1 vol in-8, 1821, 3 fr

— TRAITÉ DE MECANIQUE CÉLESTE, 5 vol in 4

Les 3e, 4e et 5e volumes se vendent ensemble 62 fr

Les 4e et 5e volumes 47 fr

Le 5e imprime en 1825 26 fr

— Le même, 5 vol in-4, grand papier velin 184 fr

LAROUVRAYE (DE) L'ART DES COMBATS SUR MER, dedie au Duc d'Angoulême, in 4 avec pl. 6 fr

LASALLE TRAITÉ ÉLÉMENTAIRE D'HYDROGRAPHIE appliquée a toutes les parties du pilotage, etc 1 vol. in-8., avec pl, 1817. 6 fr

* LEBLANC, *dessinateur et graveur du Conservatoire des arts et metiers* RECUEIL DE MACHINES, instrumens et appareils, qui servent à l'economie rurale, tels que charrues, semoirs, herses, moulins, presse hydraulique et à vis, etc Il en paraît 8 livraisons, grand-raisin in-folio Prix de chaque livraison 6 fr

LEFEBURE DE FOURCY (L), *examinateur de aspirans à l'école polytechnique*, etc LEÇONS DE GÉOMÉTRIE ANALYTIQUE, données au collége royal de Saint-Louis, dans lesquelles on traite des problèmes determines, de la ligne droite et des lignes du second ordre, in 8, fig, 1827 5 f 50 c

LEFEVRE, Géomètre en chef du Cadastre NOUVEAU TRAITE DE L'ARPENTAGE, a l'usage des personnes qui se destinent a l'etat d'arpenteur, au leve des plans et aux opérations du nivellement, *quatrieme edition* entièrement refondue et augmentée d'un Traité de Géodésie pratique, ouvrage contenant tout ce qui est relatif à l'arpentage, l'amenagement des bois et la division des proprietés, ce qu'il faut connaître pour les grandes operations geodesiques et le nivellement, 2 vol in 8 avec 29 pl nouvellement gravees, dont une color pour les teintes conventionelles, 1826 16 fr,

— MANUEL DU TRIGONOMETRE, servant de Guide aux jeunes Ingenieurs qui se designent aux operations geodésiques, suivi de diverses solutions de Geometrie pratique, de quelques Notes et de plusieurs Tableaux, 1 vol in-8, avec planches, 1819 5 fr

* — ESSAI SUR L'ARPENTAGE PARCELLAIRE, ou recueil et developpement des instructions et règlemens sur la partie d'art du cadastre, à l'usage des employes charges du leve des plans parcellaires des communes et de leurs calculs, in-8, fig et tabl 6 fr

Voyez le Supplement, page 12

LEFRANÇOIS ESSAIS DE GEOMÉTRIE ANALYTIQUE, 2e edition, revue et augmentée, 1 vol in 8, 1824 2 fr 50 c

LEGENDRE, Membre de l'Institut et de la Legion-d'Honneur, Conseiller titulaire de l'Université ESSAIS SUR LA THÉORIE DES NOMBRES, 2e édition, revue et considerablement augm, in-4, 1808, avec deux Supplémens, imprimes en 1816 et en 1825 24 fr

Le Supplement imprimé en 1816 se vend separement 3 fr

Celui imprime en 1825 3 fr

— Nouvelle Methode pour la DÉTERMINATION DES ORBITES DES COMETES, avec deux Supplemens contenant divers perfectionnemens de ces Methodes et leur application aux deux Comètes de 1806, 1807, 1806, in-4 10 fr

Le deuxième Supplement, 1820, se vend separement 4 fr

— EXERCICES DU CALCUL INTÉGRAL sur divers ordres de transcendantes et sur les quadratures, 3 vol in-4 avec les supplemens, 1811 à 1819 72 fr.

LEGENDRE et DELAMBRE Methode analytique pour la determination d'un arc du meridien, in-4 9 fr

LENORMAND, professeur de technologie, etc NOUVEAU MANUEL DE L'ART DU DEGRAISSEUR, etc, ou Instruction sur les moyens d'enlever soi-meme toutes sortes de taches, 3e. *edit*, revue, corrigee et augmentee d'un *Appendice* sur la maniere de blanchir le papier et d'enlever les taches d'encre, de graisse, de cire ou d'huile sur les livres et estampes, etc, 1 vol in-12, avec une planche, 1826 3 fr

— L'ART DU DISTILLATEUR des eaux-de-vie et des esprits, 2 vol in-8, fig, 1817 18 fr

* — Manuel de l'art du fabricant de verdet, in-8 3 fr

* LENORMAND et DEMOLEON DESCRIPTION DES EXPOSITIONS DES PRODUITS DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE faites à Paris, depuis leur origine, jusques à celle de 1819 inclusivement, renfermant les noms et les adresses de tous les exposans, tant nationaux qu'etrangers, avec 84 planches, 4 vol in 8, 1824 36 fr

LEONARD DE VINCY ESSAI SUR SES OUVRAGES PHYSICO-MATHEMATIQUES, avec des fragmens tires de ses manuscrits apportés de l'Italie, par J. B Venturi, professeur de physique à Modène, in-4 2 f 50 c.

LEPAUTE, Horloger du Roi TRAITÉ D'HORLOGERIE, contenant tout ce qui est necessaire pour bien connaître et pour regler les pendules et les montres, la description des pieces d'horlogerie les plus utiles, etc, vol in-4, avec 17 pl. 24 fr

* LHERMIER CONSIDERATIONS SUR L'ETABLISSEMENT D'UNE USINE HYDRAULIQUE quelconque, precedes des considérations sur les moyens de faire produire à l'eau un effet maximum, dans les coursiers, par son choc sur les aubes, des roues hydrauliques, et calcul de la depense d'eau d'une vanne, et suivies d'un memoire sur les moulins a pilons, in-8, figures, 1826 2 f 50 c.

LEPAGE, *ancien avocat* LOIS DES BATIMENS, ou le NOUVEAU Desgodets, traitant suivant les Codes civil et de procedure, des servitudes en général, des réparations, par vice de construction, accidens et vetusté, etc, 2 vol in-8., 1826 9 fr

LHUILLIER, *membre de la Societe d'Encouragement de Rouen* QUELQUES IDEES NOUVELLES SUR L'ART D'EMPLOYER L'EAU comme moteur des roues hydrauliques, in-8e, 1823, fig 2 fr 50 c

L'HUILLIER ET PETIT DICTIONNAIRE DES TERMES DE MARINE ESPAGNOLS ET FRANÇAIS, in 8 8 fr

LIBES, Professeur de Physique au Lycee Charlemagne à Paris, etc HISTOIRE PHILOSOPHIQUE DES PROGRES DE LA PHYSIQUE, 4 vol in 8., 1811 et 1814. 20 fr

Le quatrième volume se vend separement. 5 fr

—TRAITÉ COMPLET ET ÉLÉMENTAIRE DE PHYSIQUE, présenté dans un ordre nouveau, d'après les découvertes modernes, deuxième édition, revue, corrigee et considérablement augmentee, 3 vol in-8, avec fig, 1813 18 fr

— LE MONDE PHYSIQUE et le MONDE MORAL, ou lettres a Mme. de ****, 2e édition considerablement augmentee, 2 vol. in-8, 1822, figures 15 fr

— NOUVEAU DICTIONNAIRE DE PHY-

SIQUE, redigé d'après les découvertes les plus modernes, 3 vol in 8 et atlas 24 fr

MAGRE IF PILOTE AMERICAIN, contenant la description des côtes orientales de l'Amerique du nord, depuis le fleuve Saint Laurent jusqu'au Mississipi, et trad de l'anglais, et publié par ordre du ministre de la marine, 1826, in-8 5 fr

* MAIRET, relieur et imprimeur lithographe NOTICE SUR LA LITHOGRAPHIE, 2e édition, suivie d'un essai sur la reliure et le blanchiment des livres et gravures, in 8 1824, figures 5 fr

* MALUS, Lieutenant Colonel au Corps du Genie, Membre de l'Institut d'Egypte THEORIE DE LA DOUBLE REFRACTION DE LA LUMIERE dans les substances cristallisées, in 4, avec pl 12 fr

MANSON Traité du feu et de l'air, in-4, 1804, 15 planches 18 fr

MARCILL DE SERRES ESSAI SUR LES ARTS et les Manufactures d'Autriche, 1814, 3 vol in 8, avec 34 planch, 21 fr

MARIE, *Professeur de Mathematiques et de Topographie* PRINCIPES DU DESSIN ET DU LAVIS DE LA CARTE TOPOGRAPHIQUE, presentés d'une manière elementaire et methodique, avec tous les developpemens necessaires aux personnes qui n'ont pas l'habitude du Dessin, accompagnés de 9 modèles, dont huit sont coloriés avec soin, 1 vol in-4, oblong, 1825, 15 fr.

MASCHERONI PROBLÈMES DE GÉOMETRIE, résolus de différentes manières, traduit de l'italien, 1 vol in-8, 1803 3 fr

MAUDUIT, Professeur de Mathematiques au Collége de France à Paris LEÇONS ÉLEMENTAIRES D'ARITHMÉTIQUE, ou Principes d'Analyse numerique, in 8, nouv édition 1803 5 fr

— LEÇONS DE GÉOMÉTRIE THEORIQUE ET PRATIQUE, nouvelle édition, revue, corrigée et augmentée, 2 vol in 8 1817 avec 17 pl 10 fr

— INTRODUCTION AUX SECTIONS CONIQUES, pour servir de suite aux élémens de geométrie de M Rivard, in-8 3 fr

MAZÉAS Abrégé des elémens d'arithmétique, d'algèbre et de géométrie, etc, in-12 3 fr

MAYNIEL, Chef de bataillon au corps du Genie, sous-directeur des fortifications TRAITE EXPERIMENTAL, ANALYTIQUE ET PRATIQUE DE LA POUSSEE DES TERRES ET DES MURS DE REVETEMENT, contenant 1° l'Exposition et la Discussion des expériences anciennes et nouvelles sur la poussée des terres, 2° l'Exposition et la Discussion des diverses theories sur la poussée des terres, 3° la Comparaison des nouvelles experiences sur la theorie de Coulomb, generalisée, et application de cette theorie, 4° Traité pratique sur la poussée des terres et des murs de revêtement, suivi d'un Appendice sur le frottement des vannes dans leurs coulisses, 1808, 1 vol in 4 12 fr

MAZURE - DUHAMEL, *Conservateur de l'Observatoire de la Marine et Professeur à l'Ecole de Navigation à Toulon* MEMOIRE SUR L'ASTRONOMIE NAUTIQUE, in-4, avec 2 pl et tableaux 7 fr 50 c

MEMOIRES SUR LA TRIGONOMÉTRIE spherique, par un Officier de l'Etat-Major, etc, in 8, 1 fr. 50 c

MÉMOIRES DE L'INSTITUT,

Sciences physiques et mathematiques

Tomes I, 18 fr, II, 24, III, 18, IV, 18, V, 20, VI, 20, VII ou 1806, 24, VIII ou 807, 20, IX ou 1808, 20, X ou 1809, 20, XI ou 1810, 2 vol, 22; * XII ou 1811, 2 vol, 25, * XIII ou 1812, 2 vol, 22, * XIV ou 1813, 1814, 1815, 1 vol, 18, * Academie des Sciences, 1816, tomes I, 18, * 1817, II, 20, * 1818, III, 25, * IV ou 1819 et 1820, 30 V ou 1821 et 1822, 1823, 20.

Savans etrangers.

Tomes I, 36 fr, II, 18

— Ier, Nouvelle serie, 1827 20 fr

Base du système metrique

Tomes I, II, III, 100 fr, IV, par Biot et Arago, 21

Science morale et politique

Tomes I, 18 fr, II, 18, III, 18, IV, 18, V, 18

Litterature et Beaux-Arts

Tomes I, 20 fr, II, 20, III, 20, IV, 20, V, 20

Litterature ancienne

Tomes * I et II, 42 fr, * III et IV, 42, * V et VI, 48

Prix total de la collection, telle qu'elle est indiquée ci-dessus 896 fr

* MEMOIRE sur un nouveau systeme de guerre et de construction maritime et sur un nouveau moyen de navigation sans voiles, par J M D L F, in 8, 1825 2 f 50 c

* — Sur les moyens d'exploiter, par le Senegal, les mines d'or de Bamboue, et de fonder un grand commerce avec l'Afrique interieure, par J-M D L F, in-8, 1826 1 f 50 c

MOLLET, ex Doyen de la Faculte des Sciences de Lyon, etc GNOMONIQUE GRAPHIQUE, ou Methode simple et facile pour tracer les Cadrans solaires sur toutes sortes de plans et sur les surfaces de la sphère, et du cylindre-droit, sans aucun calcul, et en ne faisant usage que de la règle et du compas, *troisième édit*, suivie de la Gnomonique analytique, etc, 1 vol, in-8, 1827, avec 8 planches 3 fr

MONGE (G), ancien Sénateur, Membre de l'Institut GEOMETRIE DESCRIPTIVE, 5e édit, augmentée d'une Theorie des Ombres et de la perspective, extraite des papiers de l'Auteur, par M BRISSON, ancien Elève de l'Ecole Polytechnique, Ingenieur en Chef des Ponts et Chaussées, 1 vol in 4, avec 28 pl, 1827 12 fr

MONGE TRAITE ELÉMENTAIRE DE STATIQUE, à l'usage des Ecoles de la Marine, in-8, 6e édition, revue par M Hachette, ex-Instituteur de l'Ecole Polytechnique Ouvrage adopté par l'Université pour l'enseignement dans les Lycées, 1826 3 fr. 50 c

MONTEIRO-DA-ROCHA, Commandeur de l'Ordre du Christ, Directeur de l'Observatoire de l'Université de Coimbre, etc MEMOIRES SUR L'ASTRONOMIE PRATIQUE, traduits du portugais par M de Mello, in 4, 1808 7 fr 50 c.

MONTGERY (DE), Capitaine de frégate REGLES DE POINTAGE à bord des vaisseaux, ou Remarques sur ce qui est prescrit à cet egard, dans les exercices de 1808 à 1811, suivies de Notes sur diverses branches d'artillerie en general, et en particulier de l'artillerie de la Marine, 1 vol in 8 5 fr

— MÉMOIRE SUR LES PETARDS FLOTTANS et sur les mines flottantes, ou machines infernales maritimes, br in 8, 1819 2 fr

* — TRAITE DES FUSEES DE GUERRE, nommées autrefois Rochettes, et maintenant fusées à la Congrève, in-8, 1825, figures 6 fr

MONTUCLA HISTOIRE DES MATHEMATIQUES, dans laquelle on rend compte de leurs progrès depuis leur origine jusqu'à nos jours, où l'on expose le Tableau et le developpement des principales découvertes dans toutes les parties des Mathématiques, les contestations qui se sont élevées entre les Mathématiciens, et les principaux traits de la vie des plus célèbres *Nouvelle édition*, considérablement augmentée, et prolongée jusque vers l'epoque actuelle, achevée et publiée par Jérôme de Lalande, 4 vol in 4, avec figures 60 fr

Il reste encore quelques exemplaires des tom III et IV, qui se vendent séparément des deux premiers vol. 40 fr

Cet ouvrage est ce qui existe de plus complet jusqu'à présent en cette partie.

* MOREL (ALEX) PRINCIPE ACOUSTIQUE nouveau et universel de la Theorie musical ou la Musique expliquée, 1 vol avec pl 1816 7

* MORISOT Prix aux détailles des prix de tous les ouvrages de bâtiment, 7 vol in-4 58 f

Les 4 premiers volumes se vendent séparément, savoir

Le 1er 11 fr 50 c

Les 2e, 3e et 4e chacun 8 50

Et les 5e, 6e et 7e ensemble 21

MOULTESON ARITHMETIQUE DES CAMPAGNES, al'usage des écoles primaires, ouvrage adopté par le conseil royal de l'instruction publique, in-12, cartonné 1 fr

NEWTON ARITHMÉTIQUE UNIVERSELLE, traduite en français par M Bauldeux, avec des notes explicatives, 2 vol in-4, 14 planches 40 fr

NICHOLSON DESCRIPTION DES MACHINES A VAPEUR, et détail des principaux changemens qu'elles ont éprouvés depuis l'époque de leur invention, et des améliorations qui les ont fait parvenir à leur état actuel de perfection, ouvrage traduit de l'anglais, 1 vol in-8 avec 8 pl, 1826 5 fr

NOEL, ALGEBRE ÉLÉMENTAIRE raisonnée et appliquée, 2e édit, 1 vol in-8, 1827 6 fr

NORIE RECUEIL COMPLET DE TABLES UTILES A LA NAVIGATION (*Voyez* VIOLAINE) 6 fr

NOUVELLE THEORIE DES PARALLELES avec un appendice contenant la manière de perfectionner la theorie des parallèles de A M Legendre, in 8 2 fr

OBEINHEIM (d'), ancien sous-directeur des fortifications, etc BALISTIQUE, indication de quelques expériences propres à compléter la theorie du mouvement des Projectiles de l'Artillerie, etc Strasbourg, 1814, in 8, avec 3 pl 6 fr

PAIXHANS, Eleve de l'Ecole Polytechnique Chef de bataillon au Corps royal d'Artillerie, etc NOUVELLE FORCE MARITIME et application de cette force à quelques parties du service de l'armée de terre ou Essai sur l'état actuel des moyens de la force maritime, sur une espèce nouvelle d'artillerie de mer qui détruirait promptement les vaisseaux de haut bord, sur la construction de navires à voiles et à vapeur, de grandeur modérée, qui, armés de cette artillerie, donneraient une marine moins couteuse et plus puissante que celle existante, et sur la force que le systeme des bouches à feu propose offrirait à terre pour les batteries de siége, de place, de côtes et de campagne; in-4 avec 7 planches, 1822 18 fr

— EXPERIENCES FAITES PAR LA MARINE FRANÇAISE, sur une arme nouvelle, changemens qui paraissent devoir en résulter dans le système naval, et examen de quelques questions relatives à la Marine, à l'Artillerie, à l'attaque et à la défense des Cotes et des Places, in-8 1825 3 fr

PARISOT TRAITÉ DU CALCUL CONJECTURAL, ou l'Art de raisonner sur les choses futures et inconnues, in-4, 1810 15 fr

PAUCTON TRAITE DE METROLOGIE, ou Traité des Mesures, Poids et Monnaies des anciens et des modernes, in-4 18 fr

PECLET, *professeur au college de Marseille chargé des cours publics de physique et de chimie appliquées aux arts*, etc COURS DE CHIMIE, 1 fort volume in-4 avec 9 planches 36 fr

— COURS DE PHYSIQUE, 1 fort vol in-4 avec 24 planches 36 fr

PERSON RECUEIL DE MECANIQUE ET DESCRIPTION DE MACHINES RELATIVES A L'AGRICULTURE ET AUX ARTS, in 4, avec 18 pl, 1802 10 fr

PERTUSIER, officier d'artillerie de la garde royale LA FORTIFICATION ordonnée d'après les principes de la Statique et de la Balistique modernes, etc 1822, in 8 avec atlas 25 fr

Cet ouvrage n'a été tiré qu'à 400 exemp, 123 seulement ont été livrés au commerce.

— La Moldavie et la Valachie, et de l'influence politique des Grecs du Fanal, in-8., 1822 3 fr

POINSOT, Membre de l'Institut et de la Légion-d'Honneur, Inspecteur-général de l'Université, Examinateur, et Commissaire à l'Ecole Polytechnique, à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, etc TRAITÉ ELEMENTAIRE DE STATIQUE, adopté pour l'Instruction publique, in-8, 4e edit, 1821, avec pl 5 fr

— MEMOIRE SUR L'APPLICATION DE L'ALGEBRE A LA THEORIE DES NOMBRES, in-4, 1819 3 fr

— RECHERCHES SUR L'ANALYSE DES SECTIONS ANGULAIRES, in-4, 1825 5 fr

POISSON, Membre de l'Institut, Professeur à l'Ecole Polytechnique, etc TRAITE DE MECANIQUE, 2 vol in 8, avec 8 pl, 1811 12 fr

* POMMIÉS MANUEL DE L'INGENIEUR DU CADASTRE, contenant les connaissances théoriques et pratiques utiles aux Géomètres en chef et à leurs collaborateurs, pour exécuter le levé général du plan des communes de France, conformément aux instructions du Ministre des Finances sur le cadastre de France, précédé d'un Traité de Trigonométrie rectiligne par A.-A. Reynaud, vol in-4, 1808 12 fr

PONCELET, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, capitaine au corps royal du Génie TRAITÉ DES PROPRIÉTÉS PROJECTILES DES FIGURES, ouvrage utile à ceux qui s'occupent des applications de la Géométrie descriptive, et d'opérations géométriques sur le terrain, in-4., 1822 16 fr

* — MEMOIRE SUR LES ROUFS HYDRAULIQUES VERTICALES à aubes courbes, mues par dessous, suivi d'expériences sur les effets mécaniques de ces roues, in-4, figures, 2e edit, 1827 7 fr

POULLET-DELISLE, Professeur de mathématiques au Lycée d'Orléans APPLICATION DE L'ALGEBRE A LA GEOMETRIE, in-8, 1806 5 fr

— RECHERCHES ARITHMÉTIQUES, trad. du latin de GAUSS, in 4 18 fr.

PRONY, Membre de l'Institut LEÇONS DE MECANIQUE ANALYTIQUE, données à l'ECOLE POLYTECHNIQUE, 2 vol in-4, 1815 30 fr

Le même ouvrage, 2 vol in-4, grand papier, 36 fr

— Et les autres ouvrages du même auteur

* PROUST Recueil de Mémoires relatifs à la poudre à canon, extrait du Journal de Physique, in 4 18 fr

PUISSANT, Officier supérieur, Chef des études à l'Ecole d'Application des Ingénieurs Géographes, etc RECUEIL DE DIVERSES PROPOSITIONS DE GEOMETRIE, résolues ou démontrées par l'analyse, 3e edit, augmentée d'un précis sur le LEVE DES PLANS, in 8, avec pl 1824 7 fr

— TRAITÉ DE GEODESIE, ou exposition des Méthodes trigonométriques et astronomiques applicables, soit à la mesure de la Terre, soit à la confection du canevas des cartes et des Plans topographiques, 2e éd, 2 vol in-4, formant ensemble plus de 800 p, avec 13 pl, 1819. 30 fr

— METHODE GÉNÉRALE pour obtenir le résultat moyen dans une série d'observations astronomiques faites avec le cercle répétiteur de Borda, in 4, 1823 6 fr

— TRAITE DE TOPOGRAPHIE, d'Arpentage et de Nivellement, 2e edit, considérablement augmentée, 1 vol in-4, avec 9 pl gravées par M Adam 20 fr

— Principes du figuré du terrain et lavis sur les plans et cartes topographiques

ment du dessin dans les écoles, des services publics et comparaison des différens modes proposés à ce sujet, in-8, figures 3 fr 50 c

QUARTIER DE RÉDUCTION et astronomique en usage dans la Marine, en feuille 60 c collé sur carton 1 fr 50 c

* QUINET, *ancien commissaire des guerres* MEMOIRE POUR L'EXPOSE DES VARIATIONS MAGNETIQUES et atmosphériques du globe terrestre, avec des tables de la déclinaison et de l'inclinaison de l'aiguille aimantée sur toute la terre, présenté au bureau des Longitudes, in-8, 1826 4 fr 50 c

RAMOND Mémoire sur la formule barométrique de la mécanique céleste et les dispositions de l'atmosphère, qui en modifient les propriétés, etc, in-4, 1811 12 fr

RAMSDEN DESCRIPTION D'UNE MACHINE pour diviser les instrumens de mathématiques, traduit de l'anglais par Lalande, 1770, in-4, grand papier, fig 6 fr

RAVINET, *sous-chef à la division générale des Ponts et Chaussées* DICTIONNAIRE HYDROGRAPHIQUE DE LA FRANCE, contenant la description des rivières et canaux flottables et navigables dépendans du domaine public, avec un tableau synoptique, indiquant le système général de la navigation intérieure, ouvrage couronné par l'Académie royale des Sciences, suivi de la Collection complète des Tarifs des Droits de Navigation, 2 vol in-8 avec une très-grande Carte de la Navigation intérieure, publiée par la Direction des Ponts et-Chaussées 15 fr

Le tome deuxième, contenant les lois, réglemens, etc, relatifs à la Navigation, se vend séparément 8 fr

RAIMOND Lettre à M Villoteau, touchant ses vues sur la possibilité et l'utilité d'une théorie exacte des PRINCIPES NATURELS DE LA MUSIQUE, etc, in-8, 1811 4 fr

— Essai sur la détermination DES BASES PHYSICO MATHEMATIQUES DE L'ART MUSICAL, etc, in-8, 1813 2 fr

RECUEIL COMPLET DE TABLES UTILES A LA NAVIGATION (*Voyez* Violaine), in 8 9 fr

REBOUL (Antoine Joseph) TABLES NOUVELLES DE VENUS, d'après la Théorie de M de Laplace, et d'après les Eléments de M de Lindeneau, in-4, 1811 5 fr

— NOTES SUR LA NAVIGATION DE BEZOUT, in 8 3 fr

REYNAUD, Examinateur des Candidats de l'Ecole Polytechnique ARITHMETIQUE, à l'usage des élèves qui se destinent à l'Ecole Polytechnique et à l'Ecole Militaire, 14e edition, augmentée d'une Table des Logarithmes des nombres entiers, depuis un jusqu'à dix mille, 1 vol in 8, 1827 4 fr 50 c

— TRAITE D'ALGEBRE, à l'usage des élèves qui se destinent à l'Ecole Polytechnique et à l'ecole spéciale Militaire, 1 vol in 8, 6e edit *Sous presse*

— ALGEBRE, ancienne edit, 2e section, 1 vol in-8, 1810 5 fr

— TRAITÉ DE L'APPLICATION DE L'ALGEBRE A LA GEOMETRIE ET DE TRIGONOMÉTRIE, à l'usage des élèves qui se destinent à l'Ecole Polytechnique, 1 vol in-8 avec 10 pl, 1819 6 fr

— COURS ELEMENTAIRE DE MATHEMATIQUES, DE PHYSIQUE ET DE CHIMIE, à l'usage des élèves qui se destinent à subir les examens pour le Baccalauréat ès-lettres, 1 vol in 8, 1824 6 fr

— TRIGONOMETRIE RECTILIGNE ET SPHERIQUE, 3e edit, suivie des TABLES DES LOGARITHMES des nombres et des lignes trigonométriques de LALANDE, in 18 avec fig, 1818 3 fr

Les Tables de Logarithmes de LALANDE seules, sans la Trigonométrie, se vendent séparément 2 fr

— ARITHMETIQUE à l'usage des Ingénieurs

REYNAUD MANUEL de l'Ingénieur du Cadastre, par MM Pommies et Reynaud, in-4 12 fr

— TRAITE DE TRIGONOMETRIE de Lagrive, avec les notes de Reynaud, in-4 7 fr

— et DUHAMEL PROBLEMES ET DEVELOPPEMENS sur les diverses parties des mathématiques, in-8 avec 11 pl., 1823 6 fr

— NOTES SUR L'ARITHMETIQUE DE BEZOUT, 11e edit, in-8, 1823 2 fr 50 c

— SUR LA GÉOMETRIE, in 8, 1825. 4 fr

— SUR L'ALGÈBRE, et application de l'Algèbre à la Géométrie; in-8, 1823 4 fr

RIVARD TRAITE DE LA SPHERE ET DU CALENDRIER, 7e edit, (faite sur la 6e donnée par M Lalande), revue et augmentée de notes et addit, par M Puissant, officier supérieur, 1 vol in-8, avec 3 pl bien gravées, 1816 4 fr

ROMME, Associé de l'Institut de France TABLEAUX DES VENTS, DES MAREES ET DES COURANS qui ont été observés sur toutes les mers du globe, avec des réflexions sur ces phénomènes, 2 vol in-8, 1817 12 fr

RUGGIÉRI ELÉMENS DE PYROTECHNIE divisés en cinq parties la 1re contenant le Traité des matières, la 2e les feux de terre, d'air et d'eau, la 3e, les feux d'aerostation, la 4e, les feux de théâtre et les feux de guerre, suivis d'un Vocabulaire et de la Description de quelques feux d'artifices, etc, 2e edit. revue, corrigée et augmentée de nouvelles découvertes et inventions faites par l'auteur, telles que les beaux feux verts, baguettes détonantes pour éviter la chute dangereuse des fusées volantes, etc, 1 vol in 8 avec 28 pl., 1821 9 fr

— PYROTECHNIE MILITAIRE, 1812, 1 vol in-8. avec pl 6 fr

* SAVARY MÉMOIRE SUR L'APPLICATION DU CALCUL aux phénomènes électro-dynamiques, in-4, figures, 1823 3 fr.

SCHWAB ELEMENS DE GEOMETRIE. 1re partie, *geométrie plane*, in 8, 1823 2 fr 50 c.

* SEANCES DE L'ECOLE NORMALE, nouvelle édition, 13 vol. in 8. et 1 vol de planches 50 fr

* SEGUIN *d'Annonay* DES PONTS EN FIL DE FER, 2e edition, in 4, 1826, figures 5 fr

* — MÉMOIRE SUR LE CHEMIN de fer de Saint Etienne à Lyon par Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors, in-4., figures, 1826 3 fr

SEGUIN MANUEL D'ARCHITECTURE, ou Principes des Opérations primitives de cet Art, ou l'on expose des Méthodes rigoureuses tant pour l'évaluation des surfaces et solides circulaires que pour le développement des courbes, et pour l'extraction des racines carrées et cubiques, par de nouvelles règles fort simples Cet ouvrage est terminé par une table des carrés et des cubes, dont les racines commencent par l'unité et vont jusqu'à dix mille In 8, avec 10 pl 6 fr

— TABLES DES NOMBRES CARRÉS ET CUBIQUES, et des racines de ces nombres, depuis un jusqu'à dix mille 3 fr

SERVOIS SOLUTIONS PEU CONNUES de différens problèmes de Géométrie pratique, 1 vol in 8. 2 fr 50 c

SGANZIN, Inspecteur général des Ponts et Chaussées, etc PROGRAMMES OU RESUMES DES LEÇONS D'UN COURS DE CONSTRUCTION, avec des Applications tirées principalement de l'Art de l'Ingénieur des Ponts et Chaussées, 3e edition, revue et considérablement aug, 1 vol in-4, 1821 avec 10 pl 15 fr

SIMONIN TRAITE D'ARITHMÉTIQUE DECIMALE, 1 vol in-8 2 fr

QUE à l'usage des Pensionnats et des Ecoles Chretiennes, 3e. edit, 1822 5 fr

IMMENCOURT TABLEAUX DES MONNAIES de change et des monnaies reelles, des poids et mesures, des cours des change, et des usages commerciaux des principales villes du monde, ou Repertoire du banquier, in 4, 1817 3 fr

INGER (George) ÉLEMENS D'ELECTRICITE ET DE GALVANISME, traduit de l'anglais par THILLAYE, Professeur au college Louis le Grand, 1 fort vol in 8, 1816 8 fr

ILATON (Voyez GIRARD)

DULAS LA LEVEE DES PLANS ET L'ARPENTAGE RENDUS FACILES, precedés de notions elementaires de Trigonometrie rectiligne à l'usage des employés au Cadastre de la France, deuxieme edition, revue et corrigée, 1 vol in 8, 1820, avec 3 pl 3 fr

AINVILLE (De), Repetiteur à l'Ecole Polytechnique MELANGES D'ANALYSE ALGEBRIQUE ET DE GÉOMETRIE, vol in 8 de 600 pages, 1815, avec 3 pl 7 fr 50 c

IRLING ISAACI NEWTONI ENUMERATIO LINEARUM TERTII ORDINIS, sequitur illustratio ejusd tractatûs, in-8, 7 fr. 50 c

ZANNE, Docteur ès Sciences, Professeur de Mathématiques au Lycée Charlemagne à Paris, etc DE LA MANIERE D'ETUDIER LES MATHEMATIQUES, Ouvrage destiné servir de guide aux jeunes gens, à ceux surtout qui veulent approfondir cette science ou qui aspirent à être admis à l'Ecole Normale ou à l'Ecole Polytechnique, 3 vol in 8, avec fig.

Chaque partie se vend séparément savoir,

1re *Partie* PRECEPTES GENERAUX ET ARITHMETIQUE, seconde edition considerable aug, in 8 6 fr

2e *Partie* ALGEBRE, epuisée, in-8 *ne se vend plus séparement*

3e *Partie* GEOMETRIE, in-8 6 fr 50 c

DENAT, Recteur de l'Academie de Limes Lecons elementaires D'ARITHMETIQUE et D'ALGEBRE, in-8 5 fr

Leçons elementaires de GÉOMÉTRIE, in 8 5 fr

Leçons elementaires d'APPLICATION DE L'ALGEBRE A LA GEOMETRIE, et Calculs differentiel et integral, 2 vol in-8, 10 fr

IESSLERAND Traité d'arithmetique algebrique, in-8, 1823 5 fr

EVENEAU COURS D'ARITHMETIQUE l'usage des Ecoles centrales et du Commerce, in-8 3 fr

IOUP aîné, maître horloger à Paris TRAITE D'HORLOGERIE MECANIQUE ET PRATIQUE, approuvé par l'Académie royale des Sc, 2 vol in 4, avec 91 pl 36 fr

TRAITE DE GEODESIE PRATIQUE, contenant de nouvelles methodes à l'usage des arpenteurs et des geometres du cadastre, suivi d'un recueil de lois et de diverses formules et proces verbaux, concernant le ministere des arpenteurs, in-8, 1827, figur 2 fr 50 c

DGOLD (Thomas), Ingénieur civil membre de l'institution des Ingenieurs civils ESSAI PRATIQUE SUR LA FORCE DES FER COULE ET D'AUTRES METAUX destiné à l'usage des ingenieurs, des maîtres de forges, des architectes, des fondeurs, et de tous ceux qui s'occupent de la construction des machines, des batimens, etc, contenant des règles pratiques, des tables et des exemples, le tout fondé sur une suite d'experiences nouvelles, et une table étendue des proprietés de divers materiaux, traduit de l'anglais, sur la deuxieme edition, par T DUVERNE 1 vol in 8 avec planch, 1826 6 fr

TREDGOLD PRINCIPES DE L'ART DE CHAUFFER ET D'AERER LES EDIFICES PUBLICS, les Maisons d'habitation, les Manufactures, les Hopitaux, les Serres, etc, et de construire les Foyers, les Cheminées, les Appareils pour la vapeur, les Grilles les Etuves, démontrés par le Calcul et appliqués à la Pratique avec des remarques sur la nature de la Chaleur et de la Lumiere et plusieurs Tables utiles dans la Pratique, trad de l'anglais sur la 2e edit, par Th DUVERNE 1 vol in 8, avec planch 1825 7 fr

— TRAITE PRATIQUE sur les chemins de fer et sur les voitures destinées à les parcourir, principes d'après lesquels on peut evaluer leur force, leurs proportions et la dépense qu'ils necessitent, ainsi que leur produit annuel, conditions à remplir pour les rendre utiles, economiques et durables, theorie des chariots à vapeur, des machines stationnaires, et de celles où l'on emploie le gaz, Leur effet utile et les frais qu'elles occasionent Orne de planches, et contenant beaucoup de tables, in-8 1826 5 fr

TREUIL Professeur à l'Ecole militaire de Saint-Cyr ESSAIS DE MATHEMATIQUES, contenant quelques details sur l'Arithmetique, l'Algebre, la Géometrie et la Statique, in-8, 1819 2 fr

* TRISTAN (*comte de*) Recherches sur quelques effluves terrestres, in-8, 1826 6 fr

* VALLÉE, ancien élève de l'Ecole Polytechnique, Ingenieur au Corps royal des Ponts et Chaussées TRAITE DE LA GEOMETRIE DESCRIPTIVE, dédié à M MONGE (Ouvrage sur lequel l'Institut de France a fait un rapport tres avantageux) 2e édit, 1 vol in-4, avec un atlas de 67 pl, 1825 20 fr

*—TRAITE DE LA SCIENCE DU DESSIN, contenant la theorie generale des ombres, la perspective lineaire, la theorie des images d'optique, et la perspective aerienne appliquée au lavis, pour faire suite à la Geometrie descriptive, 1 vol in 4, avec un atlas de 56 pl, 1821 20 fr

VAN-BEEK De l'influence que le fer des vaisseaux exerce sur la boussole, et un moyen d'estimer la deviation que l'aiguille éprouve de ce chef, trad du hollandais, par M Lipkins, in-8 2 fr 50 c

VASTEL ARITHMETIQUE DU JEU DE BOSTON, ou Chances Bostoniennes, in 12 1 fr 50 c

— ART DE CONJECTURER, traduit du latin de J Bernouilly, avec des observations, éclaircissemens et additions, in 4° 7 fr 50 c.

WATIN L'ART DU PEINTRE, doreur et vernisseur nouvelle edition, augmentée de l'art du fabricant de couleurs, par BOURGEOIS, in 8, 1823 5 fr

* VINCENT, *professeur de mathematiques speciales* COURS DE GEOMETRIE ELEMENTAIRE, à l'usage des eleves qui se destinent à l'ecole polytechnique et à l'ecole militaire, in 8, 1826, figures 6 fr

VIOLAINE RECUEIL DES TABLES UTILES A LA NAVIGATION, traduit de l'anglais de John William NORIE, professeur d'Hydrographie à Londres, précédé d'un ABREGE DE NAVIGATION PRATIQUE, contenant ce qui est necessaire et indispensable à toutes les classes de marins, enrichi de plus, d'un VOCABULAIRE des termes les plus usités dans la MARINE, le tout tiré des meilleurs Auteurs français, anglais espagnols, etc recueilli, mis en ordre augmenté de Remarques et Observations nouvelles par P A VIOLAINE, ex Commissaire de Marine, Professeur de Mathematiques et de Navigation, etc, 1 vol in-8 1815 9

VISCONTI MUSÉE PIE-CLEMENTIN 8 vol in 8, contenant chacun un grand nombre de planches 250

VOIRON HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE depuis 1781 jusqu'à 1811, pour servir suite à l'Histoire de l'Astronomie de Bailly in-4, 1811 12

(Cet ouvrage est indispensable aux personnes qui possèdent les 5 volumes de l'Astronomie de Bailly)

WILLAUMEZ, vice amiral DICTIONNAIRE DES TERMES DE MARINE, nouvelle edition revue et considérablement augmentée, 18 vol in 8, avec pl dessinées et gravées par Bauzeau 12

— Le même, avec 157 pavillons. 15

Les 157 pavillons colorés se vendent separément 6

SUPPLÉMENT.

LEFEVRE, *ingenieur en chef de cadast* APPLICATION DE LA GEOMETRIE à la mesure des lignes inaccessibles, et des surfaces planes, etc, ou longiplanimetre pratique, in 8, 5 figures 1827 5 fr

VOYAGE METALLURGIQUE EN ANGLETERRE, ou Recueil de memoires sur le gisement, l'exploitation et le traitement des minerais d'etain, de cuivre, de plomb, de zinc, et de fer, dans la Grande-Bretagne, par M DUFRENOY et ELIE DE BEAUMONT, ingenieurs des mines 1 fort vol in-8 avec 17 planches 1827 12 fr 50 c

* DARCET DESCRIPTION D'UNE SALLE DE BAINS, présentant l'application des perfectionnemens et des appareils actuellement connus, à l'art de construction, in 4, 1827, fig 2 fr

*— INSTRUCTION RELATIVE A L'ART DE L'AFFINAGE, rédigé au nom du conseil de salubrité de la ville de Paris et du département de la Seine, in-4, 1827, avec 3 grandes planches 3 fr

* LAURENT, peintre, ancien élève de l'école Polytechnique, professeur de dessin à l'école royale forestiere de Nancy THEORIE DE LA PEINTURE, *premiere part*, TRAITE DE PERSPECTIVE LINEAIRE à l'usage des artistes, in-8, 1827, fig 4 fr

* THOUIN (Andre), membre de l'Institut, professeur de culture au Museum d'histoire naturelle, etc Cours de culture et naturalisation des végétaux, 3 vol in-8, et atlas de 65 planches in-4 1827 35 fr

SOUS PRESSE

CONNAISSANCE DES TEMPS pour 1830

APPLICATION DE L'ANALYSE A LA GEOMETRIE, à l'usage de l'Ecole polytechnique, par MONGE, 5e edition, in 4

ESSAI SUR L'HISTOIRE DES MATHEMATIQUES suivi de notices sur quelques geometres célebres, par M LACROIX, *membre de l'Institut*, in 8

GEOMETRIE DU COMPAS, par Mascheroni, 2e edition, in-8, figures

TRAITE DES MACHINES A VAPEUR, traduit de l'anglais de Tregold, etc 1 vol avec planches

IMPRIMERIE DE FAIN, RUE RACINE, N° 4, PLACE DE L'ODEON